





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2771/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2771/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2771/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2771/A

2771 A

2m 152


N. XIV
16/8

13

coll.
L.

152. GESNER, C. *Historia plantarum et vires ex Dioscoride, Paulo Aegineta, Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis*. 8 leaves, 262 pp. Printer's device. 12mo. Half calf. Paris, Richardus, 1541.

Pritzel 3297. Second edition published in the same year as the Basel first edition of this important botanical work. Gesner's *historia plantarum* is a student's handbook of botany, giving the genera in alphabetic order—a sort of pocket dictionary of plants. — First and last leaves waterstained, small hole in the margin of the first leaf, otherwise a good copy. — Rare.



46789
num. 199.

**HISTORIA PLAN-
TARVM ET VIRES EX
DIOSCORIDE, PAVLO AEGI-
META, Theophrasto, Plinio, & recetio-
ribus Græcis, iuxta elementorū ordinē.**

**PER CONRADVM GES-
nerum Tigurinum.**

Adiecta ad marginē nomenclatura, qua
singulas herbas officinæ, herbarij, &
vulgus Gallicum efferre solent.



PARISIIS
Apud Guilielmum Richardum sub pingui
gallina.

1541

HENRICO BILLINGO

Corradus Gesnerus.

S. D.

EGO QUIDEM satis gnarus, Henrice charissime, in quibus quantisque negotiorum hoc imprimis tempore verseris, haud temperare tamen mihi potui, quin qualicumque tandem indicio meum in te amore, qui hactenus pectore lateuit, palam profiterer. Quod cum in praesentia qua fieret alia ratione non haberem, quod habui solum, superioribus diebus plantarum mihi congestam historiam ad te mittere volui. Acquisitum enim tibi ut ascriberetur existimaui, non modo tuorum erga me officiorum nomine, quavis id maxime: sed etiam quod cum studiosorum omnium amator & admirator sis vnicus, occasionem tibi quoque sine meliorum literarum lectione ullam effluere non patiaris, comprimis quidem sacrarum, post quas, ut nec alios bonos authores, ita neque medicos inspicere aliquando piget. Accessit alia causa haec tibi nuncupandi, ut si luctu nimio premerere tristioris sortis, qua te tuosque per familiam vestram funera nuper exerceri Deo visum est, iucundiore hoc, si possem, argumento, inde auocarem. Huc facit etiam fortuna tua (quam hic non ut vulgus, sed providentia

10
diuinæ œconomam, seu promā condāmque
accipio) quę cū tibi hortos & prædia donaue-
rit amplissima, simul agriculturæ & planta-
rum studiū iniecit, quo quidē ipso inter ne-
gotiosa huius vitę studia, vix dici vllū potest
bonis viris coniunctius familiariúsq;. Philo-
sophi quidem inter alia liberalisanimi signa
recēsent, animalibus delectari, præcipuē pul-
chri quippiā mirandiq; habentibus, idq; iu-
cunditatis solum gratia. Ego verò longē ma-
gis collaudauerim, qui pulcherrimis plantis
ac peregrinis oblectantur. Nam & liberalitas
in huiusmodi existit, qui dum non suæ, sed
cōmunis vtilitatis rationem habent, sumpti-
bus nullis parcunt, vndecūq; terrarum plan-
tis peregrinis, pulchris, admirandis, iucūdis,
salubribus, arboribus, fruticibus herbis ex a-
lieno orbe magno studio, magnis sumptibus
conquisitis, ornādo ditandóque nostrū. Sed
iam nostrę plantarū historiæ, vel potius tuę,
rationē tibi explicabo. Cū superioribus men-
sibus suauissimā patriam Tigurū inuisssem,
salutandi gratia semel atq; iterū doctissimū
virū Christophorum Clauerū vrbis nostrę
archiatrum accessi. is cum varia colloquenti-
bus nobis, medicinæ studiosis rem vtilem fa-
cturū diceret, si quis simplicium medicami-
num ē Dioscoride quidem descriptiones, fa-
cultates autē ex Aegineta cōscriberet: placuit
mibi tum id cōsiliū, & iam prius in mentem

A ii

sæpe venerat. Mox igitur non hoc solū præ-
stare conatus sum, sed ordinē alphabeti secu-
tus, reliqua etiam Simplicia adieci, quę Dio-
scoridi omīssa in frequēti sunt ac celebri hu-
ius temporis medicorum usu, barbaris mon-
strata primū, & à recentioribus Gręcis in suā
linguā transfusa, à quibus ego huc transcri-
psi, doctissimi viri Ruellii interpretatione
plerunq; usus. Fuit autem præcipuū scribendi
institutū, vt studiosi medicinæ enchiridion
haberent circumlatu facillimum, etiam ruri,
Dioscoride quem antehac circūferebant, bre-
uius, melius, locupletius, & quoniam ordina-
tim scriptum commodius, laborioso inquire-
di tædio vacans, mole nulla, nō omīssis mul-
tis aliis præclaris apud Arabes medicinis sim-
plicibus. Melius autē dixi, quod ex Agineta
plerunq; (qui Galeni compendiū est, aut vt
alii loquuntur, simia) nonnunquam ex ipso
Galeno, aut Aëtio facultates ascripserim in
genere primas, secundas, & tertias, vt illi vel
omnes vel aliquas tantum memorauerunt.
Hoc autē, priores dico & vniuersales seu par-
ticulariū virtutum fontes quosdam describe-
re, rationalis tātum artificis est: particulares
verò tradere, magis empirici. Præterea ex his
quidem generalia inuenire difficillimū: ex
generalibus verò alias omnes inde manan-
tes, cuius exercitato in Galeni methodo fa-
cile fuerit. Porro hic solum plantarum hi-

5
9
storiā mitto, ut quāminimū sit enchiridion, & ruri praeipue commodissimū. Mit tam proximis diebus reliqua etiam, quae prae- ter plātas sunt simplicia. in Marginibus Ger manica, sicut Graeca, non addidi, quod aliū, ut nosti, ex professo scripserim librū de plan tarum nomenclaturis, nostra, Gallorū, Grae- corum, & Romanorū linguis, sed nudis no- minibus absq; viriū & ipsarum descriptionis historia. Liberet de aliis pluribus in primis vero pulcherrimi liberalissimiq; plantarum studii laudibus te affari, nisi vitio mihi dan- dum metuerē, quod breui libello promisso longiorem quā pro eius portione, neq; de necessariis rebus epistolam prae- fixissem: quā- obre nihil amplius addam, quā ut animo, quo soles omnia, candidissimo his acceptis a Conrado tuo mortaliū omnium tui aman- tissimo, maiora in posterū expectes. Vale. Christus Opt. Max. te cum gravissimo viro patre tuo in Reipub. & bonorum studiorum salutem, incolumem quā diutissimē tucatur. Iterum vale. Lausanna. ix. Augusti.

A iii

INDEX.

A

A Gasyllis	14.28	Balsamum	33.6
Agnus	256.24	Barbula hirci	34.25
Alcibiadiōi	7.23	Barba senilis	10.22
Alus	228.12	Bathypicron	2.6
Amaracus	180.29	Bdellium	34.29
Amaranton	91.20	Bellis	35.15
Anchusa	139.6. & seq.	Bellius	ibidem
Anarrhinon	22.5	Beta	35.18
Anaxyris	131.24	Betula	36.14
ἀνδράχυν ἀγρία	125.8	Betonica	35.28
Anthericon	114.27	Blattaria	39.27
Antirrhinon	22.5	Blitum	37.2
Anthyllion	13.23	Boleti	37.4
Antimalum	147.11	Botrys	37.16
Apiastrum	22.29	Bolchon	34.29
Arrhenogonum	187.21	Brassica	37.18
Aronia	151.16	Brassica	23.31
Arcturon	25.10	Bryon	56.10, & 158.13
Ascyroides	28.18	Bryonia	257.8
Asparagus	29.19	Brytanica	38.16
Astragalus	30.18	Bucheides	216.29
Atractylis	30.29	Bucinus	85.22
Attriplex	31.	Buglossus	38.22
Aucna	31.10	Bulbina	39.2
		Bulbus esculentus	39.10
B Accharis	32.5	Bulbus vomitorius	39.15
Ballote	32.26	Balapathum	38.29
Balaustium	32.18	Bunium	39.22

INDEX

Buphtalmon	40.6	Centunculus	71.6
Bupleurum	40.14	Chamaeæte	212.26
Buselinum	41.3	Chamaecisso, 57.6.64.14	
Butomus	40.21	Chamaedrys	57.21.
Buxus	41.6	& 252.7	
C			
Acacia	41.11	Characias	246.13
Cactus	41.22	Chironium	91.19
Calamintha	42.17	Chrysanthemon, ibidē	
Calamus odoratus,	41.23	Chrysolachanos	31.7
Calathiana	42.1	Cibotion	96.23
Calcifraga	42.9	Cici	205.29
Cachla	40.6	Cichorion	60.27
Caltha	41.10.61.13	Circæa	147.13
Calthula	42.17	Citharon	69.13
Calyx	17.17	Cissaron	69.12
Cammoron	5.21	Cissanthemon	64.4
Cancamon.	43.21	Cissophyllon, ibidem	
Canaria	43.6	Clematitis	27.16
Cannabis	43.16	Colocynthis	65.9
Canna Indica	51.3	Coris	78.12
Canopon	44.11	Coriandrum	78.2
Cantabrica	44.12	Cornus	78.20
Caphura	44.20	Conferua	77.6
Cardamina	230.3	Confiligo	77.12
Carnabum	27.2	Conuoluolus	77.24
Carnabadium	ibidem	Conyza	77.28
Cassitas	51.22	Corianum	78.2
Cedria	52.29	Coronopus	79.1
Cedrides	53.9	Corruda	29.21
		Costus	29.8

INDEX

Cotonea	80.1	Daucus	84.20
Cratæogonum	80.4	Dictamnus	85.25
Crithmum	80.13	Delphinium	85.11
Crocodilion	82.28	Dicoccos	261.1
Crocus	81.7	Diospyros, vel diosporos.	
Cromphena	229.15	86.14	261.1
Croton	205.29	Dipsacus	86.17
Cucurbita	81.1	Dodecatheos	86.30
Cucumis	81.4	Dolichi	186.25
Cuminum	83.4	Donax	114.15
Cunila	77.28	Dorias	90.17
& 84.6, 170.7		Dorycnion	87.5
Cunilago	77.28	Dorypetron	136.6
Cupressus	83.27	Draba	25.1, & 87.23
Cymbalion	258.20	Dracunculus	87.31
Cynocrabe	23.21, & 67.1	Dryophonum	88.16
Cynoctionon	6.2	Dryopteris	88.25
Cynomoron	24.2	Dulcis radix	89.1
Cynofarchis	169.5	E	
Cyparissias	246.10	EBenus	89.14
Cytinus	69.20	Ebulus	212.3
D		Elate	91.9, & 175.20
Dactylitis	27.9	Elaterium	81.20
Damascena	197.30	Elelisphacon	212.8
Damasoniō	10.23, & 85.1	Eleophyllum	187.15
Daphnitis	50.17, zigr	Eruca sylvestris	95.27
cognomine	cod.	Erysifceptron	29.6
Daphnoides	70.23,	Erytranon	69.23
& 77.30		Erytrodanum	208.1
Darca	50.23	Erythros	205.12

INDEX

Erythronium	ccxv, xxvi	Incana	cxxv. xx
F		Irio	cxxvi. xiii
Faba pontica	xcix. xi	Iucus Babylonius, 128, 21	
Fœniculum sylvestre.		Ixia	lvii. xxv
cii. xiii		L	
Fumaria	xl. xix	L Achryma Aethiopica,	
G		cxvi. vi	
Gethyllis	cviii. xx	Lactoris	cxxix. xviii
Gethyon	cviii. vi	Lapathum	cxxxi. xxi
Gladiolus	cx. vii	Laser	cxxxii. xii
Glandes Iouis,	cx. xxiii	Lepidion	cix. xiii
Glycyfide	clxxiii. xviii	Leontice	xli. xi
Gnochiles	xvii. xxiii	Licéron	cxxxvi. vi
Gordylon,	cxxiii. xviii	Ligustrum	cxl. xvi
H		Lilia	cxl. vii
Halicacabō,	ccxxxiii. 3	Limnæon	liiii. x
Hedysaron,	ccxxi. ii	Limonion	cxli. v
Helitropion	cxvi. xiii	Lingua	cxli. xix
Helioscopius,	ccxvi. ix	Linozostis	cli. i
Helix	cxv. viii	Linum	cxli. xvi
Hemionium,	xxix. xxix	Lithospermon	cxlii. v
Heraclea	ccxxvii. vi	Lolium	cxlii. xviii
Heraclia	cxvii. viii	Lonchitis	cxlii. xxi
Herba pedicularis	237. ii	Lopima	cx. xxiii
Hippuris	xciii. xxiii	Lotus	cxlii. viii
Holoscœnos,	cxxviii. x	Lupinus sativus	cxlii. x
Hypocistis	lxix. xxiii	Lupha	xxvii. xxii
I		Lupus salicarius, 144. 20	
I Biscus	xxx. xx	Lutea	cxlv. vi
Illecebra	ccxxv. viii	Lycoctonon	vi. ii

INDEX

Lychnis sylvest.	137.25	Melittæna	xxii,xxviii
Lychnitis	cclv.xvi	Mentha	cl.xx
Lygos	ccclvi.xxxiii	Menthastrum	ibidem
Lyfimachia	cxli,xx	Menthastra,	xlii,xxiii
Lythron	ibidem.	Meon	clii,i
M		Mespilus	cli.xvi
MAcer	cxlv,xii	Millefolium	cliii,xiii
Macheronion,	cx.vii	Milium	cliii.i
Machis	clviii.ii	Milium Indicum,	ibidē
Madelcon	xxxiii,xxx	Miliaria herba	clii,xxv
Magudaris	cxiii,xxiii	Myos ota	xiii,xxiii
Malabathrum	cxlv,xx	Mioctonum	v.xxi
Malumpunicū,cxcix,xvi		Mithridation	clvi,xi
Mala,146,23, pfica, 184		Mollugo	clvii,vi
Malacocissus	cxlvi,ix	Moly	clii,xxiii.ccx,vi
Malua	cxlvi,xiii		clvi,xxi
Mamiras	cxlvii.vi	Molybdæna	clvii,i
Mannathuris	ccxliiii,v	Morus	clvii,vii
Mandragora	cxlvii,xi	Moschocaryon	clvii,xvi
Marrubium	cxlix,i	Mosyliti	lxv,vi
Marrubiū nigrum, 32.26		Muris auricula	xxxi,xxi
Marum	cxlix,xii	Muscus	clviii,xiii
Mastiche	cxixv,viii	Muscus marinus,	ibidem
Maspeton	cxixii.viii	Myagrus	clii,x
Medica	cxlix,xx	Myles	clii,xxi
Medion	cl.i	Myosotis	xxi.
Melampodion,	ccliiii.x	Myrsinoides	lxx,xxiii
Melampus	codem	Myrrha	cliii,iii
Melampyron	clii.x	Myrica	cliii,xx
Melissophyllō,xxii,xxix		Myristica	clvii,xxiii

INDEX

Myriophyllum	cliii,xiii	Oenanthe	clxv,xix
Myrepfica	clvii,xviii	Olea,	clxvi,i
Myrsinites	ccxvi,viii	Ocimastrum	clxiii,xxvi
Myrtacantha	ccix,xiii	Onagra	clxvi,xxi
Myrtidanum,	clv,xxiii	Onitis	clxx,xii
Myrrhis	clv,xv	Onobrychis	clxvi,xxx
Myrt ^o sylvestris	ccix,xiii	Onoclia	xvii,xviii
Myrtus sativa	clv,xxi	Ononis	xx,xxvi
Myxa	clvi,xiii	Onosma	clxvii,viii
N			
Nacaphthum	clix,iii	Onothera	clxvi,xxi
Napi	158,26.&229,19	Onuris	ibidem
Narcaphthum	clix,iii	Ophioscorodon	xi,xxvi
Narcissus	clix.xi	Opium	cluvii,viii
Nardus	clix,xxiii	Opopanax	clxvi,xi
Nardu sylvestre	xxviii.vi	Opulus	clxviii,xxv
Nastos	cxiii,i	Oreoselinum	clxix,xxv
Nasturtium	clx,ix	Origanum	clxx,viii
Nepa	ccxx,iii	Ornithogalum	clxxi,xi
Nepeta	xlii,xx	Orneoglosson	clxxi,i
Nerion	clxii,xvi	Ornus	clxxi,xx
Nigella	clxii,xxviii	Orobanche	clxxii,xiii
Nux Indica	clxiii,xi	Oryza	clxx,xxvi
pontica	cxxxv.viii	Osyris	clxxii,xxiii
Nuces anellanae	163,23	Osteocollon	clxxiii,i
iuglandes	ibidem	Othonna	clxxiii,x
Nymphæa	clxii,xxvii	Oxalis	cxxxiii,xxiii
O			
Ocimum	clxv,iii	Oxya	clxxiii,xxx
Ocimoides,	clxiii,25	Oxys	clxxiii,xviii
		Oxylapathū	cxxxix,xix
		Oxymyr sine	ccix,xiii.

INDEX

P		Periclymenon	181.19
P Aederota	3.30	Peristereon	183.7
Pæonja	174.18	& 211.18	
Paliurus	175.11	Persea	183.17
Palma	175.20	Perficæ	183.29
Panacea	139.29	Persion	235.13
Panaces Asclepiō	177.18	Personata	184.4
Heraclion	170.18	Pes gallinaceus	45.29
Panaces	177	milvius	114.11
heracleum	176	Petasites	184.14
Pancratium	178.10	Petilius	184.21
Panicum	178.16	Peroselinum	184.30
Papauer	178.20	Peuce	129.1
Papyrus	180.20	Peucedanum	185.9
Pardalianches	5.10	Phalangium	186.6
Paralius	146.9	Phalangites	ibidē
Paronychia	180.23	Phalaris	186.17
Partheniō	117.8 & 180.2	Phascon	56.10
Pastinacia	181.4	Phasgonon	110.7
Pecton	228.18	Phaselli	186.25
Pelecinus	221.2	Phasiolon	127.21
Pepanus	199.7	Phasioli	186.25
Pep'ion	381.18	Phellandrium	187.3
Peplis	181.17	Philetæria	194.13
Peplos	181.28	Phlomides	255.15
Pentameron	174.28	Phloon	188.4
Pentoboron	174.18	Phlox & phlogion	219
Pepon	182.9	Phlum	188.13
Perdicium	117.8	Phoenix	175.20
Pericarpum	182.14	Phormio	183.22

INDEX

Phragmites, seu uallato- ria 114.15		Polygonoides 70.25	
Phu 189.7		Popul' alba nigra 196.10	
Phyllitis 187.6		Porrum 196.17	
Phyllum 187.15		Portulaca syluest. 181.18	
Phyrama 15.4		Poterium 196.2	
Phyteuma 187.29		Pothos 107.1	
Picca 189.23		Potamogeton 196.24	
Picris 222.24		Prunum 197.24	
Pinus 189.24		Pfura 198.6	
Piper 200.14		Psyllion 198.10	
Pisum 202.19		Parmica 198.19	
Pistacia 202.7		Pulegium 198.30	
Pistolochia 202.14		Pulmonaria 199.7	
Pithyantes 7.4		Pycnocomon 200.60	
Pityides 200.3		Pyrethrum 201.22	
Pityusa 193.4		Pyrina 7.3	
Plantago 193.13		Pyrum 202.3	
Platanus 194.4.			
Platyphyllos 96.24		Q Vercus 200.1	
247.28		Quinquefolium 199.28	
Plumbago 157.1			
Polemonia 194.13		R	
Polium 195.28		R Adicula 200.18	
Polycnemon 194.23		R Radix 200.22	
Polygonatū 195.4		Ranunculus 201.12	
Polygonium 173.3		Rapum 201.30	
Polygonū 195.19, 213.18		Resina liquida 202.14	
Polygala 194.29		Rha 204.1.18	
Polytrichon 195.26		Rhamnus 204.11	
		Raphanus 206.23	
		Rhaponticum 204.18	

INDEX

Rheum	ibidem	Satureia	ccxvii.iiij
Rhæas xx.xx & clxxvii.		Satyrium	ccxv.xix
xxvii.		Satyrium basilicū	ccxvi.iii
Rhodia radix	ccv.v	Saxiphraga, seu saxiphra-	
Rhododendron	clxii.xv	gos	ccxvi.xviii
Rhus	ccv.xii	Scammonia	ccxvii.xix
Recinus	ccv.xix	Scandix	ccxviii.xxi
Rodora	ccvi.i	Scissima	clxxiii.i
Rosa	cclxxvi	Scorpius	ccxx.iiii
Rosmarinus	cclx.xix	Scorpioides	ccxix,xxviii
& cclxx.xxix		Scorpiurum	cxvi,xv
Rubus canis	ccviii.xvii	Scolopēdriō	xxix,xxviii
Rubus, Idæus	Ibidem	Scolymon	xlvi,xi
Ruscus	ccix,xiii	Scopa regia	ccxviii,xxix
S		Scordium	ccxix,xiii
Abina	ccxi.i	Scorodoprasum	ccxx,xvi
Sacra herba	ccxi.x	Scylla	ccxviii,xxvi
Sagapenum	ccxi.vii	Secale	ccxx.xxv
Saliunca	clx.xxx	Securidaca	ccxxi,ii
Salix	ccxii.i	Selago	ccxxi,xii
Saluio	ccxii.viii	Semperuiuum	ccxxi,xvi
Sambucus	ccxii.i	Seuocio	ccxxii,xiii
Samsuchus	ccxiii.vii	Serapias	clxix,xiii
Sanguinaria	ccxiii,xviii	Serpillum	ccxxiii,ii
Santalum	cuxiii,v	Seris lx, 27, ccxxii, xxiii	
Santonium absinthium		Sertula campana	cl,xiii
cc.xxiii		Sesama	ccxxiii,xviii
Sarcocolla	ccxiii.xxv	Sesamoides	ibidem
Sardoa vel sardonias		Seseli creticum	ccxxiii,
ccxv.iii.		xiii,	

INDEX

māssiliense	ibidem	Stachys	ccxxxvi, xxvii
Seutlomalachō	ccxxv, xii	Staphisagria	ccxxx, xi
Side	ccxxvi, x	Staphyodendros	237, 6
Sideritis	ccxxvi, xvii, cxvii, viii	Sthœcas	ccxxxviii, xxi
Siler	ccxxvii, xix	Sthœbe	ccxxxviii, xiiii
Siligo	ccxxviii, ii	Stratiotes	ccxxxviii, 28
Siliqua	ccxxviii, ix	Struthium	cc, xviii
Silphion	cxviii, vi	Styrax	ccxxxvii, xix
Silibos	ccxxvii, xxvii	Sycaminus	ccxxv, xvii
Sinapi	ccxxix, xix	Sycomorus	ibidē
Siō	cxviii, xxi, ccxxx, iii	Symphona	ccxxix, xv
Sium	ccxxx, xxi	Symphyton petraon	ccxxviii, xii
Siler	ccxxix, xxv	Syringias	cxiiii, xiiii
Sison	ccxxx, xv		T
Sisymbrium	ccxxix, xxix	TAlantium	clxxiii, iii
Smilax	ccxxx, xxv	Tamarix	cliii, xx
Smyrnium	ccxxxii, viii	Taxus	ccxxx, xxv
Solanum	237.27 & seq.	Telephium	ccxxxix, xxi
Somphus	ccxxxiii, ix	Terebinthus	ccxl, vi
Sonchus	ccxxxiii, xviii	Teriophonon	v, xxi
Sorba	ccxxxiii, xxv	Testiculus	clxix, v
Spanacia	ccxxxv, iii	Teucrion	ccxl, xv
Sparganion	ccxxxv, vii	Tapfia	ccxl, xxviii
Spartion	ccxxxv, xiii	Talietron	ccxl, xxi
Spatha	clxxv, xxv	Thelygonū	clxxxvii, xvii
Spōdylum	ccxxxv, xxii	Thelyphomon	v, xxi
Spina 25. 12. acuta	ccxxvi	Therionarca	ccxli, xxviii
vii, alba	ccxxxvi, vi	Thlaspi	ccxlii, xxvi
Splenion	xxix, xxix	Thrausma	xv, ii

Thus ccxlii. xiii
 Thylacitis clxxviii. xxiii
 Thymelæa ccxlii. xi
 Thymus ccxlii. xx.
 Tilia ccxlv. i
 Tithymalus ccxvi. iiii
 Tragacantha ccxlviii.
 xviii
 Tragium ccxlviii. xxviii
 Tragos ccl. ix
 Tragoriganum ccxlix.
 xix,
 Tragopogon ccxlix. xiii
 Tribulus ccl. xxi
 Trifolium ccli. xii
 Tripolion ccli. i
 Triticum ccli. xvii
 Trifago ccli. vii
 Tubera ccli. xxvi
 Tussilago ccli. i
 Typha ccxlv. xxi

V **V**
 Eneris peccē ccliii. xii
 Veratrum ccliii. xxi
 Verbascum cclv. iiii
 Verbenaca clxxxiii. vii
 Vetonica xxxviii. xvi
 Umbilicus Veneris
 cclviii. vii
 Vnedo xxv. ii
 Vrticula sylvestris cclix. i

X
 X **X**
 Iphidion ccxxxv.
 Xylocinnamomum
 lxvi. x
Z
 Z **Z**
 Arnabum 27.2
 Zarnabadium xxvii. ii
 Zingiber lxvi. x
 Zygis cclix. xix
 ccxxxiii. viii

FINIS.

HISTORIA PLANTARUM

ET VIRES EX DIOS-
coride, Paulo Aegineta, Theo-
phraſto, Plinio, & recētio-
ribus Græcis, iuxta ele-
mentorum or-
dinem.

PER CONRADVM GESSNE-
rum Tigurinum.

A

EROTONVM duorum est *ἀβρότον*
generum: fœmina, quadam ar-
boris ſpecie fruticans, candi-
cat, circum ramulos foliis, ſe-
riphi modo, minutim inciſis.

A

floribus referta eſt, comantibus in ſummo,
fulgore auri, corymbis. quod per æſtatem
prodiit, ſuauiſſe olet, cū grauitate quadam
& amaro guſtu. id genus Siculum eſſe cōſtat.
Alterum mas vocatur, ſarmentofum, gracili-
bus ramulis vti abſinthium. Plurimū in Cap-
padocia gignitur, & Galatia Aſiatica, atq; in
ſyriæ Hierapoli. Aegineta, Calefacit & ſic-
cat in tertio abſceſſu, digerendi incendiq; fa-
cultate præditum, modicè enim astringit. to-

rov.

Cypres

Auronē

a

ti corpori cū oleo infricatū rigores circuitu remeantes persanat. Stomacho inimicū est. Crematū eo magis siccatur, quod ignem haud expertum est. Alopecias sanat cū aliquo tenuium partium oleo.

αψιθιον
aluisne

ABSINTHIUM, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Aegineta. Cal. 1. sic. 3. Astringit cum amarore acrimoniâque. Humores ventriculi biliosos aluo & vrina pellit: quibus autem pituita redundat, eos propter astrictiōē nihil iuuat. Succus ipsius, herba multo calidior est.

αψιθιον
Barboti-
na &
mors de
vers

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui seriphum vocāt, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cū quadam calfactione astringit. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeò seminis fecundum. Eadem quæ seriphum potest. Aegineta, Seriphium calefacit 2. siccatur 1. Consimile absinthio, minus tamen coastringit, magis calefacit. animalia vetricis oc-

cidit, mediocriter stomacho aduersatur.

ἀκκακία

ACACALIS fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadā tenus similis. Aegin. Eius dilutum collyriis claritate oculorum efficacibus miscetur.

λίσ

ACACIA in Aegypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attolens, florem habet cādidum, & semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus ficcatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, vt in hac arbore esse potest. aliqui exprimunt ex foliis & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile. aculeorū vallo munitur, folia habens rutæ. semen lenticula minus fert autumno, in oculis cōnexis, ternū quaternūve capacib. Succus eius adstringit virib. inferiorib. & ocularib. medicamētis inutilis. Aegineta. Sic. 3. frig. 1. clota autem 2. Acerba & terrestris est.

ἀκκία

ACANTHIUM albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis. ex qua collecta & neta vestes bōbycinis similes texūt. folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Aeg. Calidæ naturæ, & tenuiū partiū est. Conuulsis auxiliatur.

ἀκάνθιον

ACANTHVS, Rom. pæderotā vocāt. nasci-

ἀκάνθος

a ū

brancha tur in hortis, petrosis, & riguis, folia habet
virgula- multo lactu caceis latiora, & longiora, crucæ
 diuisura, nigricantia, pinguis, læuia caulem
 binum cubitorum, digitali crassitudine, læuè,
 prope verticem ex interuallis circūdatum fo-
 liolis, ceu nucamēta quædam oblonga refe-
 rentibus, spinosis: è quibus flos prodit albus,
 semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie.
 radicibus nititur longis, mucosis, rubris, &
 glutinosis. Nascitur & sylvestris acanthus,
 scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa-
 tius, & is qui in hortis prouenit, cuius radix
 ad eadem ad quæ superior efficax. Aeg. Alii à
 nigro foliorum colore melamphyllon appel-
 lant. discutit & siccatur.

erable * **ACER** arbor est tiliæ nõ absimilis forma
 & magnitudine, verum cortice paulo scabri-
 ori, subliuidoque, crasso, & flecti cōtumace.
 Radicib. paucis, sublimib. crispis. materie ve-
 nis longiorib. fluctuante, molli, macilēta, gra-
 cili. Summa soli facie gaudet, facileq; cape-
 sit incrementum, in riguis potissimū. De flo-
 re nasci aiunt fructū paliuro similem, verum
 oblongiorem. Reperiuntur hac in arbore duo
 tubera, vnū brusci nomine, intortius, crispū:
 alterum molusci, sparsum, simplicius, sed ex-
 cellentius priori. Aceris montanū genus cris-
 pius duriusq; est, etiamnū è mascula crispus
 ad lautiora opera. De campestri, id est, galli-
 ca, & zigia, id est, caprino alibi loquimur.

Aceris radix contusa iocineris doloribus utilissimè imponitur.

ACHILLEA, quibusdam Achillea fideritis, dodrantes aut maiores gerit scapos, fusorū effigie, quasi minutulis foliis circūdatos, crebris in latere foliorū sectionibus, coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo nō insuavi, medicato & glutinoso. Umbella in cacumine rotūda, floribus candidis, purpureis, & aurū emulantibus. prouenit læto solo. Aeg. Consimilis est fideritidi Heracliae, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus conuenit. ἄχιλλια
mille-
feuille

ACINOS, aut acanos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis odorata, sed hirsutior. qua coronæ factitantur. à nonnullis olitoribus colitur. Aegin. Menses & aluum pota sistit. illita ignemque panos sacrum sanat. mediocriter astringit. ἄκινος

ACONITON, aliqui pardalianches, alii cammoron, alii thelyphonon, alii myoetnon, alii theriophonon vocant. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulē palmo altum. radix scorpīi caudam æmulatur. & alabastrī modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. qui rursus hellebori contactu, excitantur. oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adicitur. enecat pantheras, lues, lupos & feras omneis in ἄκόνιτον

luparia

carnibus obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria. vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis, læuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in siliquis oblongis recondit. radices in modum squillæ marinæ cirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorate, lupos enecant. Aegineta. Aconitum pardalianches exedentem lethalemque vim habet, quàm ob causam intro nò assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, vt licet. Lycoctonon similes vires sortitū priuatim lupos, vt illud pantheras enecat.

ἄκρος.

Flamme
batarde,
ou glai-
cul de ri-
uiere ou
de mar-
res.

A C O R V M folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Aegineta. Calefacit, siccatur 3. Radice ad

ciendam vrinam lienemque induratum uti-
mur. Corneæ oculorum membranæ crassi-
tiem extenuat.

ACUTASPINA, quàm pirinam aut pi- ὀξυκάν
tyanthen aliqui vocant. arbor est pyraastro si- θα.
milis, spinosa valde & minor. baccas profert berberis
myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nu- offi. spi-
cleum: radicem multifidam, altè descenden- ni vine-
tem. Aegineta. Viribus quoque pyro sylue- tū rura.
stri æqualis est. habet & subtile quippiam
coniunctum. Fructus ipsius myrti baccis re-
spondet.

ADIAANTON, polytrichon, pusilla ge-
rit folia similia coriandri, in summo incisuris
diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro
colore nitet prætenues, palmum alti: radice
superuacua: neq; caulem, neq; fructum, neq;
florem profert. Seritur gratia utilitatis peco-
rum, circa ouilia. Umbrosis, & palustribus,
circa parietum aspergines, & fontium specus
enascitur. Aeg. Siccatur, extenuatur, modicè discu-
tit. Calore ac frigiditate medium est. Alopec-
ciis medetur, tumores digerit, calculos potu
cōfringit, reiectiones pulmonis deficcatur, alui
profluvium sistit.

ἀδίαν-
τον.
capillus
veneris;

AEGILOPS herbula folia tritici habens ἀγίλος
sed molliora, in summo capite semina bina Αυτὸ ou
ternave rubra, quibus aristæ quasi capilla- Coguio-
ceæ exeunt. Aegin. Discutit, indurescentibus le.
inflammationibus, & ægilopi, quæ oculo

rum fistula est, opitulatur.

ÆTHIOPIS folia habet verbasco similia, perquam hirsuta densaque, in orbem circa radicem imā redacta caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut artio, multis cōcauum alis: semen crui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescunt duranturque, ut cornua possint videri. plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aeg. Radicis decoctum potu datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguine excreantibus. item faucium asperitates cum melle lenit.

ἄγἀλλοχον

ἄγἀλλοχον

Indicū lignū Pauli, offic. lignum aloes,

AGALLOCHVM, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute vterius quam cortice vestitur, aliquantulū versicolore. Aegineta. Mansum animæ suauitatem commendat. in suffitum adhibetur. Radix eius pota denarii pondere languidum ex humore ventriculum resolutumque confirmat. Iocinorosis, dysentericis, pleuriticisque opitulatur.

ἄγἀρικον

agoric

AGARICVM radix fertur laserptii similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoque tota cōtextu. Duo eius genera. scemina, quæ præfertur, rectis intus venarū discursibus constat. mas rotundus est, & vndique

compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant. alii vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmū. Ae. Mixta est aërea terrestrique substantia. Vis eius est digerere, & crassos humores incidere. Viscerū maxime obstructions purgando tollit.

AGERATON fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis. umbellam gerit in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti feruēs. huius vstæ, nidor vrinam cit, & vulgæ duritias emollit. Aeg. Digerit, & inflammationes modicè arcet.

AIVGA herba in terra repens, incurua similis folijs serperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circumramos densis, odore pinus, flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cichorij. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, pretenuibus, coma supra dictæ: flore candido: semine nigro. hæc etiā pinum redolet. Tertia mas nominatur, parua, foliis exilibus, albis scabris: caule aspero, cādido: luteis floribus, semine iuxta alas.

ἀγνέρων

χαμαίπυτος

Iua seu Iba offi. & herb. muscharum.

Resipit & hæc pinum. Hæ duæ vim superio-
ris obtinent, sed non vsqueadeo efficacem.
Aegineta. Calid. 2. sic. 3. Purgat & abstergit
viscera potissimū iecur. vrinas mensesq; tra-
hit. magna vulnera conglutinat. Putredinē
expertis medetur, duritias discutit. decoctū
ipsius etiā coxendicū doloribus salutare est.

ἀλκαία.

A L C E A syluestrium maluarū generi assi-
gnatur. folia habens diuisa, verbenacæ proxi-
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabi-
no vestitos: florem rosæ, parū: radices albas,
latas quinque; aut sex, cum plurimum cubita-
les. quæ cum vino aut aqua potē, dysentericis
ruptisq; medentur. Eadem sunt apud Aegi-
netam, nisi quod pro ῥήξας, id est rupta, legi-
tur δήξας, id est erosiones.

ἀλεκτορό-
λοφος.
Oruale
ou toute
bonne.

A L E C T O R O L O P H O S folia habet
similia cristæ gallinacæ, caulem tenuem, &
semen nigrū in siliquis. Solidum semen in o-
culum conicitur, nec turbat, sed in se caligi-
nem contrahit. Mutat enim colorem, ex ni-
gro albicare incipit, & in tumescit ac exit.

ἀλισμα.
fistula pa-
storis &
plātago
aquatic.

A L I S M A, alii damafonion, appellant, fo-
lia ei plātagnis, nisi angustiora essent, lacini-
osa, cōuexaq; in terrā; caule simpliciter tenui
cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui,
candido, pallefcēte: radicibus, tenuibus, vt ve-
ratri nigri, acribus, odoratis, modicē pingui-
bus, aquosos amat tractus. Aeg. Absterforiā
quādam vim obtinet, qua calculos conterit,

& per vrinas e ducit in ventre contenta.

A L Y P O N furculosa herba est, subrubra: *ἄλυπον.*
 gracilibus ramulis: tenuib⁹ foliis: flore mol- Paulo
 li, laui, & copioso: radicæ, betæ, tenui, refer- alypias
 ta acri succo: semine epithymi. gignitur in actuario
 maritimis, maxime Libyæ, quàm largissima. turbet al
 quanquã alibi quoq; plurima prouenit. Aeg. bum.
 Eius semen bilem atram purgat pari epithy-
 mo mensura sumptum cum sale & aceto: ve-
 runtamen intestina leniter exulcerat.

A L Y S S O N fruticosa herbula est, vnicau *ἄλυσσον.*
 lis, subaspera, rotundis foliis: fructu dupliciũ rubia mi
 scutorum effigie, in quo est semen, quadam- nor offi.
 tenus latum. in mōtib⁹ & asperis locis emi-
 cat. Aegi. Quod à cane rabido morsos libe-
 ret, sic appellatum est. siccat, discutit, abster-
 git, renũ meatus aperit: ephelidẽ, quæ aspera
 discolorq; cutis est, ex terit.

A L L I V M quoddam satium atq; hortẽ *σκόρδον.*
 fium habetur. quod in Aegypto, singulari, vt δον.
 portum, capite constat: dulce, in purpureum Ail.
 vergens paruum. reliqua verò magna & can-
 dida, ex pluribus coagmentantur nucleis,
 quos aglitas, id est spicas, Græci nominant.
 aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id
 est anguinum, vocant. Aeg. Calefacit, siccat.
 4. Syluestre, domestico valentius est.

A L N Y S arbor est sterilis, caudice recto, li *κλήθεα.*
 gno medullaq; molli, adeò vt graciliores Aulne.

virgæ concauentur. folio pyri, sed ampliore ac neruosiore, quadamtenus orbiculato virgatoque. Cortice squaroso, foris albicante, intus rufo, qua de causa coria tingit. fructu nullo, cū nihilominus floreat. Radice summa, nec quā laurus maiore, tenui. in planā descendit, aquosisque gaudet, quanquam ancipitem agat vitam. Infelix habetur ceu scopis tantum nata: verum ad naualia quoque materies eius commēdatur. Non potest extra terram paulum tēpus edurare, sed in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Suppurationes folia discutere tradunt.

ἀλός.
perro-
quet & ἴς
peruiū
marinū

A L O E S folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum, folia vtrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia & curta. caulis emittitur nō dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiae cognatus. graui tota est odore, & gustu amariss. radice vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiā in Asia & Arabia, in locis quibusdā maritimis: & in insulis, vt in Andro. non valdè succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quā utilis si detrita illinatur. Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocinoris imaginē vergit. Eligi debet boni odo-

Caballi-
nū offic.
succotri-
nūm.

ris, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iocinoris modò coacta, facile liquefcens, eximigamaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax. Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: coq; argumento, quòd digitis friata non ad minima vsque frusta resoluitur. Nec desunt qui acaciam immisceant. Aeg. Cal. i. sic. 3. Stomacho utilis est. abstergit, discutit. Ventris excrementa subducit. Lora quidem detergit minus, sed magis stomacho cõfert, & inflammationem prohibet, vlceribus cicatricẽ inducit, præsertim sedem & naturalia instantibus.

A LOPECVROS specie tota similis est ἀλοπίκο-
tritico, verum folio latiore. spica plantaginis ρος
hirsuta, molli, lanugine densa, nullis acerib⁹ frumētū
aut aristis armata, nō dissimili vulpium cau- caudatū
dis, vnde ei nomen. Radix est articulata, ex
cuius nodis emicant folia pinnata.

A LSINEN, aliqui anthyllion, nonnulli ἀλσίνη.
myosota vocant, quoniam muscutorum au- μουτον.
res folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet,
vnde alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ
helxine, nisi humilior esset, & folijs longio-
ribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucu-
mis reddit. Aeg. Refrigerat & humectat vt
helxine, ad feruentes inflammationes utilis.

ALTHEA, quam alij ibiscum vocant,

ἀλθαία. in syluestrium maluarum genere est, cui fo-
 Maulue lia ut cyclamino, rotūda, lanugine canescūt:
 faulua ge flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta,
 offic. bis- intus alba Althēa appellatur, quōd inter pri-
 malua, mas sit utilis, & pluribus polleat remediis.
 vulgo Aeg. Discutit, laxat, inflammationē abigit,
 maluaui lenit, phymata concoquit. Radix & semē re-
 sce & gui liqua sanē intēsa habent, & vitilignes quoq;
 mauues. abstergūt. Prēerea semen calculos cōfringit.

A M B R O S I A tenuis frutex est, ramosus,
 trium ferē palmorum: foliis rutæ, circa imū
 ἀμβρο- caulem exiguis. cauliculi seminibus, perinde
 σία. quasi racemulis grauidi, qui nunquam florē
 Hęc est pariūt, odore vinoso, suauis, radice tenui, ses-
 herbario quipedali. Coronātur ea Cappadoces. Aeg.
 rum est Vis eius reprimere ac repellere, & illitu ad-
 polemo- stringere humores, qui in aliquam partem
 niū non incumbunt.
 ambro-
 fia.

A M M I, Aethiopicum cuminum appel-
 lant. Plerique hoc natura diuersum esse ab il-
 ἀμμι. lo existimant. Vulgō notum est: semen exile
 offi. am- multo minus cumino, organū resipiens. Eli-
 meos. gendum est purū, minimē surfurosum. Aegi-
 neta, Calcfacit, ficit 3. Particulas habet te-
 nues, discutit, vrinam mouet, prēcipuē semē.

ἀμμωνί- A M M O N I A C U M ferule succus est, quā
 ακον iuxta Cyrenen Aphrica gignit, cuius fruticē
 Gumme cum radice agasillim vocant. Probatum bene
 ammo- coloratum, ligni & calculorum expers, thu-
 niac. ris similitudine, minutis glebis, densum, sin-

cerū, nulla sorde spurcatum, castoreū odore imitās, gustu amarū. hoc genus thrausma, id est, friaturā appellant: quod verò terrā & calculos collegit, phyrā. gignitur in Africa iuxta Ammonis oraculum, succum, stillante ferulacea arbore. Aeg. Adeo mollit vt scirros & tophos discutiat.

AMOMVM, exiguè fruticat, ex ligno se cōuoluēs in racemi modū: flore, seu cādidę violę, paruo: foliis vitis albę similibus. Laudatur q̄ maximè Armeniacū, fuluo auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā in cāpestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autē magnū, subviride, tactu tenerū frutice venoso, odore origani. Ponticū verò subrufum, parū, fragile, racemosū, fructu turgēs, & odore nares feriēs. Deligito recēs, candidū vel subrubrū, quod nec astrictū cohereat, nec cōuoluatur: sed solutū diffundatur, seminis plenū, vis paruis simile, graue, odoratū, modò cariē non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore nō euariāte. Adulteratur herba amomo simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem quæ ab vna radice integros surculos emittunt. Aeg. Acoro virtute respondet, minus eo tamē siccāt, ampliusque maturat.

ἀμωμον
non est
offic. pes
colūbin⁹

**ἀμπιλό-
πρασον.** **AMPELOPRASVM** stomacho magis
porreau, aduersatur. & plus porro excalfacit. urinā &
ouail sau menses venementius ciet. id contra serpentium
uage, morsus esse conuenit. Aeg. Porrum hoc syl-
aux vi- uestre acerrimum calidissimumque est, exul-
gnes cerat, incidit, viscerum meatus recludit, sto-
macho inimicum.

**ἀμύγδα-
λα** **AMYGDALA** quæ quidem amara sunt
Amâdes. extenuant, viscosos crassosque humores al-
tius herentes meatus recludendo educunt, tū
in cutem erumpentes abstergunt. Arbor ean-
dem vim repræsentat. At dulcia amygdala
moderato calore donata sunt. Aeg.

**ἀνακάρ-
διον.** **ANACARDIVM** recentiori Græciæ,
Anacar- nam vetus non meminit huius, arbor est In-
di offici. dis familiaris. provenit quoque in Siciliæ mon-
tibus, qui flammæ ignis eructant, fructu aui-
culæ corculo non dissimili, unde nomen pu-
tatur inditum: rubente intus cruore, quo ve-
luti sanguine scatet. Calidum. sic. 3. Me-
moriam iacturam resarcit. Labantes sensus re-
fricat. Mentem exacuit. morbis cerebri, quos
frigida vel humida causa attulerit, opitula-
tur. Nervorum resolutioni auxilio est. Sani-
es quæ in fructu condita manet, verrucas de-
let, cæterum cutem exulcerat. Scabiem usu creat.
Iuuenibus & biliosis ob caloris vim eo in-
terdicitur.

**ἀνάγαλ-
λιν** Duo **ANAGALLIDIS** genera, quæ tã-
tum flore distant. nam quæ cæruleo flore est,
fœmina

foemina dicitur: mas, quę phœniceo. frutices Morgell
sunt parui, in terra iacētes, folijs in quadran- ne non
gulo caule pusillis, subrotundis, ad helxing mouron
folia accedentibus: semine rotundo. Aegin. ou pauc-
Vtraq; vim habet abundē abstergentē, subca rine.
lidam & attracticem nonnullam, vt etiam
aculeos euellat. Succus naribus instillatus ca-
put purgat.

ANAGYRIS, frutex est arboris instar, ἀνάγυρις
grauis odore: folijs agni, virgisque: flore boispuar
brassicæ. semen in corniculis non breuibus
gignit, subrotundum, firmum, versicolori
facie, simile renibus, quod durefcit vna ma-
turefcēte. Aegineta, Acris est, calefacit, di-
scutit. Semen tenuiorum partium, & vomitui
ciendo est.

ANCHUSA, quę alio nomine calyx, aut
onoclia appellatur, folia habet lactucae in a-
cumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, mul-
ta, quoquouersum humi, spinis horrida: ra-
dici crassitudo digitalis. quę æstate prouenit
manus inficit sanguineo colore. læto solo na-
scitur. Est & altera, quam aliqui alcibiadion,
aut onochiles appellarunt. hæc à priore di-
stat, quod minora habeat folia, sed simili
modo aspera: ramulos exiles: florem purpu-
reum in puniceum vergentem: radices ru-
bras, oblongas, quæ mēsisibus sanguineum
succum fundunt. in sabulosis nascitur. Est &
alia huic haud dissimilis, semine puniceo,
b

ἄρχουσα
Orcha-
nette.

minore. Aegineta, Onocleæ radix astringendi vim habet, & quiddam subamarum, ad lienis renumque dolores efficax. Cum polenta illita erysipelatis succurrit. Folia radice minus refrigerant desiccantque, ad alui profluvium bibuntur. Onochelos seu alcibiadios medicatior quodammodo, viperarum moribus succurrit in cibo potuque, & alligata. Tertia reliquis breuior sine nomine fere, amarior alcibiadio. Latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

A N C H V S A lycopsis alio loco sequetur.

ἀνδρόσακ-
κος.

ANDROSACES herba est amara, tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Aegineta. Amara & acris est, discutit, siccat. Vrinam potu promouet vel herba, vel ipsius fructus.

ἀνδρόσαμ-
νον.

ANDROSAEMON ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis: & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complureis alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnatasque: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semē papaueris nigri, insignis lineis. Aeg. Androsæmon genus alterum ascyron, vel ascyroides nominatur specie hyperici, al

terum dionysias. fructus ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

Duo ANEMONES genera, vnum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species. vna phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro similia, tenuioribus propè terram diuisuris, caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermèque geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium putet: quoniam à sylvestri anemone, argemonen & papauer quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. in super anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt. sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones ge

ἀνμώνη.
herbe au
vent. eius
flores, co
cles & co
quelour
des.

nera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. in aruis illa sæpius enascuntur. Aegineta, Anemonæ omnes vim habent acrem absterfioriamq; , ex-
 extrahunt, ora vasorum recludunt, pituitam per hos purgant, lepras tollunt appositu, & lactis faciunt vbertatem.

Passif.
 fleur.

Anemone, apud Theophrastum, flos coronarius sylvestrium bulborum, post Narcissum vere exit.

ἄνθος.
 Anct.

ANETHVM calefacit & exiccat in secundo ordine intenso, siccat paulo remissius, qd̄ in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat. Vstum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, humentibus vlceribus vtiliter illinitur. Viride quoniā humidius minúsque calidum est, non ita maturat.

ἄνισον.
 Anis.

ANISMVM melius semper recens, plenu, non furfurosum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Aegineta, Eius semē acrius est. Cal. sic. 3. hinc & urinam mouet, & flatus discutit.

ἄνωσις.
 Arreste
 beuf, ou
 bugrauc
 & bugra-
 de.

ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequētibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, foliis lenticulæ, pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non

iniucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat, cibus gratissima. rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. radicem mittit candidam. quæ excalfacit, & extenuat. Aeg. Succus cum vino potus urinam ducit, calculos cõterit, crustas rumpit, & dentes mitigat.

ANTHEMIDIS genera tria, tantũ flore distantia: rami dodrantaes, fruticosi, alis multis contau: tenuibus foliolis, paruis, numeroſis: rotũdis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rute. nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur vere. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehemētius urinā ciunt. Aegineta, Calefacit siccātque in primo ordine. Virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

ἄνθεμις,
Nielle.

ANTHYLLIS duplex est. quædā enim lentis simillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nasceitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis ramulisq; aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris ad-

ἀνθυλλίς
Salsola &
sel alkali

modum grauis: radice cichorii. Aeg. Vtraq;
vlcera perficcat. Quę vtrò chamępityi respō
det, tenuior est, comitialibus competit, effi-
caciū abstergit.

ἀντίρρι-
νον

Oil de
chat ou
moron
violet.

ANTIRRHINON, alii anarrhinon vo-
cant, herbam caule & foliis anagallidi simi-
lem: flore albę violę, purpureo. ideoq; sylue
stris anagallis nominata est: semine vituli na-
rium simili. Aeg. Per similem Inguinarię siue
Asteri Attico vim obtinet, sed minus effica-
cem. itaque ex illo hoc quoque cognosces.

ἀπαρίνη.
Grateron
offi. asp-
gula, &
ruella.

APARINE ramis multis & paruis fru-
ticat, asperis, quadrangulis, per interualla or-
biculato foliorum ambitu, vt in rubia. flos
albus: semen durum, rotundum, concavum,
album, vmbilici figura, asperitate vestiū te-
naci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximē-
dos ē lacte pilos. Aeg. Hanc alii philanthro-
pon, alij omphalocarpon appellant, modicē
abstergit & deficcat, aliquam partium tenui-
tatem habet.

ἀφάκη.
vesse saul
uage.

APHACA in aruis nascitur, altior lente,
tenuibus foliis. filiquas lēticula maiores fert,
in quibus terna quaternāve semina nigra, lē-
te minora, continētur. Aeg. Lenticulę modo
astringit: sed manducata egrius cōcoquitur,
valentius siccat, mediocriter calefacit.

μελισσό-
φυλλον.
Me lisse.

MELISSOPHYLLON siue melittēna,
id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit,
quoniam apes ipsa herba delectantur. cauli,

culi & folia balloræ, de qua paulo antè dixi- quanquā
mus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nō sicut hoc
nec ita hirsuta spectarentur. citreum malum apiastrū
olent. Aeg. Viribus marrubio per omnia re- Ruellio
sponder, sed multo infirmius est.

A P I O S iuncos duos siue tres spargit, ru ἄπιος,
bros, tenues, qui à terra parum attolluntur: ἰσχάρι
foliis rure, oblongioribus tamē, & angustio-
ribus, herbaceis: semine paruo, radice hastu-
læ regię, in formā pyri turbinata, rotundio-
re tamen, succi fœcunda, intus habet corpus
candidum, extrà cortices nigros. Superior
pars eius vomitione bilem pituitasque ex-
trahit, inferior per aluum. tota vtrinque
purgationes mouet. (Aegineta. non me-
minit.)

Hortensis A P I I herba ad eadem ad que σέλινον.
corianum conuenit. Aeg. Tanti caloris est ut Persil.
vrinas & menses eliciat. flatus discutit, præ-
sertimque eius semen.

A P O C Y N O N, siue cynocrābe, braf- ἀπόκυνον
fica canina, frutex est paruis viticulis con-
stans, male olentibus, lentis, vitiliūmque mo-
do obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio he-
deræ, molliore tamen, & per extremum acu-
tiore, lento, graui odore. id luteo succo tur-
get. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie,
digiti lōgitudine protēduntur: semine intus
albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes co-
acta, canes, lupos, vulpes, & pātheras enecāt

b iiii

in cibo data, & protinus eorum coxendices
resoluunt. Aeg. Dicitur & cynomoron quod
celerrimè canes enecet, homini etiam vene-
nosa. Calida citra siccitatem est, vnde etiam
digerendi facultatem illita representat.

ῥοσκήα·

μωσ.

Apollina
ris lat. of
fic. iusq̃ a-
me ou ha
nebane.

HYOSCYAMVS, frutex est caules emittens
crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hir-
suta. flores è latere caulis, ordine prodeunt,
ris lat. of tāquam puniceorum cytini, scutulis septi se-
fic. iusq̃ a- minum plenis, vt papaueris. Tres eius diffe-
me ou ha rentia: vna semine nigro, floribus penè pur-
nebane. pureis, similacis foliis, cytiniis præduris, & spi-
nos. alterius semen subflauū, vt irionis: flo-
res lutei. folia, & filique simpliciores. ambo
insaniam gignunt & soporem, ideo in com-
muni vsu damnatur. tertium genus, vt quod
mitissimum esset, medici recepere, pingue,
lanuginosum, molle, candidi floris seminis-
que, in maritimis rudibusque nascēs, cuius
ocasio si non adsit, rufum vsurpari oportet.
niger, vt deterrimus, improbatur. Aeg. Quo-
rum semen nigrum aut flauum est, venenosa
sunt. accommodatissimū verò curationibus
quod & semen & florem candidum habet ex
tertio refrigerantim ordine.

APPENDIX spina Plinio dicitur, quo-
niā bacce in rutilo colore pendeant, appen-
dicēsque vocentur. Hæ crudæ, per se, & aridæ
in vino decoctæ aluū citant, & tormina com-
pescunt. (Pro citant melius legetur citam.

ARABIS eadem quæ Draba.

κόμαρος

ARBUTVS siue vnedo arbor est coto- Pomme
neæ malo nõ dissimilis, tenui folio. cuius fru de bo-
ctus pruni magnitudinẽ implet, nullo intus chet ou
nucleo. huic memæcylo cognomen est. ma de boys
turus aut flauet, aut rubescit. in esu acerosus.
Aegineta. Stomacho aduersatur, capitisque
dolorem mouet. acerbæ qualiratis est & ar-
bor, & fructus.

ARTION, aliqui potius arcturon vo- ἀρκύριον
cant, similis est verbasco folius, nisi quod hir Lappa
sutiora & rotundiora sunt: caule longo, mol- minor,
lis: semine cumini, paruo. radice tenera, alba,
dulcique Aeg. Vis eius est tenuis, siccans &
mediocriter adstringens.

ARGEMONE in totum syluestri papa- ἀργεμόνη
ueri similis est. folia habet anemones, diuisa: Non est
florem puniceũ: caput in cauliculo papauæ- agrimoi-
ris rhæadis, oblongius, & summis partibus ne vulg.
latum: radicem rotundam. succum croci co-
lore, acré, dimittit. Argema & nubeculas ex-
purgat. folia illitu inflammationes cõpescunt.
Aeg. Abstergit simul & discutit.

ARISARVM exigua herbula est, cuius ἀρίσαρ
radix oleæ magnitudinem implet, longè ma ρομ.
ioris quàm aron acrimoniæ. Vnde illitu no-
mas sistit. sunt colyria ex ea, ad fistulas effi-
cacia. illitu radicis, genitale animalis cuius-
cunq; in perniciem agitur.

ἀριστολόχια

ARISTOLOCHIA nomen ex eo sibi χία

adoptauit, quòd existimetur optime puerpe-
ris opitulari. Tria eius genera traduntur. ro-
tunda, quæ fœmina vocatur, foliis hedera-
ceis, præstanti odore, cum acrimonia, molli-
bus, subrotundis, multis ab vna radice germi-
nibus, prælongisque palmitibus: floribus cã-
didis, pilei similitudine, in quibus quod ru-
brū est, grauiter olet. Longa, mascula appel-
latur, nonnullis dactylitis, longiore q̃ rotun-
da folio tenuib. ramulis, dodrantalibus: flo-
re purpureo, grauiter olente, qui marcescens
in pyri similitudinē turbinatur. radix rotun-
dæ, in orbem conglobata, rapi modo. longē
verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis
longitudinē implet, nonnunq̃ paulò maiore
ambæ colore intus buxco, gustu amaro, &
grauī. Est etiamnum tertia longa, quæ clemat-
itis vocatur, ramulos habēs tenues, refertos
foliis subrotundis, minori semperuiuo simi-
libus: flores rutæ: radices longiores, tenues,
crasso cortice odoratoque vestitas, priuatim
vnguentorum spissamētis cōuenientes. Aeg.
Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergēs,
amara, & subacris, ad medicinas utiliss. Ro-
tunda, partibus tenuior, & in omnibus effica-
cior est. Clematitis, odorata quidem, sed im-
becillior. Longa verò in aliis media harū est,
sed non minus calida quàm rotunda.

ἀμυγδα-
νά.

AR MENIACAE mali fructus, quæ
Abricoz nunc vocant mala præcocia, consimileis per-

ficis vires refert. Galenus.

ARNABO (aliis carnabum vel carnabadium, item zarnabum vel zarnabadium) ex aromatis habetur, ob quod vnguentis potissimum temperatur. Calefacit, ficit. 3. Casia & carpesio simile est. Vnde Possidonius, Vbi cinnamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis, ramisque huius quidem genera duo. vnum latius habitiusque: foliis virgisque latioribus. alterum tenuius flore paruo, tenui, candido, graeuolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellent, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scattente, flauo colore. hæc iucundior quam præcedens efflat odorem. Aegineta. Vtraque Cal. 2. sic. 1. Tenuis adeo substantiæ est vt renum calculos comminuat, & vteri fomentis rectè accommodetur.

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie. à quo croceum semen exit. radice dracunculi alba. quæ decocta estur, vtpote cū minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur. & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen & folia,

ἀρνάβω.

ἀρτεμισία.

Armoise

ἀρον.

Pied de
veu ou
serpētai-
re petite.

dracūculi vires habent. Aegineta. Cal.fic.i.
Substantia cōpositum est, terrestri calida &
adstringente, radices ipsius calidiores sunt,
dracunculo inferiores.

ἄσπεριν

Bacara
ou caba-
ret nō ta-
men est
bacchar

ARVND O. vide Harundo.

ASARVM, quod & ipsum aliqui sylue-
stre nardum appellant, hederæ foliis, minori-
bus multò rotundioribusque, floribus cytini,
hyoscyami, purpureis, inter folia proximè
radicem emicantibus, odoratis, in quibus se-
men acinosum. Cauliculos habet angulosos,
asperos, & molles: radices numerosas genicu-
latas, tenues, obliquas, gramine non dissimi-
les, longè tamè graciliores, odoratas, excal-
facientes, & quæ linguam vehementer mor-
dent. Umbrosis montibus provenit, sed pluri-
mū in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ lu-
stinienfi agro. Aegineta, Similem acoro vir-
tutem obtinet, sed magis intensam.

ἀσκλη-
πιάς.

Hedera-
lis simili-
tudine.

ASCLEPIAS, ramos emittit longos, fo-
lia hederæ, longa: radices numerosas, tenues,
odoratas floribus virus graue. semen securidia-
cæ nascitur in montibus. Aeg. Callida, sicca,
& tenuium partium, torminibus cū vino po-
ta competit. Venenatorum moribus, & ma-
leficis mammarum muliebriumq; locorum
vitiis illinitur.

ἄσπερον.

ASCYRVM siue ascyroides, hyperici ge-
nus est, magnitudine distans, fructuosius
maiores habens ramos, surculosiores, ruben-

tesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimilē. cuius attritu digiti ferē cruentantur, qua de caufa androſemum vocauere. Aegineta, Facultas eius in androſemo prædicta eſt.

ASPALATHVS, alius eryſiſceptron, frutex eſt ſurculofus, multis ſpinis horrens. naſcitur in Iſtro, Niſyro, Syria, & Rhodiorum inſula. quo ad vnguentorum ſpiſſamenta pigmentarij vtuntur. Optimus eſt grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram vergēs, denſus, odoratus, guſtatu amarus. Eſt & alterum genus candidum, lignoſum, ſine odore, quod deterius habetur. Aegineta, Diſſimili conſtat virtute, acri & aſtringente, & vtraque ſiccante: iccirco & putredini, & fluxionibus vtilis eſt.

ἀσπάλα-
θος.
Rodium
lignū, ou
Rodoē
offic.

ALTIſ asparagus multis ramis fruticat, foliis fœniculi, longis, numeroſis: radice rotunda, grandi, ſpongiam habente. Corruſa ſine ſylueſtris asparagus vulgaris eſt notitiæ. Aegineta, Asparagus petræus aut myacanthinus abſtergit vtrique, ſed calore, & frigidityate medius eſt, renes & iecur obſtructionibus liberat, præſertimque radices & ſemen. item dentium doloribus medetur.

ἀσπάρα-
γος.
offic. ſpa-
ragus, af-
parge.

ASPHODELVS. Vide haſtula regia.

ἀσπληνός

ASPLENVN, aliqui ſcolopendriion vocant, alij ſplenion, alij hemionium, foliis eſt multis, ſcolopendre animali ſimilibus, ab ra-

Ceterah
ou citha-
rac, offi.

dice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque filiceis, & opacis. caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ modo diuiduntur, subter flauescentia hirsutaque, supernè vitidia. Aegineta. Substantia quidem est tenui, nō tamen calidum, qua ratione calculos confringit, & lienes cōsumit.

ἀστέρας

γικός.

βανβώνιον.

Aspergula

minor

aliquib⁹.

ASTER Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habēs purpureum luteūve, & in ambitu diuisum, anthemidis modo capitulum sed ea quæ caulem ambiunt folia stellæ modo radiata, oblōga, hirsuta. Aegin. Inguinalem vocant, quia bubonibus prodesse creditur, non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiā. Mixta est virtutis, digerentis & refrigeratoria.

ἀστράγαλος.

Cices

faulua-

ges.

ASTRAGALVS paruus à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flore purpureo paruo, radice rotundas raphani modo grādi, quæ ad natas appēdices firmas habet. nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arcadia scætet. Radix ægrè propter duritiam tunditur. Agin. Non ignauiter deficcat, radices habet astringentes: vlcera vetusta ad cicatricem perducit. aluum fluētē radix in vino potafistit.

ἀτρακτύλις.

ATR

ACTYLIS, spina est cnico similis, folia multo lōgiora ferens in summis virgis,

magna parte nuda asperaque, qua fœminæ Cartam⁹ pro fusis vtūtur. capitula in cacumine spinis sylvestris horrent. flos luteus: quibusdam in locis pur- offic.
pureus inuenitur. radix tenuis, superuacua.
Agineta. Vocatur & cnicum sylvestre, vi sic-
cante & mediocriter calida.

ἀγρίφα-

ATRIPLICEM aliqui chrysolacha·
non vocant. cognitum olus est. Duo eius ge- Arroche
nera, sylvestre, & satium. coctum estur vt o-
lus. Aeg. Hum. 2. fri. 1. Ventrē mollit, semen
ipsius vi pollet abstersoria, vnde ictericis ex
iecinoris obstructione accommodatum est.
(De Chrysolachano vide infra.

A VENA genicula quædam habet. folio
& stipula triticum imitatur. & in cacumini-
bus dependentes paruulas veluti locustas bi-
pedes gerit, in quibus semen cōtinetur. Aeg.
Similem hordeo obtinet facultatem. Siccatur
& modicè citra corrosione discutit. astrictio-
nis quoq; cuiusdam compos est, vnde & alui
profluuiis subuenit.

βρώμος.

Auoync.

MVRIS auricula, quā myoshotida vocāt,
herba est caulibus pluribus ab vna radice, a-
liquatenus ab imo rubētibus, & concavis fo-
liis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, ni-
gricātibus, per interualla assidue geminatis,
atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus
cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flo-
re, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali
crassitudine, multis capillamentis fibrata.

μυοσῶτα

**Vt vult
ruellius** Radix illita ægilopia sanat. Sūt qui alfinen,
muris auriculam vocitent. (Aegineta: nō re-
recenset aliam quàm alfinen suprà dictam.

B

βήχα-**σις.****Gans de
noître
dame.**

B

A C C H A R I S herba frutico-
sa, quæ in coronas additur. cu-
ius folia aspera sūt, media vio-

læ & verbasci magnitudine: caulis angulo-
sus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum
asper, nō sine appendicib⁹ adnatis: flore pur-
pureo. subalbicante, odorato: radicibus vera-
tro nigro similibus quib⁹ odor inest cinna-
momo proximus. Asperū squalidumq; solū
amat. Aegin. Herba est acris. radicis decoctū
meatus obstructos aperit, urinā & menses ci-
tat. folia ipsius cum sint astringentia fluxio-
nibus opitulantur.

βελαν-**σιον.****Des ba-
laustres**

B A L A V S T I V M sylvestris punici flos-
est, cytino similis. Cuius cōplura genera re-
periuntur, candidum, fuluū, colore rosaceo-
succus ex eo exprimitur, hypocistidis mo-
do, cui adstrictoria vis inest, eadem faciens
quæ hypocistis, & cytinus. Aeg. Valde astringit,
sicca & frigida facultate præditum. Sum-
mæ cutis vlcera ad cicatricē perducit, & de-
stillationes cohibet.

βαλλων.**Bublaete
offic.**

B A L L O T E N, nomine alio nigrū mar-
rubium vocant, caules edit quadrangulos,
nigros, subhirsutos, complures ex vna radi-
ce: foliis maioribus quàm marrubij hispidis,
intercedente spatio, subrotūdis, graue olen-

tibus, apiastro p̄ximis, vnde aliqui apiastrū marrubī-
cam vocauerunt. candidi flores vniuersi ver- astrū ou
ticillato ambitu caulē coronāt. Aeg. Acris est nigrum
& absterforiæ facultatis, imposita cū sale ra- marru-
bidi canis morfibus medetur. bium

B A L S A M V M, arbor albę violę, licij, si-
ne pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Fo- βάλσα-
liū rutę proximū, longē candidius, perpetuū μον.
virens: in Iudæa solū quadam valle & Aegy- Balsme
pto nascens, his differēs modis, scabritia, p-
ceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & ca-
pillacea coma est, theristum vocāt, quasi de-
messile. fortassis quoniā ob gracilitatē facile
demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardorib.
arbos vnguibus ferreis inciditur, magnāq; ē
plaga succus, quem opobalsamū vocant. sed
tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plu-
res quidē quā senī septē mve congrī cogan-
tur, inibiq; pondus duplo repēditur argēto.
Succi probatio est, vt sit recēs, validi odoris,
sincerus: non ad acorē vergens, dilui facilis,
læuis, astringens, ac modicē mordens gustu.
Sed variē vitiatur, misto ab aliquibus terebin-
thi, cypri, lentisci, balani vnguento: item su-
fino, metopio, melle, aut Cypria cera liqui-
da. quod maleficio facile deprehenditur.
Namq; merus in laneam vestem fusus, neq;
maculā facit, neq; si eluatur notā relinquit:
vitiatus autem inhæret. & lac instillatus coa-
gulat, quod adulteratus non efficit. Quine-

tiam sincerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloréque lactescit: vitiatuſ verò olei modo innatat, ſe conuoluens, aut in ſtellæ modum diffundens. Sinceruſ ſenſcens craſceſcit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum peſſum ire, & ad ima ſidere arbitrantur, poſtea diſſipatum ſupernatant. E ligni genere, quod xylobaſamũ vocant, probatur recēs, ſarmēto tenui, fuluum, odoratum, quadam tenuis opobaſamum ſpirans. Neceſſariuſ etiã ſeminis erumpit uſuſ. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderoſum, mordens guſtu, feruens in ore, modicè opobaſamũ olens. Adulteratur ſemine hyperico ſimili, quod à Petra oppido deferitur. Sed coarguit magnitudine, inanitate, virium ignauia, ſapore piperis. Aeg. Baſami, quod veluti lignum eſt ficcat & cal. 2. Subtilem habet ſubſtantiam. liquor autem multo tenuior eſt: fruſtuſ proximè hunc virtute accedit, ſed minus tenuiſ eſt.

τρικωρό
γων.

Herbarij
ab hac a-
liã oſten-
dūt, nō ſi
ne errore

βαλ-
λίων.

B A R B V L A hirci, quæ ab aliis come vocatur, breui eſt caule: foliis croci: radice longa, dulci ſupina: magno ſuper caulem calyce, è cuiuſ ſummo ſemen nigrum dependet, vnde nomen inditum eſt. herba eſui apta eſt. (Aegineta nō memorat.) Vide plura in Tragopogone.

B D E L L I V M alij bolchon appellāt, alij madercon lachryma eſt ſaracenicæ arboriſ,

Probat^{ur} gustu amarū,translucidum,taurini glutinis in morē.intus pingue,liquefcēs facile,ligni ac sordis expers suffitu odoratū, vngui simile. Est etiamnū bdellij genus sordidum,nigrū,vberiorib.glebulis in offas cōuolutum,aspalathi odore,ex india aduectū.defertur etiam à Petra oppido ficcū,resinosum liuescens, sed facultate secūdum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatū non perinde gustuī amaritudinē reprēsentat, nec vsq; adeo suffitionibus odoratū. Aeg. Tum Scythicū, tum Arabicū scirros emollit, præsertimque recen^{ti}a. Arabicum verò vrinē ciendæ est, calculos comminuit, maturatque.

BELLIS, qui & bellius dicitur, flos est praten^{sis}, pastilicātibus quinquagenis quin^{is} barbulis coronatus. Plinius.

βελισ
Margue
rites

BETA duorū generū est. ē quibus nigra coquitur cū lenticula, vt ventrem sistat. quod magis radice eius pręstatur. cā dida aluo utilis est, vtraq; tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se noxii succi est. Aegin. Nitrosam vim habet, qua ab tergit, discutit, per nares purgat. Alba elixa plenius, inflāmatiōni arcēdæ fit idonea, modicūmq; discutit.

πιτυλον
Bette ou
iotte ou
poree

CESTRON psychotrophon vocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini betonicam appellant. herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quā dratū: folia quercus mollia, longa, in ambitu

βετονικη
Betogne
ou be
toine

c ii

diuisa, odorata, prope radicem maiora, in
 summis caulibus, semen veluti satureiæ spica
 tum inest. Aegin. Betonica herba est ramulis
 exilibus, pulegio similibus: sed tenuioribus,
 & propemodum si gustes, nullam qualitatē
 referentibus. Nascitur potissimū locis petro-
 sis, qua & in renum medicinis vtūtur. Est au-
 tem apud Romanos alia quædam betonica
 dicta, quā Dioscorides nominat cestron, alij
 verò ptychotrophon, eò quod frigidis locis
 gaudeat, nihil simile cum prædicta habet,
 præter actionem. Vrinam ciet, & aliis multis
 benefacit, potissimūmq; radix ipsius cum hy-
 dromelite pota vomitionem mouet, folia
 aluum subducunt.

σημύς
 Bouleau

B E T V L A Gallica est arbor, folio fagi-
 no, paulò angustiori, cortice verficolori, ma-
 terie læui, non nisi ad baculos vtili. mirabili
 candore atq; tenuitate, terribilis magistratuū
 virgis, eadem circulis flexibilis: itē corbium
 sportis & ligaturis vtilis, scopisq; Bitumen
 ex ea Galliæ excoquunt. gaudet frigidis. Scu-
 tis item faciundis apta, quod plaga cōtrahit
 se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id
 contumacius trāsmitit ferrum. vñs eius in-
 ter medicos adhuc nullus est.

B L A T T A R I A adeò similis verbasco
 est, vt sæpe fallat pro ea capta, foliis minus
 cādidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc
 abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Rom.

blattariam vocant. Plin.

BLITVM estur oleris modo. aluo vtile est, βλίτονι
nullius in medicina vsus. Aeg. Hum. frig. 2. Blette ou

BOLETI fungorū generis sunt, reliquis espinars
minus nocentes, qualitatis expertes, si probè Potiron,
coquantur, secus periculi occasionē præbēt. champi-
Amanitę dicti secundum ab his ordinē obti- gnon
nent. Aliis fungis abstinēdum, pleriq; siqui-
dem ipsorum lætales. Aegineta.

BOTRYS fructicosa herba est, lutea tota, βότρυν
& in multas alas sparsa. semen circa totos ra- Du py-
mulos prouenit: folia cichorio similia. tota men
suauem odorem spirat: quare vestimentis in-
terponitur. inuenitur in torrentium ripis, &
conuallibus. Pota orthopnœas mulcet. Hæc
Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemi-
siam. (Idem apud Aeginetā, nec plura.)

BRASSICA quæ edendo est siccat, & κράμβη
māducata, & à foris imposita, nō tamen acré Choulx
cōspiciuē vim ostendit, eoque vulnera gluti-
nat, & dolosa malignaque vlcera, ac tumores
solui contumaces persanat. habet & iam nō-
nihil absterforiū, quo lepras exterit. Semen
ipsius potum lumbricos occidit, præsertim
Aegyptiæ. Caulium crematorum cinis ad-
turente vi constat, cum adipe longis laterum
doloribus utilis. Aegineta.

Marina BRASSICA à satiua prorsus ab- κράμβη
horret, quòd folia ferat retūdæ aristolochię, θαλασσία
prælonga, tenuia. singula à ramulis rubētibus Soldana
vulgo. vulgo.

excūt, singulariue hedera, pediculo. albo succo prædita est, sed pauco, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. coquitur propter acrimoniam cū pingui carne. Aeg. Subfalsa leuiterque amara aluum soluit.

αράμβκη
ἀγρία,

Syluestris **B R A S S I C A**, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara, cuius cyma in lixiua cocta ori nō insuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresque discutiunt. Aegin. Satiua in omnibus validior est, vnde nec intra corpus citra noxam sumitur.

Βρίτανικη.

Quibusdā lapathū acutū, quibusdam bistorta

B R I T A N I C A aut **vetonica**, folia habet syluestris lapathi: sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia, radicē tenuem & breuē, caulem parū emittit. Foliis exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Aeg. Astringit & conglutinat, succus ipsius putredines os infestantes per sanat.

Βούγλωσος.

Bocache ou lāgue de beuf

B V G L O S S V M nascitur in cāpestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur, verbasco simile est, foliū in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Aeg. In vinum decoctum, animi voluptates auget. Humidū calidūque temperamento est.

Βουλάπαθον.

B V L A P A T H V M à reliquis radicis tantū altitudine differt, efficacis erga dysentericos

effectus, si bibèrint ex vino.

oil de

B V L B I N A foliis est porraceis, flore violæ purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine foris, rubicundo radicis bulbo, intus candido, squamis carente. Bulbinas Digimus philus tradit meliorem bulbis creare succum, non tamen ita gratas utilisque stomacho, quod dulcescentem in se quadam crassitiem contineant.

beuf

βολβίνη

Buberi-

gim

Esculentus B V L B V S vulgò cognitus, à nobis estur. stomacho & aluo utilis rufus, qui & ex Aphrica defertur. amarus verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.

βολβός

ἰσώδι-

μος.

Eschalo-

te.

B V L B V S quem vomitoriū vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctū eius potū, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet. Aegineta. Multo calidiorem vim quàm esculentus repræsentat.

βολβός

ἰμερικός.

B V N I V M caulem emittit quadrangulum, (aliàs additur procerum, digiti crassitudine) & in eo foliosos ramulos, tenues, præ tenuibus foliolis & flosculis scatētes, longitudine digitali: folia propter radicem, apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodā folia tribuli (aliàs coriandri) imitentur: flores anethi: semē odoratū, minus hyocyamo. Alibi sic describitur, Pseudobunion

βόνιον.

Herbe ou

charpen-

tier.

palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferēs, acri gustu. Aeg. Bunion, quod alij arctiū appellāt, calidum est, vrinae & mensibus educendis accommodatum. Huic respondetur & pseudobunium.

βούφαλ-
μος.
Oil de
beuf ou
pisse en
liq̃.

B V P H T H A I M O N, quidam cachlam vocant, tenues emittit cauliculos, mollēsque. folia fœniculi: luteū florem, anthemide maiorē, oculi similitudine, vnde nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Aegineta. Acriorem anthemide florē gerit, ideo & discutientem, adeo vt cerato mixtum duritias remolliat.

βλούπλε-
ρον.

B V P L E V R V M olus est, sponte nascēs, caule cubitali, foliis multis longisq;e, muscario anethi. Laudatur in cibis Hippocrati, & Nicandro in medicina. Semen cōtra serpētes valet, item radix in vino, ampliusq;e vrinae ciundā. folia ad secundas fœminarum vel succū ex vino linunt, & strumis cū sale & vino.

βούτο-
μος.
Iunc a ca-
bas.

B V T O M V S frutex est palustris, caule, in offensissimo, peculiari quodam læuore, folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali magnitudine, fide proximum: sexu duplici, mas, fœcūdus: fœmina vitiliū ad nexus vitilis, pars ab radice tenera manditur, puerorū cibo grata, ubiq;e ferē in paludibus nascitur, quanquā humore & terra gaudeat. in Orchemenico lacu plurimus. Democritus ei folia irinis p̃xima tribuit, ex vna radice nō singu-

latim, sed ut frutices scaturientia, quibus bo-
ues iucundè vescantur, unde nomē ei datum.

B V S E L I N V M differt breuitate caulis à *Βουσίλι-*
fatiuo apio, & radice colore rufo, peculiare *νον.*
contra serpentes potum & litum.

B V X V S arbor nota est, eius granum car *πίξος.*
thego vocant. Nullū in medicina vsum præ. *Βοιχ.*
bet: folio tantum cum materiei scobina, & li-
xiuo capillum rufant.

C

A C A L I A, quæ leontice vocatur, fo *κακαλία*
lia fert magna, alba, è quib⁹ medi- *Carui*
us caulis emicat, rectus, albus, florē *fauluage*
ferens robori aut olei similē. nascitur in mon-
tibus. Grana quæ post excussum florem inna-
scuntur, trita & cum cerato illita faciem eru-
gant, & cutem extēdunt. Aeg. Viribus & vsu
cum cancano cōuenit. Cancani autem radix
modicè siccat, & sine morsu illitionibus ac-
cōmodata, cum vino subacta linctāq; arte-
riæ scabriciem iuuat.

C A C T V S est cinara, siue carduus altilis. *κάκτος.*

C A L A M V S odoratus in India nascitur, *artichaut*
melior est fuluus, dense geniculatus, & qui *κάλαμος*
assulose frangitur, plena araneorum fistula *άρωματι*
albicans, lentus in mandendo, & astringens, *κός.*
acum aliquanta acrimonia amarus. Aegin. *calamus*
Cal. sic. 2. inest ei quippiam subtile, & astring *offic.*
gēs. Vrinam ciet. Stomachicis, tum quæ vte-
rio & iocinori faciunt medicinis temperatur.

Ancho-
lies.

CALATHIANA, munus autumnī,
violę ceterę veris. ea minuto est folio, violę
albę non est dissimili, in totum sine odore ca-
lathi similitudine, autumnno tantum proue-
niens, tanta coloris pulchritudine, vt cęru-
leum ipsum, quod imitatur, prouocet. in pra-
tis post æstatē emicat, autumnalem violam
nominant. Plin.

Percepi-
erre.

CALCIFRAGA empetrum est.

Soulcy.

CALTHA proxima calathianę est cū
colori amplitudine, vincit numero foliorum
marinam quinq; folia non excedentem. Ea-
dem odore superatur, est enim grauis caltha
non leuior ei quam scopam regiam vocant,
quāquam folia eius oleant. Vergil. calthā lu-
teolo cecinit colore tinctam. nec Plin. ab eo
dissentit. Hinc & calthula, vestis gen^o dicitur.

καλαμίν
θη.

calamēt.
Poliot
sauuage
Offi. ne
peta vul
go herbe
au chat.

Ex CALAMINTHAE generibus
quedā mōtibus familiaris, folia ocimi habēs
incana, surculos aridos, & caules angulosos,
purpureū florē. Altera pulegio similis est, sed
maior, quā syluestre pulegium ideo appella-
rūt, q̄ odore ipsum æmuletur. nepetā Latini
vocatāt. Tertia mēthastrea cognata est, foliis
oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄
superioris, sed viribus inefficacior. omniū fo-
lia gustu impensē feruentia & acria, radix su-
peruacua, nascitur in cāpestribus, asperis &
aquosis. Aeg. Cal. sic. 3. Tenuis & acris est, mē-
tha longē valentior. Siquidē est veluti syluc-

stis mētha. E profundo attrahit, sudores mo-
uet, totum corpus digerit. Rigores febrium
qui circuitu remeāt finit extrinsecus cū oleo
infricata strenuē. Coxarum dolores soluit
vitiosos humores in cutē erūpētes abstergit.

CANARIA humilis est herbula, foliis ^{κύνος}
tritici, multo minoribus, calamulo tenui, ge ^{herbe au}
niculis pyxidatim coherētib; articulatō, ^{chien.}
internodiis modo tibiarū in se infarctis, quę
tracta suis ē vaginulis exerūtur, euanida spi-
cæ loco panicula, ita vt folio & culmo triti-
cū, cacumine arundinē æmuletur. Hanc in-
uenerunt canes qua fastidiū deducant, eamq;
in nostro cōspectu mandunt, sed ita, sicut est
Plinius author, vt nūquam intelligatur quæ
sit: etenim depasta cernitur. Notata est ani-
malis huius malignitas in alia herba maior.
Percussus enim à serpente mederi quadam sibi
dicitur, sed illam hominine inspectante
non decerpit.

CANCAMVM Arabici ligni lachry- ^{κάρκα}
ma est, myrrhę quodammodo similis, virosi ^{μονε}
gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes
eo ex styrace & myrrha suffiūtur. Aeg. Odo-
ris est grati, vis eius obesos extenuare abster-
gere, & aperire p̄obstructa.

CANABIS satiaua planta magni in vita ^{κάνναβις}
vsus ad robustis. funes factitādos: foliis fra- ^{Chanure}
xini, graui odore caulib; proceris, inanib; se-
mine rotūdo. Aeg. Semē flat⁹ discutit, adcoq;

siccatur ut largiore cibo genituram extinguat. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur. Syuestris cannabis virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio satiuæ, nigriores & asperiores, flore lychnidis, subrubro: semine & radice althææ. decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANOPON sambuci flos est.

herbe ou
couleu-
ure.

CANTABRICA in Hispania inuenta est, per Diui Augusti tempora à Cantabris reperta. Nascitur ubique, caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi velut calathi, in iis semen perquam minutum. Cantabriam Hispaniæ regionem hodie Biscaiam vocant. Eius radice drachma in vini hemina sæpius bibenda contra serpentium morsus.

καφύρα
offi. cam-
phre.

CAPHURA arbor in India tanta magnitudine visitur, ut sub eius umbra hominum centuriæ cõdi possint. Nascitur in montibus ini bi mari vicinis, materiæ leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis Ex hac caphurelæum fit quo verum mentiri balsamum apudent. Caphuræ multa genera, vnum impurius in interueniis ligni modo lamellarum impactum figitur: aliud foras emergit, & arboris corticibus hæret, maculis inter initia rubentibus, postmo-

dum vel calore solis extoſtum, vel ignium vi candescit, Riachinam indigenæ vocant. cæteris bonitate & tenuitate præſtat longiorq; durat tempore: nam & atra ei fuſca reperiuntur. Rudis eſt, nullam vim ignis experta, elaborata verò, quæ ignium ardore album contrahit colorem, in laminas pellucenſes diſta. Caphura frig. ſic. 3. Capitis ex calore dolores, & incandescenſes inflammationes reſtinguit, præſertim quæ iecur male habeant. Renes & ſeminaria vaſcula refrigerat, ſanguinemque cogit. Addunt aliqui ſomnũ conciliare: ſed cauendus eius nimius uſus, quoniam peruigilia tandem adferet. Sanguinem naribus profluentẽ ſiſtere cũ ſucco viæ acerbæ impositam ventrẽ ſupprimere. Canitiem crebro uſu accelerare: ægrotationes parere frigidas.

FUMARIA fruticoſa herbula eſt, præte καπνος.
nera, coriandri ſimilis, foliis candidioribus, Fume
vndique numeroſis, cineracei coloris: flore terre.
purpureo. Aeg. Fumaria inde nomen ſortita eſt, quod ſuccus ipſius copioſas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem. Acris amarâque eſt, vnde vrinas bilioſas liberaliter prouocat, iocinoris obſtructioni languorîque medetur, ſtomachum cõfirmat & aluum emollit.

CAPNOS alia Plinio deſcribitur, quam Pied de
pedes gallinaceos vocant, naſcens in parieti- geline.

nis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque,
flore purpureo, viridis, succo caliginē discu-
tit, itaq; in medicamēta oculorū additur. Si-
milis & nomine & effectu alteri iam dicta.

καππα-
ρις.
Capres.

CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in
terra stratus, magis in orbē euagatur. spinas,
ut rubus, habet, in hami modū adūcas: folia
mali cotoneæ, rotunda: fructū oleæ similem.
qui cū dehiscens pāditur, florē candidū pro-
mit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ
figura inuenitur, quod apertum grana acinis
punicorum similia ostendit, parua, rubicun-
da. radices lignosas spargit, grādes numero-
sāq; Tenui solo, asperisq; locis, in insulis &
iuxta rudera nascitur. caulis & fructus, cibi
gratia condiuntur. Aeg. Radix extergit, pro-
bē purgat, incidit, discutitq; tum amaritudi-
ne, tum acrimonia: acerbitate verò cōtrahit,
stringit, & dēfat. Lienes induratos pota & ex
trinsecus imposita iuuat, menses promouet,
pituitam per os educit, maligna vlcera sanat,
dentium dolores sopit, tumores digerit, & vi-
tiligines, quas alphos dicunt: aurium vermes
enecat. folia autem & fructus similem quidē
sed imbecilliorē vim possident.

καψιόν.

CAPSICON Arabici cardamomi genus
videtur, recentioribus Græcis appellatum,
quod semina in ordinē digesta, quibusdam
theis inuoluentibus cōgerantur ceu capsis.
Actuarii, Distēdentes spiritus discutit, cru-

ditates concoquit.

CARDAMOMVM optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoróque de-
 uchitur. In India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, farctumq; quod enim huiusmodi nō est, exoletum iudicatur, & gustu acre, subamrū, & odore caput tentans. Cardamomum frutex est amomo non dissimilis, odoratus, oblongo semine & anguloso. Quatuor eius fastigia, viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax frianti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans. Tertium breuius atq; nigrius. Degenerat variū, friabile, odorisq; angusti. quod verius est vicinius esse costo debet. Aeg. Acre quidē & ipsum est, verum nasturtio inualidius. Compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua lumbricos interimit, & scabiem cum aceto exterit.

CARDAMOMVM aliud hodie Mauritanis proditum habemus duplici differentia. Maius alabastris rosę corticeis tradūt, in quibus semina lētis magnitudine, angulosa, pingua, odorata, suo mordaci gustu linguā vellicātia. Minus inuolucris seminū minoribus & filiquulis, cādida intus carne, minore odoris fragrātia, granulis obnigri ciceris amplitudine. Frutex ipse cubitalis est caule quadrāgulo, leniter striato prodeuntibus, geniculatim & surculis & frondibus, hortensi solano

καρδά-
 μονο
 Graine
 de para-
 dis.

Carda-
 momum
 & sylue-
 stre caros
 Corda
 persis.

non dissimilibus flore luteo, dependent ab alarum sinu alabastrum rosarum crassiore pediculo, in mucronem sensim turbinati, per initia virētes, maturi quā ruberrimi, vetustate punicei, cute leui relucente, quæ semina includit candida, in vix modum cōuoluta, lenti similia: ea per se cū valuulis gustata igneum feruorem repræsentant. Vtrunque calfacit, roborat, discutit, extenuat. Sacolla apud Arabes maius, hylbane minus.

σκόλυ-
μος.
artichaut
sauuage

C A R D V V S, Græci scolymon vocant folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusque corporis emēdat. item si decocta in vino bibatur. copiosam autem vrinam fœtidamque expellit. herba cum recens tenerescit, in olea, asparagi modo, transit. Aeg. Cal. sic. 2. Reliqua sunt eadem Dioscoridi.

καρπά-
σον

C A R P A S I succus soporem epotus, citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remediis. Dioscorid.

καρπή-
σιον.
cubebe
ou cōbe-
be offic.
Carpier

C A R P E S I V M odoratum est & tenue, viscera obstructionibus liberat, vrinæ mouet, & renes calculo laborantes purgat. Aeg.

C A R P I N V S tractabilis est, aptaque iugis, vnde Græcis ζυγίαν appellare libuit. Hanc

Hanc aliqui aceris generibus ascribunt, sepa carpinea
 rant alii. In montibus nascitur, flaua crispâq; ou. Car-
 materie. Et ipsa & acer amplæ sunt, platano meni.
 in findêdo similes: sed carpinus est gracilior
 macilentiorq;e, longior atq; mollior, venis
 in longitudinem fluctuantibus, vndosa, fissi-
 lis, segmētis omnibus in acutum compressis:
 minus tamen quàm pro magnitudinis ratio-
 ne neruis exūdat. Auētū facillima, paulo an-
 tē æquinoctium germinat: post messem & ar-
 cturū cæditur. Durissima eius materies spif-
 saq;e. Itaq; postquam terebrum experiatur,
 macerant, quo facilius mollescens perforari
 queat, lectis & sumptuosioribus fabricis iu-
 gisque nascens. Nullum eius in medicamen-
 tis vsum legi.

CARVM semen est vulgaris notitiæ. ra-
 dix cocta, pastinacæ modo, manditur. Aegi. *καρπος.*
 Cari semen calefacit, siccatur 3. ferè gradu, fla- *Carui.*
 tus digerit, vrinam mouet, idque non semen
 duntaxat, sed etiam tota planta.

CARYOPHYLLON frutex in oriente *καρυό-*
 nascitur sambuci forma, semine grano pipe- *φυλλον.*
 ris grandiori fragilioriq;e, ex atro rufescente *Clou de*
 in clauis modum capitato. Sunt qui represen- *girofile.*
 tent buxi caudice, lauri folio, sed rotundio-
 re. Aeg. Non eam habet naturam quæ nomi-
 ne prætenditur, sed ex India veluti flores cu-
 iusdam arboris festucacei & nigri sunt, longi-
 tudine ferè pollicis, odorati, acres, subamari.

d

Cal. sic. 3. ferè gradu (vel vt Aëtius, 2.) Multus eorum erumpit vsus, non ad obsonia modò, sed ad multa quoque medicamenta. (Sic enim legit Rucl. Græca autem æditio habet, ἀπολύχρησά ἐστιν ἐν ὧν πα καὶ ἐτέροις φαρμάκοις)

κασσία,
Casse.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassi corticis sarmento, foliis piperis, eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralii æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquāto feruore astringēs, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis, achi appellatur: ab Alexādrice negociatorib. daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est, germi ni cognomen est. Reliquæ viles, & quæ aphe- rum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, acrimoso: & quæ darca & citto vocitatur bar- baro nomine. Similior huic est, pseudocasia, quæ vt explicari possit. quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, heretēmq; medullæ corticē habeat. Inuenitur etiā lata quædā fi- stula, mollis, lævis, furculosa. quæ antedictæ præfertur. Damnatur cādicās, scabra, hircinū virus redolens, & quæ tenui fistula ea scabra cute sit. Aeg. Cal. sic. 3. ferè abscessu, tenuis a-

bundè, acris & modice astringēs. incidit igitur simul & discutit, robúrque instrumentis adiicit, postremò & menses euocat.

CASIA fistularis seu nigra recentioribus *καρία*
Græcis appellatur, quibusdam indica canna *συγγω*
arbor magna, iuglâdis folio, fistulis prælon- *ης.*
gis ac teretibus, vtrinq; fastigiatis, colore ru- *Casse fi:*
bro nigricantibus, duûm ferè pedum proce- *stule off.*
ritate, nigra intus carne, gustu prædulci, ossi- *ligna*
bus siliquarum, ligneis distinguëtibus mem-
branis. Partim in India, partim in Aegypto
nascitur, iam Asiæ communis facta. Deligere
oportet pòdèrosam, collucëtè, per plenâ, quâ
si concusseris, inclusa intus grana non obstre-
pant. Cal. hum. 1. flauâ bilem per aluum de-
trahit. intemperati iocinoris calores ea refri-
gerantur. prodest eis, qui per naturam pallo-
re decolorantur, anginis, laterum doloribus,
& pulmonariis.

CASSAMVM aliqui fructum balsami
interpretantur. Aeg.

CASTANEA. vide Glandes Sardonianæ.

CASSYTHA Græcis recentioribus Pli- *καύτας*
nio Syriaca voce cassytas dicta videtur, her. off. cuscu-
bosis fruticibus circûuoluitur, opere topia- *tha. gou-*
rio per vertices rotata, proxima quæque ve- *re de lin*
luti clauiculis implicat, sine radice, foliis vi- *vulg.*
dua, flore albo, semine scatens tenui, cirris
purpureis. Cal. 1. ficit 2. Sub amara est inie-
cta vino, temulentia causa traditur. abster-
d ii

git, substringit, roborat. iecoris & lienis impedimenta laxat. flauam bilem per aluum exigit.

κατανάγ
ηη.
herb. bi-
storta.

Ex eo genere vna, folia coronopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenāve, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parua magnitudinem explet, radice exiguae oliuæ magnitudine: foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutim in virgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

καυκα-
λιν
Persin ba
stard

CAUCALIS, quam alii syluestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctūve olus estur. vrinam mouet. Aegineta, Dauci modo calefacit, siccatur, vrinam mouet, repositaque conditur.

κεδρεος.
Cedre.

CEDRVS arbor magna est, ex qua picæ colligunt, quæ cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris. quæ dum effunditur gut-

tatim non dissipata coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conseruet, & viuentia corrumpat. qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Fit & oleum, à cedria separatū, dū coquitur, velleribus supra halitū eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia vsus. Cedrides Cedri fructus vocatur. Aeg. Cedrus & frutex iunipero similis & arbor est, ambo cal. sic. 3. Cōfectū ex eis oleū, quod cedreā, seu liquore cedrinū appellāt, etiā quartū ordinē attingit, subtilis admodū substantiæ: hinc teneras carnes expedit, & citra dolorem exedit, duras aut præsertimq; demortuas siccāt, & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurīū vermes interficit, aliāq; plura facit.

κεδρίδες

CELASTRVS æterna coma frondet, in planis exilit, inibiq; omniū tardissimè suos perficit fructus. Horret cultum, quē si quando patitur, degenerat. Summis gelidissimisque gaudet locis. Vfus eius ad baculos & scipiones. Theop.

κηλάρος

CENTAVRIVM magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarū colore ferrata in ambitu: caulē, ceu rumicis, binū aut ternū cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerū, in rotunditate oblonga: flos cœruleus: semē cnico simile, ceu laneis floccis quibusdā inuolutū,

κινταύριον

μείγα.

huius ra-

dixi offi.

rapōtici

noīc ostē

ditur ma

gno erro

re.

radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo
prægnans, cum astrictione aliqua & dulcedi-
ne acris, & rubescens. Amat solum pingue &
apricum, ac syluas & colles. copiosissima est
in Lycia & Peloponneso in Arcadia, Eli-
de & Messenia, pluribusque locis circa Pho-
loën, Lyciam & Smyrnam.

κινταύριον μικρόν C E N T A V R I V M, limnesion aliqui vo-
cant, cauere, quoniam rigua amet loca. herba ori-
offic. cen gani aut hyperici similis, caule âgulofo, pal-
tauria mi mum excedente: flore lychnidis, è puniceo
nor. alijs in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis
fiel de ter & paruis: fructu tritico simili radice pusilla,
re, alijs lani, & superuacua, quæ gustanti amaritudi-
febrifu- nem adfert. Aegineta, Centaurij maioris ra-
gia. dix acris, calida, & terreæ astrictiõnis cõpos-
est. Menses itaque promouet, foetus corrup-
pit, mortuos euicit, vulnera glutinat, sangui-
nem spuētibus & reliquis pectoris vitijs præ-
sens est remedium. Minoris cētaurij radix
inefficax est, coliculi validè & citra morsum
siccant, vnde nõ solum ad quæ maius centau-
rium valet, sed etiam coxendice laborātibus
ipsius decoctū inferius intestum biliosa va-
cuat, nonnunquam & cruenta, mirūque in
modum inuat.

κερόμυον C E P A longa acrior est quàm rotunda, itē
flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, &
cruda quàm cocta, aut sale condita. Aegine-
ta. Cal. 4. Substantiæ crassioris est, quam ob-

zē hæmorrhoidas appositū aperit: abstergit,
vitilignes, alphas dictas, cum aceto extert.
defluos capillos ocyus olcyonio restituit.
Succus oculis suffusis, aut crassi humoris vi-
tio hebetibus auxiliatur.

CERAE portulacæ similis est, sed nigrio-
ra habet folia, & radicem tenuem. Aeg. Folia
ipsius cōtra vesicæ scabiem vtiliter bibuntur.
Radix cum asparago myacantho pota vri-
næ stillicidia, quæ oppleto vrinario meatu
fiunt, abigit.

κηκία

CERASIA dulcia quidem citius dilabū-
tur, austero stomacho vtiliora sunt: acida ve-
rò ob suā incidendī vim pituitosis excremē-
tosisq; stomachis prosunt. Gūmi verò cerasi
arboris, faucibus exasperatas leuigat, & calcu-
lo laborantibus cum vino potum succurrit.
Aeg. (Chamæcerasum infra dicemus.)

κεράσιον
Cerises,
merises,
Guines
ou Guin
doles.

CERINTHE herba propter apes seren-
da quibus est gratissima, folio candido, in-
curuo, cubitalis, capite concavo mellis succū
habente. Hanc Virgilius ignobile appella-
uit gramen.

κήρινθον
Pasqueto

CERRVS ægilops, quercus species est
populo similis, caudice recto, excelsa, læui,
& per longitudinem robustissimo, materie
alioqui improba, nec nisi ærariorū officinis
carbone donata. Quod enim cessante flatu
statim extinguatur illis compendio est, nec
nisi paucis absumitur, sic tamen plurimis

αίγίλωψ
Heite ou
hedre.

scintillis diffiliens. Glans illi tristis, horrida, echinato calyce castaneæ modo: itaq; à nullo præterquam à sue manditur, nec nisi aliorum inopia: cum alioqui solidam duramque gignat carnē. quare suem cerrea glans diffusam quidē sed grauē facit. E glandiferis vna fert panos arentes: muscoso villo, canos non in cortice modo, verum & è ramis dependentes, cubitali magnitudine, odoratos, sphagnum siue splachnum siue phascon appellāt, item bryon: nostri penem, Syri vuam dæmonum. Eadem ferè omnia Theophrastus Macedonicæ cerro, quam asprida nominat, tribuit: quæ ægilopi cerro Plinius ascribēda existimat. Cerri folia, & cortex & glans siccant collectiones, fluxiones sistunt. Torpētes membrorum partes corroborat decoctum eius fortu: cui & insidere expedit siccandis astringendisque partibus. Radix aduersatur scorpionibus.

καρπῖς.

χαμαιβάτος.

χαμαικέρως.

CHAMAEBATVS, humi sparsus est rubus, radices quā tellurem tangit agēs, vbi nihil est propè quod vncis aculeis subeat.

CHAMACERASVS pumila est, in Bythinorum agro frequens, radice parua: neque arbor est, nec arbusculis cerasorum impar, baccis cætera omnia consimilibus. Copiose vrescentibus caput vini modo grauant. Sed hæc, vt Athenæus refert, de memæcylis intelligi possunt. Nam ex his, id est, arbuti

baccis: si quisquam plus septē esitarit, caput eius dolore tentabitur.

CHAMAECYPARISSVS herba ex vi. χαμαικ^{ος}
no pota cōtra venena serpentium omnium, παριος
scorpionūque pollet. Cypres

CHAMAECISSOS, folio est hederæ, re- de iardin
nuiore, longiusculo. ramulis à radice quinis χαμαι-
senisve, dodrantalibus, foliosis, flore violē al κιος.
bē simili, cādidiore, ac tenuiore, gustu supra Lierre
modū amaro. radice tenui, cādida, inutili. na terrestre
scitur in cultis. Aeg. Flos iecorum meatus ad-
aperit, item contra coxendicum dolores ex-
hibetur.

CHAMAEDAPHNE virgas emittit cu- χαμαι-
bitales singulari ramulo constantes, rectas, δάφνη.
tenuēs, læues: folia lauri similitudine, læuio Laureole
ra multo, ac viridiora: semen rotundum, ru-
bens, annexum foliis. Aegineta. Cōsimilem
laureolæ seu daphnoidi, & Alexandrinę lau-
ro vim habet. Chesne

CHAMAEDRYS, quære Trissago. te ou ges

CHAMAEDROPS, quidam & hāc cha- mandree
medryn, alii teucrion vocant: viribus chamæ καμαι-
dryi respondet. Aegineta. δροψ.

CHAMAEPITYS. quære Aiuga. καμαι-

CHAMAELÉON albus, ixia ideo ali- λέον
quibus vocatur, quòd quibusdam in locis vi λευκός
scum circa radicem eius inueniatur, quo pro Carlina
mastiche vtūtur mulieres: folia habet sylibo ou Car-
aut carduo similia, asperiora, acutiora, ni dina.

groque chamæleone validiora . caulem non promit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit : semen cnici simile : radicem in latis collibus crassam : in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore dulcem.

χαμα-
λίων μέ-
λας.
Cardo-
nette

CHAMÆLEO niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta viderentur. caulem emittit drantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacynthi æmulos, versicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosistractibus, & maritimis. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum euenit. mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alibi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur. Aegineta. Nigri radix cal. sic. 3. prope modum ordine, abstergit, cutis labes extergit. duros tumores dissipat emollitque. Phagedænica vlcera illitu persanat. Si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Albi radix nigro proportionem respondet, sed amarior est: quæ si cū vino austero instar acetabuli bibatur, latos ventris lumbricos enecat: facit etiam ad aquam intercutem.

CHAMAELVCE lumbarum dolori χαμαι-
bus propitia est, herba virens, incurvis foliis, λένκε.
furculisque: flore rosaceo. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Pas d'as-

CHAMAELVM. vide Anthemis. ne ou

CHAMAELATANI sunt coactæ bre pied de
uitatis pumilæ platani: quoniã arborũ etiam poullain
abortus inveniuntur.

CHAMAESYCEN aliqui sycen nomi- χαμαι-
nant. ramos emittit quaternũm digitorum, πλάτα-
teretes, succosos, in terram deiectos: folia len- νοι.
tis, parua, peplum plane referentia, tenuia, χαμχιού
quæ à terra non attolluntur: semine sub fo- κη.
liis rotundo, vt in peplo. neque caulem, ne-
que florem promit. radice firmatur tenui, su-
peruacanea. Aegineta. Absterforia & acri fa-
cultate pollet, quapropter & furculi ipsius &
liquor myrmecias verrucáque abolent: cras-
sas oculorum cicatrices cum melle abster-
gunt, hebetudini & suffusioni incipienti me-
dentur.

CHAMAELÆA surculosa fruticat, ramis χαμαι-
dodrantalibus. folia oleæ similitudinem ha- λαια.
bêt, tenuiora & amara, quæ gustata linguam Oliuella
mordent, & arteriam deradunt. Aeg. Abster- offic. me-
foria facultate sordida, vlcera, & crustas cum zercon
melle purgat.

CHELIDONIVM maius, caule est gra- χελιδών-
cili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis. fo- νιον
liis ranunculi, multis, mollioribus tamen, μέγα
& colore cæsiis: flore violæ albæ, secun-

dum singula folia prodeūte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Hoc nomē sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matres excēcatis pullis, admota herba visum restituere.

Χελιδώνιον
μικρόν.
offi. scrofula.

CHELIDONIUM minus, quod triticū syluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas. quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Aeg. Maius cal. 3. valentérque abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est. radix arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentiū doloribus auxiliatur. Minus cal. 4. acre adeò ut illitū cutē vlceret. vngues scabros emendat. Succus per nares purgat.

Χονδρίλλα.

CHONDRIILLA, quam aliqui cichorion, alii serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciem esse pronun-

ciarūt: verū tenuior tota est. in cuius ramu-
lis, gummi mastiches simillimum, tuberculo
fabæ inueniri solet. Aliud habetur chōdrillæ
genus, folium ferens oblongū circumrosum
humī sparsū, caulem succo madentem la-
teo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, fla-
uescente, succosa. cuius & caulis & folia con-
coquendi vim habent. succus incommodos
palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lētis
& cultis. Aeg. Chondrilla intybi species sub-
amara gustu est, propterea etiam maiorē fic-
candi vim quā illa obtinet.

CHRYSA NTHE MON aut caltha, nō χρυσάν-
θειμον.
Margue-
rites blā-
ches
nullis buphthalmos, herba est tenera, fru-
ticiosa, lēues proferens caules, & multifida fo-
lia: flores supra modum splendentes, luteos,
orbem oculi imitantes, vnde buphthalmi no-
men traxit. propter oppida nascitur. Cuius
caules oleris vice manduntur. flores cum ce-
rato triti steatomata discutere prodūtur. Re-
gio morbo correptis colorem breui reddūt,
si sequēte longo balnei vsu, post exitum ebi-
bantur. (Aeg. non retulit.)

CHRYSO COME palmī altitudine fru- χρυσό-
μον.
ticat. coma specie corymborum, hyssopo si-
mili. radice hirsuta, veratri nigri modo, te-
nui, cyperum æquante: gustu non iniucūdo,
ex austero dulci. in petrosis opacisque nasci-
tur. Aeg. Chrysis etiam dicitur. radix acri si-
mul & astringente vi existit, quare nō multi

in medicina vsus est: quanquā peripneumonicis, & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: ceterum menses educit.

χρυσόγονος.

CHRYSO G O N Y M densè fruticat, quernis foliis: flore coronarij verbasci. radix ut rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

χρυσολάχανον.
offic. minor crassifolia & chrysolachnum

CHRYSO L A C H A N Y M Plinius ab attriplice discreuit, in pineto foliis lactucæ nasci tradens, sanare nervos incisos. si cōfestim apponatur. Et alibi genus chrysolachani tradit flore aureo, foliis oleris. Coctū est ut olus molle. Stranguriam dissolvit si bibatur ex vino & aqua. Aluum sistit.

κύανος.

Blaucules ou
bifois ou
bluetz
Cicerole

CY A N I colos est in nomine, qui honorem noménque dederit cœruleo. Rosam cyanus excipit, cyanum amaranthus. Plin.

C I C E R A M non tam leguminibus Columella quàm pabuli generibus adnumerat, eamque proximam fœnograeco & medicæ tradens. Eadem hominibus non inutilis, nec iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. nam est obsoletior, & nigro propior. Seritur primo vel altero sulco mense Ianuario, aut Februario, Martiove: quibusdam tamen Italiae locis ante calendas Nouembris. Lato loco & humido feri debet. Ea, ut volunt, stercoretur ager.

CICERCVLA est minuti ciceris in- cerresou
 equalis angulos habens veluti pisum. Ea mul poys cer:
 tis in locis vtūtur, eiusq; cremorem phaselis re.
 præferunt in alendo potentiolem.

CICI, lege Ricinus.

CICER consuetum legumen flatus cre- ὄροβος.
 at, valentis materie, aluum facilem reddit, vri Ciche
 nam mouet, lacti seminiq; generando ac-
 commodatū, idem menses elicit. At crios ap-
 pellatum, hoc est arietinū, aliis magis urinæ
 ciendæ est: decoctum ipsius præsertim nigri,
 calculos quoque in renibus conterit. Quod
 orobixum ab eruo vocatur, calidius his est,
 & subamarum. Syluestria quouis modo do-
 mesticis sunt validiora. Est autem syluestre
 cicer foliis satiuo simile, odore acri, sed semi-
 ne discrepat. Aeg.

CYCLAMINVS folia habet hederæ,
 purpurea, varia, in quibus suisque deque albi
 cant maculæ: caule nudo, quaternos digitos
 æquante: floribus in eo purpureis, rosarū effi-
 gie: radice nigra, & aliquantum lata, ut ra-
 pum videri possit. Aegin. Cyclaminus varias
 vires habet, etenim extergit, incidit, aperit,
 attrahit, & dissipat. Succus ipsius hæmor-
 rhoidas sedi admotus aperit, duritias cum a-
 liis discutit. Cum melle suffusus proficit, per-
 nares purgat abdomini inunctus aluum sub-
 ducit, fœtus corrumpit. Radix autem ro-
 ta succo quidem est imbecillior, sed & ipsa

κυκλάμις
vos.

offic. cy-
clamen
messon,
ou pain
de por-
ceau vulg.

vehemens adeo est, vt cum mulla instar triū drachmarum pota, interanea expurget. Cutis etiam vitia exerit.

κυκλάμι
νος ἰτίρα
offi. sigil-
lū Mariæ

Est & altera CYCLAMINVS, quā cissanthemon aut cissophyllon vocāt: foliis hederæ, sed minorib⁹: geniculatis caulibus, crassisque circa uicinas arbores, capreleorū modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. nascitur in asperis. Aeg. Semen efficax est vt potum priori similia faciat.

κυκλάμι
νος τριῖη

CYCLAMINVM tertiā Plinius sibi demonstratā asserit cognomine chamæcisson, vno omnino folio, radice ramosa qua pisces necabātur, quod Dioscorides nomine tenuis primæ cyclamino tribuit, ichthyotheron, à piscium venatu nominans.

κῶναον
Cigue

CICUTA caulem ædit geniculatū, vt fœniculi, grandem in cacumine, ramosum: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellæ in summo prodeūt: flores quoque albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutę letale venenū inest, suāq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ succescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio, & Cilicia nascenti.

Aeg. Cicutæ vires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

CYMINVM, lege Cuminum.

CINNAMOMI genera plura, patriū sibi nomen vendicātia. Præfertur tamen Mosyliticum, quòd cassiæ, cui Mosyliti nomē est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergēs, læue, tenuibus ramulis, ac frequētibus nodis cinctum, perquàm iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Innenitur enim cum optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cum calfactione quadantenus salsum, quòd non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiuscemodi probatio: nanque fragmenta miscellanea quædam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertiū à Mosylitico, perquàm suauiter olet, nigrum fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè representat.

κινναμό-
μον.
Canelle

Quintum genus, odore nares feriens, sub-
 rufum, & cortice fuluæ casia simile, tangen-
 ti firmum, minus neruosum, densa radice fir-
 matum. Iis quæ thuris, casia, myrti, aut amo-
 mi odorem spirant, minus suauitatis inest.
 Deligito scabrum, album, rugosum. at læue,
 lignosum circa radicem, vt inutile, reicito.
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocin-
 namomo cognomé est, vile inualidi odoris,
 solutarumque virium. Vocatur etiam Zingi-
 ber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-
 bens quâdam cinnamomi faciem. Est autem
 lignosum cinnamomum, sarmenta longa ro-
 bustaq; ferens, odore longe cinnamomo in-
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinna-
 momo genere differre dicant, quod à natura
 eius abhorreat. Est & quoddâ cinnamomû,
 quod aliqui pseudocinnamomum appellât,
 perquàm denso atque crasso sarmento, longè
 tamè inualidius cinnamomo, & odore & gu-
 stu. Aeg. Cinnamomi vis est summè tenuis,
 non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil
 autem ex iis quæ parem ipsi calorem referût
 adeò siccât, propter substantiæ tenuitatem.
 Cinnamomis autem vel pseudocinnamo-
 mum veluti inualidum quoddam cinnamo-
 mum est.

Langue
 de chien

CENOCEPHALAEA eadem potest vi-
 deri antirrhino, vt mihi quidem videtur.)

CYNIA aut cynocrambe, cauliculum bi- κυνιο-
nūm dodrantum altitudine emittit, mollem, κράμβη.
subalbidum: folia mercuriali aut hederę simi off. sylue
lia, certis interstitiis subalbida. semen foliis stris atr-
adheret: paruum, rotundum. Folia cum cauli plex
bus pota, aluum cient, oleribus commendan-
tur. Ius decocti & pituita & bilem aquamq;
detrahit.

CYNOGLOSSON folia latifoliae plan- κυνό-
taginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: γλωσσόν.
caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sa-
buletis. Contrita eius folia cum vetere sinlo Non est
adipe, rabidorum canū morsibus, alopeciis hec lin-
& ambustis medentur. Herba cocta & cū vi- guacanis
no pota, aluum mollit. herba-

CYRIVS, quem aliqui cryssiceptrū, vt riorum
aspalathū appellāt, folia fert porraceis pro- κύντιρος.
xima, sed longiora & exiliora: caulem odo- Souchet
rati iunci, cubitalem aut maiorē, angulosum ou ionc
in cuius cacumine minuta folia cum semine blanc en
exoriuntur: radices, quarum in medicina est bas, noir
usus, coherentes inter se, oleis oblongis simi- par haule
les, aut rotundæ, nigro colore, suauī odore,
amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-
tis enascitur. Optima est grauissima, densa,
fractu contumax, plena & aspera, odoris
cum quadam acrimonia iucundi, qualis est
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insu-
lis petitur.

κνταρος
Ιουδική.

Aliud CYP I R I genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum crocivim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet. Aeg. Iuncus angulosus calfacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, vrinâ & menstrua promouet.

κνρος,
Τροισνε

CYPRVS arbor est oliuæ foliis circum ramos, latioribus, mollioribus, & virentioribus, flore candido, muscoso, odorato, semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Aegin. Cypri folia & surculi mixtis constant viribus, discutiète & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: ideoq; decoctum ipsorû ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, aphthas vocât, ipsa arbor commâducata persanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

κικκία.

CIRCAEA, quam & dircæam, aliqui vocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, saxi, & vento perflatis. Aegin. Eius radix calida est, & odorata, quæ cum vi-

no pota fœminarum locos purgat: semen in
forbitione sumptum lac generat.

CIRSIUM, caulis est tener, duorū cu-
bitorum, triângulo similis: ab imo foliola, ro-
sæ speciem referentia: anguli spinosi, per in-
terualla molles: folia buglosso similia, maio-
ra, subcâdida, modicè hirsuta, partibus extre-
mis aculeata: cacumen caulis orbiculatū, hi-
spidum, in quo capitula purpurea, quæ sol-
uuntur in lanugines. Radicem huius loco la-
boranti adalligatam, dolores varicum sedare
Andreas scripsit. (Aeg. non meminit.

κίρσιον
off. lingua
bouis

CISTVS, quem aliqui citharon, aut citha-
ron vocant, ramosus frutex est sed impro-
cerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis ro-
tundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali
punica, fœminæ albet. Hypocistis, erythra-
non, aut cytinus à nonnullis cognominata,
iuxta cisti radices nascitur, floris punici simi-
litudine. quædam flaua, altera virens, tertia
candida. Liquatur acaciæ modo. aliqui tamē
exiccant, fractamque macerant, & incoquunt,
reliquaque, vt in Lycio prosequuntur. Aegi-
neta, Frutex est astringēs, & modicè frigidus
virtute: folia ipsius & germina adeò ficcant,
vt etiam vulnera conglutinent: at flores cum
in secundo ferè gradu ficciores sint, intesti-
norum torminibus, aliisque fluidis vitiis ac-
commodati sunt: extrinsecus illiti putrida vl-
cera compescunt.

κίσος
De gari-
cles

ῥυτίσος. **Grand** **creusle** **CYTISVS**, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargēs cubito longiores, in quibus folia scēnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis tria erucam olent, gustatâque cicer sapiunt. Folia refrigerât. tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinantur, decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod a pes alliciat, prope aluearia serunt. Aegineta, Folia discutientis leniter & tepide nostræ sunt quemadmodum & maluæ.

κίτρον. **Citron** **CITRII** medium acidum, aut qualicatis expers, in quo semen est, tertij refrigerantium siccantiũque ordinis habetur. Cortex in secundo quidem abscessu siccatur, sed non item refrigerat, acri virtute præditus. Caro ipsius crassi succi est, pituitæ generandæ apta & frigida, semen digerit & sic. 2. Folia arboris siccandi discutiendique vim repræsentât. Aegineta.

κλίμα. **Peruëca** **CLEMATIS** humi serpit, læto, pinguique solo prouenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, multo minora. Gignitur in terrenis. Aeg. Appellatur & daphnoides, myosinoides, polygonoides. Siccandi virtute pollet, qua fluores alui quã diarrhoeam dicunt, intestinorũ tormina, & dentium dolores finit. Cõtra venenatorũ morsus rectè imponitur. Est & altera

Lifeton **off. Volu** clematis, quæ viticulosum emittit ramulũ, ru-

bescentem, lentum: folium gustu admodum bilis ma-
acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt smi- ior. & Cā
lax. Aeg. Huius fructus cū aqua potus pituitā panella
& bilem per inferiora educit. folia ad lepras
arcendas illinuntur.

CLEMATIS tertia Plinio recensetur, cē. κλημα
tūculus Italici appellata, rostratis foliis ad si- τίστριπ
militudinem capitis penularum iacēs, in ar-
uis. Est eius egregius, effectus, ad sistendam
aluum in vino austero. Idem sanguinē sistit
cū oxymelite, aut aqua calida. sic & ad secun-
das mulierum efficax, (Idem ferē gnaphalii
effectus est, quod Romanis similiter centun-
culus appellatur, hinc fit vt quid differāt ad-
dubitem.

CLINOPODION frutex est foliis ser. κλινόπο-
pyllo similis, surculosus, duūm dodrantum διορ.
altitudine. nascitur in petrosis. flores matru- Forte q̄
bii modo, ex interuallis distincti speciem vulgo or
lecti pedum præbent. Aegin. Vis eius est ca- biculata,
lida siccaque, nondum vero adurens, sed ter- quā offi.
tij ferē ordinis. montanū

CLYMBENVM caulem fert fabæ, qua- pulegiū
dratum: folia plantaginis, folliculis supra κλύμε-
caulem in sese inflexis, vt in polyporum cir von.
this. Probatissimum est è montibus. Succus Sigecia
ex herba tota cum radice exprimitur refri- offi. Cy-
gerans, & omnes fluidas affectiones astrin- pria ou sa
gens. (Galenus & Aegineta indiētā reli- ponalis
querunt.)

κνίκος, **C N I C V S** foliis constat oblongis, per am-
 bitū diuisis, asperis, spinosis, caule sesquipede-
 ali, capitulo magnitudine grādis oliuę: flo-
 re croci semine candido, alioqui rufo, longo
 anguloso. Huius flore in obsoniis vtuntur.
vel κνῆ-
κος.
off. carta
mus Aeg. Cnici semine ad purgandā aluū dunta-
 xat vtimur. Si quis extrinsecus eo vtatur, ter-
 tij calefacientium ordinis erit.

κόκκος **C O C C V M** quo infectores vtitur, frutex
βαφικός. est surculosus, paruus. cui grana ceu lētes ad-
 hærent, quæ electa congeruntur. Optimum
 offic. gra gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia
 na tincto & Cilicia: vltimum ex omnibus Hispani-
 cū. narb. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus, co-
vermillō chlearum exiliū similitudine, quod illius re-
 gionis mulieres ore legunt, & coccum voci-
 tant. Aeg. Granum tinctorium leniter siccatur,
 vnde magnis vulneribus, & neruorum iti-
 dem cum aceto, aut oxymelite leuigatum cō-
 modē imponitur.

κωδίαμι- **C O D I A M I N V M** bis anno, vere & au-
vor. tumno emicat, estates hyemēsque fugit. Vocāt
 & codianum bulbum syluestrem interpretan-
 tes, & codion eius florem.

κοῖξ. **C O I X** Theopraсто folio arūdinis, angu-
 lari, ad nexus utilis, à quo fiscellæ genus At-
 ticæ coix, vt inquit Pollux, apud Dores
 Cois. fit & mentio de coicinis textis apud
 Strabonem.

κολχικόν **C O L C H I C O N**, aliqui ephemeron, sunt

qui agrestem bulbum vocant, autumnu exi-
tu florem edit croci, candicantem: ab eo tem-
pore, folia bulbi, sed pinguiora: caulem pal-
mo altum, ferentem rufum semen: radicē fo-
ris ē nigra rufescentem, quę delibrata, candi-
da & mollis spectatur, lacteo succo madet, at
que gustatu dulcis inuenitur. bulb⁹ eius me-
diam habet rimam, fissuramque, qua flos erū-
pit, plurimum in Messenia, & Colchis enasci-
tur. Ea comesa, fungorum more, strangulan-
do enecat. Hanc autē depinximus, ne ā quo-
quam imprudēter pro bulbo deuoretur: mi-
rum enim in modum saporis voluptate im-
peritos allicit. Remedio sunt eadem quę fun-
gis. bubulum etiam lac potū auxiliatur. itaq;
cum adfuerit, non aliud desideratur auxiliū.
(Aegineta nihil adiecit quā eius alexiphar-
maca.

Canine-
ca. offici.
hermo
dactyli.

COLYCEA arbor circa Idam prouenit,
alioqui rara inuentu, fruticosa, ramosa; &
multis alis concaua. folio vlmi, longiore, fa-
cis ad latifoliae laurus accedēte, sed amplius-
culo & rotundiore, suprā viridi, infra cano,
neruosoq; præ tenuibus neruulis fibrisq; , de
medio callo in costarum speciem adductis,
materiæ solida, cortice non læui & quasi vi-
tigineo vestitur. Radicibus per summa gra-
cilibus, & solutis, cæterum fibratis, & mirum
in modum flauis. Sterilis & flore vidua, surcu-
los tamen gemmasque circa folia pingues,

κολυκία

laues, candidos, amentacea facie fundit. Precisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

C O L Y C E A alia est apud Theophrastum, folio salicis, comosa, ramosa, in totumque ampla, valvulis leguminum more non angustis, in quibus semen latum, paruum, durum non nimis, nec abunde pro magnitudinis ratione frutificat. (Hanc aliqui Plinio staphylodendrum dici existimant, de qua suo loco.

κολυτρία
Bague-
naudier.

C O L V T E A Liparæ peculiaris à Theophrasto traditur. Arbor magnitudine præstans fructum ferens in siliqua, magnitudine lentis, qui mirum in modum oues saginet. Nas citur semine & fimo præcipue ouillo. Serendi tempus, cum arcturus occidit. Mādari solo debet præmaceratū, cum iam in aqua germinare cœperit. foliū mittit fœnogræco nō absimile. Arbor primū vnicaulis emicat, trina cōcidendis scipionibus & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit mox emoritur, quippe quæ lateribus haud quaquā fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrina prorsus abhorrescit. (Si hæc arbor est quā Mauritanī Sene vocant, siliquosus eius fructus denarii pōdusculo potus pituitam & bilem deiicit. Retorridā atramq; bilem earumq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetusto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini

succurrit. Sed ius potius fernefacti, quàm triti farina ppinatur. pulueris modo drachma, in decocto semuncia. inter aliorum obstructions explicat. (Actuarius.)

COMBRETVM baccari simillimū traditur, nisi quod procerius est, foliorum exilitate vsque in fila extenuata. Hoc totum cum axungia vulnera mirifice sanare.

COLOCYNTHIS sarmenta foliaq; satui cucumeris mittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Aegineta, Cucurbita sylvestris validā purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

κολοκυνθίς.
coloqute

CONYZAE duo genera, quæ parua vocantur, odore præstantior est. maior verò frutice altior & foliis lationibus, graui odore. utriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binū cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem equat flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abi, tradices superuacue. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis quàm paruæ maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis riguis, Aegineta, Conyza utraque Cal. sic. 3.

κόνυζα.
chasse pu
ce ou ci
micaria.

Hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeantes discutit. Flores idem præstant, quorum decoctum menses citat, & foetus extrahit. De tertia non aliud tradit quàm Dioscorides.

Esponge **CONFERVAM** appellant à conferru-
de riuic- minando, spongiam aquarū dulcium verius
re ou tof- quàm muscum aut herbam, villosæ densita-
fe musc. tis atq; fistulosæ. Frequens est in Alpinis flu-
 minibus. Hanc præsentaneum esse remediū
 ad ossa fracta Plinius est author.

διὰ πύρον **CONSILIGO** ætate plinii herba in Mar-
Pulmo- sis reperta. Nascitur & Aequicolis circum vi-
naria Ve- cum Neruesiæ. Radix eius suum & peco-
getii esse rum omnium remedium præsens est, pulmo-
videtur. num vitio, vel trajecta tantum in auricula. Bi-
Pomelee bi debet ex aqua, haberiq; in ore assidue sub
ou patte lingua. Superficies huius herbæ an esset in a-
de lion. liquo vsu, Plinio fuit incertū. Columella ad-
 uersus pestilentia ingruentem gregi præsens
 remediū huius radiculae vsum cognouit. Cō-
 filignē mulomedicis pulmonariam dici cō-
 pisse testatur Vegetius.

off. volu- **CONVOLVOLI** herbæ nascentis per
bilis. du fruteta nullo odore flos est, nec crocis intus
liset, ou candorem tantum referens, ac veluti naturæ
de laveil- rudimentum lilia facere condiscantis.

lere, ou **CUNILAGO** siue cunila mascula, odo-
herbe ris est foedi, radicis lignosæ, folio aspero. tra-
aux clo- dunt manipulo eius abiecto omnes etiam à

tota domo blattas conuenire ad eam.

CORIANDRVM aut corianum vulga-
ris est notitiæ. Aeg. Ex contrariis viribus cō-
positum est, tenuis substantiæ, terrenæ, ama-
ræ, aquosæque humiditatis tepidæ particeps.
Habet modicā vim astringendi, quapropter
inflammationibus, erysipelatis nō admodū
feruentibus cōuenit. Tumores molliusculos
cum aliquo in idem efficaci, discutit. Semen
modicè quidem cum passo bibitum, lumbrici
pellit, libeeralius autem sumptum men-
tem tentat.

CORIS, quod aliqui hypericon vocant,
frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac
minore, non altior dodrante, suauis, odora-
tus, acris. Aegineta, Semen eius ad vrinam &
menses ciendos bibitur. Succurrit & phalan-
giorum moribus, item ad opisthototon cū
oleo inungitur.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens
oliuæ modo oblongas, quæ primum virent,
dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ co-
lorem repræsentant. Muria, vt oliuæ, condiū-
tur. Sanies quam virentia folia torrendo resu-
darunt, impetigini conuenienter illinitur.
Aeg. Corni fructus acerbus, si edatur, validè
vêtrems astringit. Folia autem & germina a-
cerbitate vehementer siccant, adeò vt maxi-
mis durorum corporū vulneribus glutinan-
dis sint.

ches ou

des clo-

chettes.

herbe en

censiere.

κόριον.

coriandre

κόρις.

Milleper-

tuis, ou

herbe S.

lehan.

κράνιος

Cormier

ou corni-

er.

κορώνι-
πας.

Capriole
ou sagui-
naire, ou
dent au
chien.

κίσός.

Du coq.
ou herbe
de nostre
Dame.

CORONOPVS oblonga herbula est,
per terram repens, fissis foliis. coquitur in o-
lere, radicem habet tenuem, abstringentem,
quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in agge-
ribus, & locis incultis, & fecus vias. Idem a-
pud Paulum nisi quod κολικούς pro κοιλια-
κούς per peram legitur.

COSTVS præcellit Arabicus, can-
didus, lenis, eximia odoris suauitate. Secun-
dū locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber,
vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis,
colore buxus, & odore feriens. Optimus
est recens, albus, abundè plenus, densus, a-
ridus, à teredinibus non erosus, sine graueo-
lentia, gustu calidus ac mordens. Sunt qui
admixtis helenii comageni præduris radici-
bus, adulterent. quod deprehensu facile est.
siquidem neque gustu feruet helenium, ne-
que validum odorem vibrat, vt caput tenta-
re possit. Aegineta, Costus modicum qui-
dem amaritudinis, plurimum verò acris &
calidæ qualitatibus habet, idoneus si quam sit
opus particulā calfacere, vel ex alto in sum-
ma humorem aliquem elicere. Vrinam &
menses ducit, lumbricos enecat. Quum ve-
rò & flatulenti cuiusdam particeps sit, vene-
rem cum mulso potus stimulat. Coxendi-
cum doloribus, resolutis, febrium rigori-
bus ante accessiones, cum oleo infricatus,
conducit.

COTONEA mala & struthia frigido ac κυνδώνιο.
 terrestri donata temperamento, ventrem sup Coins.
 primunt, vulnera glutinant. Aeg.

CRATÆOGONVM, siue vt aliis κράται-
 placet, cratægonon, foliis melampyro simi- γονος.
 le est, multis calamis ex vna radice emican- Curage
 tibus, multorumque geniculorum. semine
 milii. nascitur in opacis & frutetosis, sum-
 mopere acre. Eadem apud Paulum, sed fri-
 gidum semen esse adiicitur, corrupta, ni
 fallor, lectione: aliter enim apud Galenum
 legitur.

CRITHMVM, seu potius, vt aliqui, cri- κρίθμος
 thamon, fruticosa & vndique foliosa herbu-
 la est, cubiti altitudinem ferè petens. Nasci-
 tur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus
 numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, la-
 tioribus, & longioribus, falso gustu. flores
 candidi sunt, & semen, ceu rorismarini, odo-
 ratum, molle, rotundum, quod siccatum rum-
 pitur. habet intus tritici modo nucleum: ra-
 dices digiti crassitudine tres aut quatuor, gra-
 ti odoris & iucundi. estur crudum coctumve
 in olere. seruatur etiam in muria. Aegineta,
 Crethmon salsum est simul & amarum, sed
 modicè, quare & vis ipsius est abstersoria &
 desiccans.

CROCODILION chamaeleontis ni- κροκοδι-
 gri figuram habet. Nascitur in syluosis, ra- λίου.
 dice longa, læui, aliquantum lata, odore, vt a carline

nasturtii, acuto. Semē ei rotundum inest, duplex vti scutum. Aegineta, Semē & succus calidam, siccam, & discutientem vim præ se ferunt, vrinas itaque & mēses mouent. Radix excreationes ē pectore iuuat, item sanguinē per nares ducit.

κρόκος.
Safran.

C R O C U S, optimū in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerēs in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, ē tractu Lyciæ cōtermino. Tertius Lycio ē monte Olympo. dein ex Aegibus Aetolię. Cyrenaicū & Centuripinū in Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerūt, quibus de causis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate ruso, atque etiam sapæ subtili: contrita, quò pondus adiiciatur, simul argēti spuma, aut blumbagine. sed maleficium declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Aeg. Crocus Cal. 1. sic. 1. astringit & concoquit.

καρότον, quære Ricinus.

CYCVBRITA

CYCVRBITA humidi frigidique in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat inflammationes.

κολοκύνθη

Courge,

ou co-
hourde.

σίκνος.

Cōcōbro

CVCNMIS esculentus quidē viridis refrigerat humectatque in 2. ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes. Semen abstergendi incidendique virtute præditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit. Aridus siccatur in 1. ordine, vehemētiūque abstergit, & semen, & radix.

CVCVMIS sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longē minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta satiuus refert: radice candida, magna. nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abiici-

σίκνος

αχρῖος.

erraticus

ἐλατόριον.

ον.

untur. humor in pelui agitur, & linteo o-
pertus, soli exponitur. dumque steterit, tota
supernatans aqua cum humore concreto, ef-
funditur. hoc verò identidem fieri solet, do-
nec existens aqua liquecat: qua stillatim ex-
hausta, sedimentum mortario suscipitur, &
conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad
hauriendam protinus succi abundantiam, cri-
bratos cineris humi inspargant, & medium
cauantes, triplicatum linteum obtendant, per
quod elaterium cum sua humiditate diffun-
dunt, siccatumque, in pila, ut dictum est, con-
terunt. Aliqui pro dulci aqua marinam per-
fundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lo-
tione, mulsam aquam respergunt. Elaterium
optimū esse constat, læue, non ponderosum,
cum candore leniter humectum, gustu ama-
rissimum, quodque lucernarū luminibus obie-
ctum, facile flagret. Porraceum tamen sca-
brumque, si turbidum spectetur, atque erui cine-
risque plenum sit, graue & vitiosum esse solet.
Nec desunt qui cucumis succo amyli im-
misceant, ut candorem ipsum & leuitatem imi-
tentur. Ab imatu ad decennium deiectioni-
bus utile est. Aegineta. Cucumeris syluatici
radix detergit, dissipat, emollit. Succus sic-
candi vires habet, qui videlicet radice & fo-
liis expressus elaterio similis, sed imbecillior
est. Elateriū autē cal. 2. menses prouocat. fœ-
tus appositū propter summam amaritudinē

necat. euacuationē ex naribus cum lacte in-
stillatum molitur. Clystere iniectum pituitā
nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

CVMINVM satiuum ori gratum est: sed κύνινον.
Cumin.
multo magis Aethiopicum, quod Hippocra-
tes regiū appellauit. secundum locum tenet
Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in
Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & ple-
risque aliis tractibus.

Syluestre CVMINVM, plurimum effi- κύνινον
ἀγριον
caciūque in Lycia & Galatia, Asia, atq; Car-
thagine Hispaniæ gignitur: fruticē paruo: do-
drantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis
foliis tenuibus, veluti ferratis, & gingidii di-
uisura. in cacumine capitula quina, aut sena
habet, mollia, rotunda, in quibus est semē a-
cerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in col-
libus. Est & aliud syluestris cumini genus, sa-
tiuū non dissimile, quod à singulis floribus
pensilia promit cornicula, in quibus semen
est melanthio simile: quod potum omnium ser-
pentium moribus præsidio est. calculosis &
iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concre-
tum sanguinem cum lotio reddunt, auxilia-
tur. sed apii semen feruescētum postea bibē-
dum est. Aegineta: Cyminū calefacit tertio. κυνάριον
σος.
Vrinam mouet, flatūs discutit.

CVPRESSVS refrigerat & astringit. Cypres
galle de.
Aegineta: Cupressi galbuli & turiones sicca-
di viribus pollent, nullo calore conspicuo: cypres.

quapropter vulnera magna in duris corporibus conglutinant, & in flaccidis putridisque ulceribus in alto fixas humiditates citra noxam depascuntur, intestinorumque ramicibus opitulantur.

Sariete, C V N I L A mollis ramis ac foliis, hispida lanugine obducitur, tritaque mellis habet odorem, digitis tactu eius coherentibus.

uage, ou
cunilage

Δαφνοειδής.

Laurcole

D

A P H N O I D E S cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisque, multis, inde sursum ver-

sus foliosis. cortex supra modum viscosus ramos vestit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca cum maturuit, nigra: radix inutilis. nascitur in montosis. Aeg. Laureola eiusdem facultatis est cum laure Alexandrina.

D A M A S O N I O N, quære Alifina.

Δαυκός.

Carote

faulnage

oupanez

D A V C V M aliqui Daucium vocant. Creticum foliis fœniculo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodrantali: umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. radix digitali crassitudine & dodrantis longitudine adolefcit. in saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruētis gustus. Probatissimum Creticum. Tertiū assigna-

tur genus foliis coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acris. Aeg. Daucus qui & staphylinus dicitur, hortensis quidem radice flatulenta est, & venerè mouet itemq; semine. Sylvestris autem semen minimè flatuosum est, sed vrinam & menses citat, vt & herba ipsa, inefficacius tamen. Sed hæc magis ad pastinacam Dioscoridis quàm daucū faciunt.

DELPHINIUM, furculos emittit à radice vna sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant, unde tractū nomen est. flos violæ albae nō dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolu, atque ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Provenit in asperis & apricis, Alterū est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus. (Non habetur apud Aeginetam.)

DICTAMNUM, aliquibus sylvestre pulegium vocatur. Cretensis herba est acris, lenis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. florem nullum aut semē profert.

Δελφίνιον.
ov.
fili' anto
patrē, a-
liis bucci
naria.

Δικταμνον.
vos.
Dipta ou
gingēbro
du iardin

*ψευδοδι- Quod pseudodictamnium vocant, multis in
αμνος, terris nascitur, antè dicto simile, sed minus
quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed
inefficacius multo. Defertur à Creta alterum
dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maio-
ribus: in quibus flores sylvestris origani, ni-
gri, molles. odor foliorum inter sisymbrium
& saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem,
sed minus nares ferit. miscetur emplastris, &
& medicaminibus quæ aduersus serpentium
iniurias confinguntur, theriaca vocant. Aeg.
Tenuius est partibus pulegio, cætera simile.
imbecillius autè est pseudodictamnion.*

*διόσπυ- DIOSPYROS vel diosporos arbor
pos. fructum habet ceraso similem, duro intus nu-
cleo. Theophrast.*

*διψακος. DIPSA CVM aculeatarum generis est,
chardon caulem habet altum, spinis horridum, foliis
a foullon lactucæ, spinosis, binis, genicula singula cõ-
plectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas
intus & extra aculeatas, in dorsi medio habẽ
tibus, cõcauo alarum sinu, in quo imber aut
ros asseruetur. vnde dipsaci, quasi sitiētis, no-
men traxit. in cacumine caulis, singula surcu-
lis capitula insunt, oblonga, echinata spinis.
quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq;
medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Aegi-
neta: Huius spinæ radix siccat secundo, cum*

διωδὲκ- aliqua abstergerendi vi.

θεος. DODECATHEO folia septem lactucis

similia exeunt à radice lutea. in aquâ potam
omnibus morbis mederi tradunt, item ma-
lis quæ membratim sentiuntur: neq; non iis
quæ totis corporibus grassantur.

DORYCNION Crateuas halicacabon,
aut caleâ vocat. frutex oleæ nuper præcūtis,
similis. nascitur in petris, non procul à mari,
ramis cubito minoribus, foliis oleæ similib;
colore, minusculis, firmioribus præter mo-
dum scabris: flore candido: filiquis in cacu-
mine, ceu ciceris densis, rotundis, quinis intus
aut senis seminibus, exigui erui magnitudi-
ne, læuibus firmis, versicoloribus, radix ad
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem
adolefcit. id somniferum esse constat. Copio-
sius haustum mortē adfert. Nec defuere qui
dicerent, semen in amatoria expeti. Aegineta,
simile temperamēto est papaueri & man-
dragoræ, immodicè refrigerās. Quod si par-
cè sumatur torporem inducit: copiosius, in-
terimit.

DRABA herba ad cubiti altitudinē assur-
git, tenues spargens ramos, & ex utroq; late-
re folia, ceu lepidii, sed molliora, & cādidio-
ra in cacumine verè sambuci umbellam ge-
rit, candidos flores habentem. Herba hæc cū
ptisana coquitur, in Cappadocia maximè.
semen aridum pro pipere obsoniis admisce-
tur. (Aegineta præterit.

DRACVNCVLVS folio constat he-
iii

Moly hō
meri.

δρυκνῖον
ov.

δράβη
drauc ou
cumin
sauuage

δρακύνιον
τιον.

offi. serpe- deraceo, magno, candidis notis insigni: cau-
 taria & co- le recto, bicubitali, versicolore, maculis re-
 lubrina, sperso purpureis, ita vt anguē planē referat,
 aliis lin- baculi crassitudine. fructus summo caule ra-
 guacerui- cematis cohaeret, colore primum herbaceo.
 & cum ematuruit, croceo, gustu feruens,
 mordaxque. radice aliquantulum rotunda,
 bulbosa, aro nō absimili, tenui obducta cor-
 tice. Nascitur in sepibus vmbrosis. Aeg. Simi-
 le quiddam aro habet, sed eo acrius, amarius
 calidius, tenuiūsq; est, cū adstrictione nō nul-
 la. Radix ipsius pota viscera purgat, & perui-
 caciū seu malignorum vlcerum excellentissi-
 mum est remediū: ex æquo etiam folia, fru-
 ctus valentior est.

δρυόφω-
 vor.

offi. myr-
 tus nemo-
 ralis, cusi-
 nes rura.

DRYOPHONVM olus sylvestre filiculā
 siue dryopterim specie æmulatur, ramulis si-
 ue cauliculis tenuibus sesquipedalibus, quos
 circūdant vtrinq; folia, pollicari amplitudi-
 ne rusco similia, nisi quod teneriora sunt &
 candidiora, flore sambuci lacteo, semine gu-
 stu mordaci, vnde eo vice piperis vtūtur, co-
 quuntq;, cauliculos in cibis admodū gratos.

δρυόπτε-
 ris
 Arborea
 osinūdu-
 la.

DRYOPTERIS nascitur in veterū ro-
 borum musco, filici similis, multo minore fo-
 liorum incisura: radicib⁹ inuicem implexis,
 hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergē-
 tibus. Aeg. Dulcis, acris, & leniter amara est:
 cæterum vim habet exedentem, qua & pilos
 abolet.

DVLCS radix plurima gignitur in Cap padocia & Ponto. fruticosa est ramis binūm cubitorū altitudine assurgentibus: foliis lentisci, densis, pinguibus, tañūque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularū platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentiū modo habet, rufas & paruas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ désantur in succum, lycii exemplo. Aeg. Tepidi humidique temperamenti est, alius cuius etiam astringentis particeps, coque non modò fauces exasperatas læuigat, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

E

E

BENVS optima habetur ethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factitii cornus læuore. cū frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. sufficit iucundo odore supra carbones sine fumi tedio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad cotē flauescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequētibus maculis. ceterū prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro ebeno vaneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluitur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu præferētia. Aeg. Ebeni ligni vis

γλυκὺς
ῥίζα.
off. liqui-
ritia rigo
hisse ou
erculisse

ἔβενος
Eucne

est excalfactoria, deterforia, & subtilis, quæ propter quæ pupillas obscurant abstergere creditur, aliisque oculariis miscetur medicinis.

ECHINVS idem erino, meo quidē iudicio.

ἑχιν.
Herba
hircina

ECHION, folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutæque utroque latere folia, expansa, pinnatæque, nigra, in summo caule minusculas: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt. radix nigricat, digito tenuior. Aeg. Hæc alij doriada, alij alcibiadion vocāt, nō modo à serpēte commorsis cū vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoq; percuti non patitur.

ἑλαιόμη-
λι.

In Palmyris Syriæ, quod ELAEOMELI vocant, ex quodam caudice manat, oleū melle crassius, sapore dulci. Aeg. Instar duorum cyathorū potum cū aquæ hemina crudos humores biliososq; ex aluo educit: qui verò id bibunt, torpescunt, quod extimescendū non est, sed excitari ipsi debent.

ἑλαφό-
βοσκον.
offic. gra
tia dei

ELAPHOBOSCO fœniculaceus caulis est, aut rorimarino similis, geniculatus: foliis duūm digitorū latitudine, ut terebinthi, prælongis, aliquatūm asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia ymbellas anethi

similes, & semina eiusdem: florē subluteum: radice ternum digitorum longitudinis & crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. contra serpentium ictus datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere. Aegineta, Cal. sic. 2. Substantia est tenui.

ELATINE folia habet helxine, minora, ἐλατίνη
rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, Capestra
quinis senisve, à radice foliosis, gustu astringentibus. nascitur in segetibus & cultis. Aegineta, Mediocri est frigiditate, & astringitione donata. rapistrū

ELEOSELINVM in humidis nascitur, ἐλεοσέλι
fatuo grandius, & ad eadem efficax. Aegineta, Palustre apium idem potest quod hortense. νον.

ELICHRYSON quidā chrysanthemon, ἐλίχρυ
nonnulli & id amaranton vocāt, quo deorū σος.
simulacra coronant: ramulum habet candidum, virentem, rectum, firum: folia intercedentibus spatii angusta, abrotono similia: Chanosū
comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. nascitur in asperis, & torrentium alueis, Aeg. Eius coma cum vino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est: mentes educit, sanguinem coactū ex mulso pota maius

dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

ἐμπέτρον
Saxifra-
ga.

EMPETRON aliqui phacoides vocant, nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu. sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Aeg. Pituitam & bilē purgat. Est etiā falsum, quare absterfionibus accommodatur. (Cognomen eius prassoides apud Paulū legitur, non phacoides.)

ἐννεάφυλλον.
λόν.

ENNEAPHYLON herba Plinio folia longa nouem habet, causticæ naturæ. in lumborū doloribus, & coxendicum imponitur utilissimè: continuo enim pustulas excitat.

ἐφήμερον.
Μυσγετ

EPHEMERON, aliqui sylvestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem, florem candidum, amarū: semen molle: radicem vnā digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis & opacis. Aegineta. Mistæ potestatis est & repellentis, & discutientis per halitum. (Ephemeron venenosum in Colchico depingetur.)

ἐπιμήδιον.
Epime-
die

EPIMEDIUM, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atq; duodenis, neq; florē neque fructum ferēs, radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. nascitur in humidis. Aeg. Virtus eius est mediocriter frigida cum humiditate aquosa: quod si illinatur, mammas rectas conseruat. dicitur etiam sterilitatē potu facere.

ἐπιπακτίς.
τίς.

EPIPACTIS ab aliis helleborine, par-

ua herba, fruticosa, exiguis foliis. Iocinoris
vitiis utilis, & contra venena pota. Idē Aeg.

ΕΡΙΘΥΜΟΝ, flos est è thymo durio. *ἐπίθυμον*
re, satureiæ simili, capitula habet tenuia, & le-
uia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta.
plurimū in Cappadocia, & Pamphylia gi-
gnitur. Aeg. Cal. sic. 3. thymo efficacius.

ΕΠΙΡΟΤΙΚΑ mala, quæ latinè orbicu- *ἐπέροτε*
lata dicuntur, stomacho utilia, sistūt aluum, *καμῆλλα*
vrinas euocant, malis tamen cotoneis inua-
lidiora.

ΕΚΒΙΣΕΤΥΜ in riguis, & scrobibus na *ἑκβίσει.*
scitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, *Prela ou*
in se farcti, rubescētes, scabri, & iunceæ circa *cauda*
eos folia, crebra, exilia in sublime equisetū *equina*
attollitur, vicinos arborū caudices scandens,
obuolutūmq; depēdet, comis multis, nigris,
vt equorum cauda. radix lignosa, dura. Alte-
rum equisetū caulis est rectus, cubitalis, aut
maior inanis. comis per interualla breuiori-
bus, candidioribus & mollioribus. Id cū ace-
to tritū vulneribus remedio est, eadēmq; fun-
gitur facultate. Aeg. Hippuris astringentē cū
amaritudine facultatē possidet, cōq; valēter
simul & sine morsu desiccat. vulnera maxi-
ma committit, intestinorum ramicibus opi-
tatur, & vitiis fluore infestantibus cū vino
pota medetur.

ΕΡΙΚΑ fruticosa arbor, myricæ similis, *ἐρίκη*
longè minor. cuius flore apes reprobū mel Bruyre

efficiunt. tam flos quàm coma serpentium i&ti-
bus illitu medetur. Aegineta, Vi pollet discu-
tiente citra rosionem, flore ipsius potissimum
& foliis utendum.

ἑνύγγιον
Centum
capita.

ERYNGION aculeatarum generis est.
Cuius folia in principio, sale cōdita, in cibos
recipiuntur. lata autem sunt, & extremo am-
bitu aspera, gustu aromatica. Eryngio, cum
adoleuerit, complures ramulorum striæ ru-
bēt, in quorū summitatibus globosa capitu-
la, durarum acutissimarūque spinarum am-
bitu stellatim circumuallantur, quorum co-
los aliās viridis, aliās albus, interdum cœru-
leus inuenitur. radix oblonga, lata, foris ni-
gra, internè candida, pollicis crassitudine,
odorata. Nascitur in asperis & campestri-
bus. Aegineta, Calfacit quidem non manife-
stò, siccitatis autem haud obscure nec modi-
cè particeps.

ἑρινός.
Herbe a
λακτοῦ
ocimum
aquatile.

ERINVS nascitur apud fontes & fluuios,
foliis ocimi, sed minoribus, parte superna di-
uisis, quinis, senisve, dodrantalibus furculis:
flore candido, semine nigro, & acerbo. folia
& caules lacteo succo turgent. Aeg. Eius semi-
nis denarij duo cum mellis denariis quatuor
illiti, oculorū fluxiones sistunt: succus aurium
doloribus benefacit. Alibi de echino scribit,
herba repellente & siccante ob suam acerb-
tatem, eadem autem erino videtur.

ἑριφία.

ERIPHIA septem lanuginosis ramulis

apii modo foliat, purpureo flore, & eo quidem perenni, semine fabaceo, totidem radiculis quot ramis. Hanc magi prodidere in a-uena scarabeum habere, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hœdi unde nomen accepit. Hac ad vocem præstantius esse nihil tradiderunt.

ERYSIMVM cereale, vel irio, culmo cō ἐρύσιμον surgit ferulaceo, foliis sesamæ similibus σιτῶδες guineis, flore sesamæ foliaceo, prorsus idem Ircon ou erat, nisi pinguis esset. Fruges est estiuæ, & an velaron te Vergiliarum exortum seritur. Italiæ ritu, alioqui in Græcia & Asia earundem o. casu. Recēs sato irioni pluuius imber nocet, quam quam reliquis frugibus, pdesse credatur: quo virēte sicuti sesama, nullum animal vescitur, quod amarus sit. Gale. Erysimū corporis co- alitu sesamo vicinū, sed insuauius longe esu, tenuis alimenti, in omnibus ipso deterius, vt panicum milio. Vtrunq; tamen calidum est, sitimque cibo concitat.

ERYSITHALE foliis est acanthi, luteo ἑρύσιθαλ flore. datur in vino contusis & euersis. λές.

Cruda **ERVCA** venerem largiore cibo ἐρύσος concitat. semen eodem effectu prodest. urinā Erucque cit, cōcoctioni prodest. aluo perquàm cōmo ou ro- data. semine ad cōdimenta vtuntur. quod, vt quette in longū tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiam- num syluestris cruca, maximè in Iberia, que

occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. vrinam vehementius pellit, multo satina acrior. Aegineta. Eruca similis erysimo est, temperamēto flatulēta, ob quod ad venerē instigat. semen ipsius urinā quoq; mouet. Syluestris domestica valentior est.

ῥαχὸς.
Non est
hæc du-
relle vul-
garis

ERVILIA genus est leguminis, folio q̄ faba longiore, flore apibus gratissimo, ideo circa alucaria feri præcipiunt. Eisdem quibus lens pinâtur modis. At eruilia syluestris herba est, amaritudinis eximiæ, colore & folio cicerculæ, quanquam minore.

ῥοβος.

ERVVM paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Parandæ farinæ ratio hæc est: vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. postea torrentur, vsq; dum hians cortex disrumpatur. molitæque, farinario cribro incernuntur. postremo farina recõditur. Aeg. Eruum cal. 1. sic. 2. cum amaritudine, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptū, sanguinem per vrinam expellit.

πλατύ-
φυλλος.

ESCVLVS, vel æsculus inter glandiferas folii amplitudine præstat. Hinc Græci platyphyllon, id est latifoliam vocāt, vt quibusdam placet fago proceritate & glande inferior est. Galla visu quidē quernæ nō dissimili nisi

nisi quod lenior, sed ad rem nullam utili: verum alteram nigram habet, qua lanæ inficiuntur. Fert glandem hispido calyce, grandē, bonam, fungosam, carnem fieri ea tradunt. Folium graue, carnosum, procerum, sinuosum lateribus. Quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Autūno reddit fructū, si Vergilio credimus. (Per multa quæ assignantur latifoliæ tam à Theophrasto, quàm Plinio, in esculo etiam inueniuntur: quapropter si non eadem sit, ab ea tamen non multum dissidet.)

E V O N Y M O S, aliqui anonymon vocant, quum alibi, tum in Lesbo insula proueniens, punicæ mali magnitudine, atque folio eiusdē, maiori quàm vinca peruinca, & ut punica tenero. flore albæ violæ proximo, odore graui ac pestifero, folliculis sesami, in quibus acinus quadrāgulus, solidus, siue spissus, qui in versus quaternos digeratur, pecori gustatu letalis, sed & capris præcipuè mortifera sunt & folia, nisi præcipiti alui deiectione succurratur. Germinat mense septembri, floret vere. Arbor est infœlix.

E V P A T O R I V M, fruticosa herba est, vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalē, interdū amphorem: foliis per interualla quinquefolii, aut cannabis magis similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, herbari-

ἰωνύμος
Fusaria
ou fusaria
num

ἑπάρω-
ριον.
off. agri-
moine,
nōtamen
herbari-

orū q̄ est per ambitū ferratis. semen medio caule er-
 hydropi pit pilosū, deorsum spectās, quod siccatum
 per vestibis inhæret. Nec desunt qui aberrantes,
 argemonem hanc appellarint, cum tamē lon-
 gē alia sit, vti exposuimus. Aegin. Tenuem
 vim & incidentē sine cōspicuo calore habet,
 qua iecur obstruētum expurgat, est & nōnū-
 lins astrictiōis particeps.

*εὐφώ-
 βιον.*

EUPHORBIA Libyca arbor est, ferulæ
 speciem habens, quę in monte Atlante iuxta
 Mauritaniā inuenitur. ea acerrimo succo tur-
 get, cuius eximium feruorem expauescentes
 incolæ, ouillos vêtres elutos, arbori circumli-
 gant, & eminus caulem contis incidunt, con-
 festimque è plaga, perinde atque vase quo-
 dam, in ventriculos copiosus lactis humor ef-
 fluit, præter id quod humi sparsum, vulnus
 eiaculatur. Duo succi genera, vnū orobi ma-
 gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum
 in ventriculis concrevit, atque vitreū specta-
 tur. Eligendū est translucens, & acre. Euphor-
 biū adulteratur sarcocollæ & glutini mistio-
 ne. sed difficile quidem experimentum, quip-
 pe cum leui gustu, os accēsum diu detineat,
 adeo vt quicquid ori obiiciatur, planē eu-
 phorbium resipiat. Eius inuētio tempore Iu-
 bæ regis Libyæ cognita extitit. Aegin. Adu-
 rentem vim sortitum est subtilēmq̄, aliis li-
 quoribus similiter.

F

F A B A non multū à medio tēpe-
ramēto recedit, siue refrigerādo κρύαμος
siue siccādo: caro ipsius nōn ul- Foccus

lius etiā abstersoriæ qualitatē est, excreatio-
nibus è thorace & pulmonibus utilis. Quū
autem cortex fabæ nonnihil quoque astrin-
gar, tota ipsa in posca decocta cœliacis & dy-
sentericis conducit, illita verò inflammatio-
nibus & tumoribus medetur, lac in mammis
extinguit.

Aegyptiā **F A B A**, quam aliqui Ponticam κρύαμος
vocant, in Aegypto plerunque prouenit. in αίγυ-
Agiæ etiam Cilicięque lacubus inuenitur. Fo- πριος.
lia habet ampla, etiam si ad arborū frondes
comparentur: caulem cubitalem, digiti crassi-
tudine: florem roseum, dupla papaueris am-
plitudine. & ubi flore exuitur, fert folliculos
vesparum fauis similes, in quibus faba supra
operculum, bullantis ampullæ modo, pro-
minet. Cibotion ideo nominant, id est arcu-
lam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ
mandata, & ita in aquam demissa. Radice fir-
matur harundine crassiore. quę cruda coctā-
ue estur. ei colocasiæ nomen est. Faba vi-
rens manditur, & exiccata nigrescit, vul-
garem magnitudine superat. Aegineta, Ae-
gyptia faba humidior nostra est, & excre-
mentitia.

F A G V S easdem quercui vires habet, sed φρυός.

g ij

Fou, intensiones vt etiam ilex. tenera eius folia il-
faux, fou lita non instrenuè siccant. (Alterū fagi genus
teau, ou quod Latini sciscimā vocant) in oxya quere.

hestre
υαρηξ.
Ferule
FERULA. caules, si edantur, capitis dolo-
res faciunt. muria condiuntur. Ferula itaque
caulē profert ternū sæpe cubitorum: folia
fœniculi, longè asperi ora & latiora. qua ab
imo caule vulnerata sagapenū efficitur. Aeg.
Ferulę semen extenuat calfacitq; medulla ip-
sius viridis adhuc astringit, eoq; sanguinem
spuentibus, & cæliacis accommodatur. (De
Sagapeno suo loco dicemus.)

σῦκον.
Figuier
FICUS arbor calidi tenuisq; temperamē-
ti est, adeo vt liquor & foliorum succus non
rodat modò aut abstergat vehementer, sed e-
tiam exulceret, ora venarum aperiat, & myr-
mecias exterat. quin etiā purgandi vim obti-
net. At syluestris ficus quam caprificum vo-
cant, in omnia efficacior est domestica. Fi-
cus fructus aridi in secūdo ferè ordine siccāt.
(Galenus habet, cal. 2. nō autem sic. 2. videli-
cet principio secundi, aut fine primi calefa-
ciunt) pingues autem, duos tumores magis
maturant, acriores detergant discutiuntque.
Decoctum ficuum mellis speciem referens,
quod iam nonnulli siræon appellāt, viribus
melli respondet. Virides quidem ficus imbe-
cillioris virtutis sunt, vtræque tamen & viri-
des & aridæ aluum subducunt. At ficus ca-
prifici acres & discussoriæ sunt, quemadmo-

dum ex domesticis grossi.

TRICHOMANES nascitur eisdem in locis quibus adianton, filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinē utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat. Galenus, Trichomanes, quæcunque adiantum, efficit.

τριχομα
νις.
capillus
veneris

FILICULA nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuū, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisione. radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporū, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbaei, austera aliquantum, & gustu subdulcis, Aeg. Sic. abunde citra morsum. potum, inferius purgationem molitur.

πολυπό-
διον.

FILICI folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeūt, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitem nigra, oblōga, filices multas fundente, subastringente gustu nascitur in montibus & saxosis. Filix fœmina foliis est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. aliæ etiamnum rubræ inueniuntur. Aeg. Vim siccandi & amaram representat, eaque fœtus

πτίς.
Feugiere

θυλόνπι-
ς.

corrumpit, latosque lumbricos enecat, instat
quatuor drachmarum cum mulla pota. Quo-
niam verò modicè cōstringit, vlcera citra ro-
sionem desiccare potest.

FLAMMEAM violā in scopā regia de-
scribemus.

μαράθρον FOENICVLVM in Iberia quæ ad occi-
Fœnuil dentem spectat, succum reddit gummi simi-
lem. Caulem medium, dum herba floret ru-
stici demetunt, ignique admovent, quo faci-
lius vi coloris exudans, gummi remittat. quod
iππομά- efficacius succo est, ad medicamenta oculo-
ραθρον. rum. Est & sylvestre fœniculum, magnum.
iππομά- fert autem semen cachryi simile, cuius radix
ραθρον. iucundè olet. Traditur aliud hippomarathi
iππομά- genus, longo, exili, & angusto folio, semine
ραθρον. coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfa-
ciendi naturam habet, & viribus fœniculo re-
spondet, ad omnia infirmius. Aeg. Cal. 3. sic.
1. Hinc etiam lacti generando est, & suffusis
auxiliatur.

τῆλιν FOENVM GRÆCYM ex secundo or-
dine calidum est è primo siccum, idcirco fer-
uidas inflāmationes irritat, minus autē cali-
das & induratas magis discutiēdo persanat.

Fresca FRAGA gerēs herba sine caule spargitur
humis, multis à radice lanuginosis pediculis,
flore candido folio trigemino, per ambitum
ferrato atque venoso. fructu exiguis quidem
moris haud absimili, cæterum sui generis,

solido calloso, tenero, rubente, tū gustu tum
etiā odore suauiss. radice foris atra, intus can-
dida, multo fibrata capillitio. fronde perpe-
tua. Cultus diligentia non magnitudine so-
lum proficiunt, sed interdum etiam è rubris
in candida degenerant. Herba cibo sumpta
medetur lienosis, itē succus ex melle potus.
Idem cum pipere candido datur suspiriosis.
Fraga sitim sedant, stomacho prosunt, pręser-
tim bilioso. Succus fragis exprimitur vetusta
te vires accipiēs, pręsentaneo remedio ad fa-
ciei vlcera, oculorū suffusiones, epiphorásq;.
Radici decoctū iocinoris feruores mulcet
matutino & meridie potum. Cal. sic.

F R A X I N V S arbor nota est. Agin. Folia
eius pota viperarū morsibus succurrūt. Cor-
tex crematus illitusque ex aqua lepras sepa-
rat. Ligni verò ramenta si bibantur, letalia ef-
fe ferunt.

μιλία
Fresne

E R V C I marini generibus quoddam la-
tum, & alterum sublongius, & rubens. tertiū
candidum nascens in Creta, floridum valde,
quod nulla corruptionis labe polluitur. Hoc
fuo quidam putant mulieres suum colorem
mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem no-
minis qua sese fucant. Aegineta, Refrigerat
siccátque in secundo abscessu, ac mediocriter
etiam astringit.

φύκος
θαλάσ-
σιον.

F Y M A R I A. vide Capnos.

F V N G O R V M differentia duplex. aut
g iij

enim māduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignūtur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpētis cauernam, arborēsve, quę priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum concretāque pituitam, terrāque eruti quā celerrimē computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Aegineta, Frigidi & humidi admodum tēperamento sunt nōnulli ipsorum manducati etiā exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participes.

G

γαλβάνη

G

ALBANVM succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant.

Maximē laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimē lignosum, retinens nō nihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Si purgare galbanum voles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt, quas hoc modo facile

separabis : mundo linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum vasis non tangat : opertoque vase in feruidam aquam demittito : sic enim sincerum veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit. Aeg. Calfacit 3. sic. 2. Mollendi & discussoria vi donatum.

GALION, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. Γάλιον
ramulum foliumque habet aparinae simillimum, rectum : florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. radix vernerem concitat. Nascitur in palustribus. Aeg. Siccandi vim, mediocremque acrimoniā habet : flos eius ad sanguinis ex naribus eruptio-
nes & ambusta congruit.

GALIOPSIS, frutex in totum caulem γαλίopsis
& folia habet viticæ, leuiora, & quæ grauem Videat cē
odorem trita reddant : flore purpureo tenui. agripal-
nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac se- ma offic.
mitas ubique. Aeg. Scirrosos tumores dissipa-
pat & emollit. item ad vlcera serpentia facit
emplastri modo imposita.

GALLA fructus est quercus. Aliqua om- κηκίσι
phacitis appellatur, parua quidē, sed tubero- Noix de
sa, solida, nullo foramine peruia. altera pla- galle.
na, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis,
quæ efficacior est. Aegineta. Omphacitis, id
est immatura medicamentum est affatim a-
stringens, cāque ob causam siccatur, fluxio-

nes repellit contrahitq; , laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectionibus accommodata est. Frig. 2. sic. 3. Altera quæ flauo colore inanis magnâq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes, & procidentias excocta iuuat. Gallæ vero combustæ, & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

γλαῖρος.

GALLICA, genus est aceris campestre, præcipuo candore, minus crispa, rariorq;.

GALANGAE magnus usus apud recentiores medicos tã Græcos quàm Latinos erupit. Radix vulgò etiam nota, quamuis aliunde procul comportetur. Deligèda ponderosa, rubenti cortice, gustu per quàm acri, odorata. Sunt nebulones, qui in tortis iunci radicibus in aceto piperato maceratis galangæ mentiantur acrimoniam: sed impostura detegitur, cortice derafo, qui hunc saporẽ exhiberat. Cal. 3. coctionem iuuat. stomachi ex frigida causa dolores finit. spiritus digerit cocta ex vino. Cerebrum roborat naribus indita. Os commendat. Ex succo plantaginis datur quibus cor palpitans micat. Cœliacis, & coli doloribus noxio spiritu conceptis auxiliatur. acidis subuenit ructibus.

γεντιανή
Géciane. GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorũ regi, à quo cognomen tum habuit. foliis partim proximè radicem,

iuglandi plantaginive similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & levi, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervalis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad spondylii semen accedente: radice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisque. Aegineta, Gentiana radix efficax admodum est extenuare, purgare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

GERANTION foliis anémones, diuisis longioribus: radice sub rotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: foliis maluæ. in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus. Aeg. eadem.

GERONTOPOGON, id est, senilis barba: foliis est hirci barbula, tenuioribus, longioribusque, instar capillorum prælongis: caule paruo, super quæ calyx lógus, & barbula quæ summo vertice senum more incana funditur. flore luteo nitet, qui involucres barbulae evanescat. lacte manat. radix est amara. iocinosos & stomachicis succus decocti potus

γεράνιον.
Duplex,
vna offi.
acus pa-
storis
alt. pesco-
lumbin^o.

γερντό-
πων.
vulg. bar-
be de p-
stre, ou
barbe de
Dieu.

conuenit. Renum vitiis & vesicæ succurrit.
Ex aceto ciet vrinas. Semen singultus sedat,
aliū sistit, & intestinorū inferctum expli-
cat. (Quantum ab hirci barbula differat ex
Græci nominis descriptione, id est tragopo-
gonis, conferendo discere potes.)

γῆθρον.

Siboule
oucebule
ou ciuōs.

GETHYVM Theophrasto penè sine ca-
pite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totū
in fronde, sepiusque resecatur, vt porrū: qua-
propter & illud serunt, non deponunt, mensi-
bus Martio, Aprili, & Maio. Secunda semen-
te post æstiuum solstitium defigitur. Deci-
mo aut duodecimo die prosilit, sed è recenti
semine maturius. Nō anniculum modo, sed
& bimum quoque fructificat. Germinat è la-
tere, vno caule consurgit, sed quo radix ipsa
deficiatur, foliis intus cauis. Condimentari-
um est, & ceparum generis. Minimè autem
durat. Plinius à Latinis pallacanā vocari tra-
dit. Sunt è Græcis qui gethyllida pro gethyo
acceperunt, quod & epithyllida vocauerunt.
Didymus gethyō simile fecit ampelopraso.
Epænetus capitatum porrum gethyllida tra-
dit appellari.

γῆον.

Mors a
diabole.

GEVM radículas habet odoratas, & iucū
di saporis ad discutiendas cruditates, pecto-
risq; & laterum dolores.

GINGIBERIS sui generis planta est,
γινγίβρι in Troglodytica Arabia magna ex parte na-
gîngébre scens. qua virente, ad multa, perinde atque

nos ruta, vtūtur, & primis potibus & edulis
admiscent. Huius radices, cyperi modo, par-
uæ sunt, candicantes, & odoratæ, atque piper
sapore imitātur. Eligi debent quæ teredines
non nouerunt. A multis tamen ob id cōdiun-
tur, quòd celeriter cariem sentiant. Ficilibus
in Italiam asportantur. Gingiberis cibo con-
ueniens est, & cum condimento assumitur.
Aegineta. Impensè quidem calefacit, sed nō
primo statim occurſu, quod inuictæ cuius-
dam & crassioris humiditatis particeps sit,
propter quā etiam facile perforatur, firmam
autem conseruat caliditatem.

GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Sy- γιγγίδιον.
ria & Cilicia plerunq; nascitur. herbula syl- ov.
uestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior, Non est
radice parua, candicāte, subamara. Olus hoc hæc fuma-
crudum, coctum, conditūve estur. Aeg. Ca ria, sed
lorem non adeò manifestum sortitū est, cate cherefo-
rum siccat in abscessu tertio & astringit, qua lium.
de causa & stoma. 'io utile est.

GITH exilibus surculis fruticat, sæpe bi- μελάνθιον.
nos dodrantes excedens: foliis, vt senecionis ov.
minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in Nyelle.
cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblō-
go, intercurſantibus intus membranis, quib⁹
semē includitur nigrum, acre, odoratū quod
panibus inspargitur. Aeg. Calefacit, siccat
tertio. tenuis est substantiæ, vnde destillatio.
nibus in nares olfactu prodest, intus assum.

pta discutiendis flatibus singularis est: quin-
etiam amari particeps deprehenditur, quo
lumbricos interficit: abstergit & incidit, hinc
quoque recta ceruice spirantibus commodè
exhibetur. item lepras extergit, myrmecias
eiicit, & menstrua incitat.

ξιφίον. XIPHION, alii phasganon, alii machæ-
offic. spa- ronion, Romani gladiolum, vocant. nomen
thula fœ- inde accepit, quod foliū gladii præbeat spe-
rida. ruri- ciem. iridi simile erat, nili minus & angusti-
gladius. us videretur, & gladii modo mucronatū, ner-
falso lon- uosumque in caulem exit, cubitalem, in quo
chitis exi- purpurei flores, in ordinem digesti, inter se
stimatur. distant: rotundo semine: radicibus geminis,
vna, bulborū modo, super alteram insiden-
te. quarum inferior gracilis est, superna ube-
rior. nascitur in aruis. Aegineta, Gladioli ra-
dix trahit, discutit, & ficit.

GLANDES, in quercu indicabuntur.

καστανά, GLANDES SARDIANÆ, quas aliqui casta-
Chastai- neas, aut lopima, aut glādes Iouis appellant,
gnes. similēsque effectus præbent, præsertim tunica
quæ carnem & corticem media intercurfat.
caro his qui ephemerum biberūt, conueniēs
est. Aegineta, Castanæ omni ex parte reli-
quis glandibus præcellunt.

βάλανος GLANS vnguētaria, fructus est arboris
μυρσίνης myricæ similis, in magnitudine auellanæ nu-
κή, cis, cuius nucleus græcarum nucum more tri-
tus, humorē reddit, quo ad preciosa vnguen-

ta pro oleo vtuntur. nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Aeg. Quæ intra vnguentariam glandem seu carnosâ sunt, abstergerendi incidendiq; cū astrictione vim habet, eamq; ob causam denarii vnus pondere cum multa pota, facile vomitiones cient, & inferiorē ventrem subducit, cum posca verò laxandis extis accommodata sunt. Item cutis vitia cum aceto peruncta exterunt. Cortex alioquin egregia astringendi virtute pollet.

SATIIVVM glastum quo infectores la- *ioatis*
narum vtuntur, folium habet plâtagini simile, Guedum
verū pinguius nigriusq;. cuius caulis duū ou guel-
cubitorum altitudinē excedit. Syluestre gla- dum ou
stū satiuo simile est, folia fert maiora, lactu- lherbe de
caceis proxima. caules prætenues multos. S. Philip-
dos, quadam tenuis rubentes: in quorum ca- pe. ou In
cumine folliculi multi dependent, quandam dicū à co
linguarum effigiem referentes, in quibus se- lore. pa-
men, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprâ stilli ab
dicta præstat. potu & illitu lienosis auxilia- effigie.
tur. Aegineta, Isatis domestica qua tinctorum
vtuntur, siccandi vires & astringendi habet.
hinc est quod magna vulnera in duris glutina-
nat corporibus, sanguinem erumpentē com-
pescit, laxos tumores discutit, ac omnibus
malignis vlceribus resistit. Syluestris au-
tem cum magis rodat, magisque ideo siccet,

valentius aduersus humidās putredines pugnat, ad cætera deterior, ut quæ immoderatus mordeat. Cæterum ob virium vehementiam lienosis quoque vtiliter adhibetur.

γλαύκιον
memitha
offi.

GLAUCIVM, succus est herbæ quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terrâ sparsis odoris tetri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigridis clibanis calfaciunt indigenæ, vsque dū flaccescant, deinde contusis succum exprimunt. Aegineta. Glaucium astringit, gustanti nonnihil ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi sacris ignibus non validis succurrit.

γλαύξ.
Nomen
vulgo nō
habet.

GLAUX cytiso & lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantē alti. flores ceu violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Aegineta, Calidi & humiditatem temperamenti gratia lacti generando idonea est.

γναφάλιον.
Vulg. cruciata.

GNAPHALII foliis mollibus minutisque pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam. Sunt enim calida & modicè astringētia. Aeg. (Vide Clematis tertia.)

γοσσίπιον.
ἄχρωσις.

GOSSIPIVM in Xylo declarabitur.
GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus

quibus crebro radices spargit dulces, articu- Dent aſ-
lis præcinctas. folia dura, & vt arundinis par chien.
uæ, lata, in exilitatem faſtigiantur, eaque iu-
menta & boues pascunt. Eſt & arundinaceū
gramen, priore multo maius, quod iumenta
necare traditur, præſertim in Babylone: idq;
iuxta vias naſcitur. Quod in Parnaſo monte
gignitur, denſius fruticat: foliis hederaceis:
flore odorato, candido: ſemine paruo, non
inutili: radicibus quinis aut ſenis, digitali
cræſſitudine, candidis, mollibus, & admodū
dulcibus. Natum in Cilicia gramen, quod
incolæ cinnam appellant, boues inflammat,
ſi eo virenti ſæpe pascantur. Galenus: Gra-
minis radix mediocriter frigefacit & ſiccatur.
Parū aliquid mordax habet ac ſubtile. Her-
ba frigefacit primo, inter humidum & ſiccū
media. Huius ſemen alibi quidem imbecillū
eſt, in Parnaſo autem inuentum ſiccatur, ſub-
tile, ſubacerbūque eſt.

GROSSI, quæ erinci nonnullis vocan- ὄλυνθοι.
tur, acres & diſcuſſorii ſunt, liquoris gratia
qui in iſtis cōtinetur. Cocti igitur duros tu-
mores diſſipant: crudi myrmecias & thymos
exterunt. Aegineta.

GUMMI ſiccante vi & emplaſtica pol- κόμμι
let, & nimirum aſperitatibus medetur.

h

H

ἄλιμος.
Blanche
putain.

H

A L I M V S frutex est sepimentis idoneus similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Aeg. Dissimilarium paritium est, saluum gustu, & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, & lactis ubertatem conciliat.

ἡάλαμος
Câne ou
arunde.

In **H A R V N D I N V M** genere quædam nastos, id est farctior, vocatur, ex qua sagitte factitari solent. alia scemina, qua tibiæ arum ligulas efficiunt, alia quod fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdā cypria, ab aliis donax appellatur. alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cædicans, vulgò cognita. Aeg. Calamus phragmites extergit, folia ipsius viridia mediocriter refrigerant. Cortex crematus calfacit, siccat tertio. Radicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere asserunt.

ἄσφῶδελος.
haste roy
alle. offi.
afrodili.

H A S T V L A regia vulgaris notitiæ est, foliis maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant. radices subiacent oblongæ, rotundæ glandibus similes, gustu acres. Aeg. Asphodeli radix vim habet detergentem discutientemque.

Concremate autem ipsius cinis calidior, sic-
cior, & tenuior euadit, quo fit ut pilorū de-
fluuiis medeatur.

HEDERA differentias multas in specie κισός.
fortitur, summas autē genere treis. Nam quæ Lierre.
dā candida est, altera nigra, tertia helix can-
dida, fructū fert candidum: nigra nigrū, aut
croci emulum, quā vulgus Dionysiam vocat.
helix fructū non gignit, sed albas habet viti-
culas, & folia parua, angulosa, & concinnio-
ra. Aeg. Hedera contrariis constat viribus, ut
quæ astringat & refrigeret. Item acris est &
calida, aquæ substantiæ & tepidæ, cum viri-
dis est, particeps. Eius folia vino incocta vul-
neribus glutinandis, ambustis & lienosis sa-
lutariter adhibetur. Succus ipsorum naribus
ad pituitam educendam infunditur. diutur-
nis aurium defluxionibus succurrit. Lachry-
ma hederæ, ut quæ actior sit, pediculos ene-
cat, & pilos abolet.

HEDYSARON, vide Securidaca.

HELENIVM folia habet verbasci angu- ἑλένιον.
stioris folii, asperiora, oblōga: caulem qui- offi. enu-
busdam in locis non emittit: radicem subal- la. rum. cā
bidam, interdum subrufam, odoratam, suba- pane, ou
crem, vegetam, magnā, ex qua agnatæ pro- enulacā
pagines liliorū aut ari modo seruntur. Mon- pana.
tibus in vmbrosis, siccoque solo prouenit. Fo-
ditur æstate radix, particulatimque dissecta
siccat. Alterum helenii genus in Aegypto

gigni Crateus tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus: foliis, lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. Aeg. Heleniū calidum est & siccum cum excrementitia humiditate. quare & eclegmatis temperatū infarctos thoraci humores educit: ac particulæ ex eo ruborem contrahunt.

ἡλιότρο-
πιον.

herb. flos
cæcri. fal-
lūtur, qui
soulfz
putēt, aut
offi. calē-
dulā, aut
solis spō-
sam.
Siue scor-
piuron.

HELIOTROPION magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliūt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur vt scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili rotundo. Aegineta, Maius calidam, siccam & abstergentē vim præ se fert, cui⁹ decoctū potu educit pituitā, bilēque. Illitu fructus ipsius myrmecias & huius notæ vitia perficcat. Minus autem heliotropium & hæc abolet, & lumbricos in-

terimit, si cum fructu, nitro, hyssopo, & cardamomo bibatur.

HELXINE nascitur in parietinis, sepi- ἐλξίνη
bus & maceriis, folia ei mercurialis insunt, Parietai-
hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos ve re ou mu
luti semina aspera, adhærentia vestibus. Aeg- raile,
gineta, Hanc alii aliter nuncupant, perdi-
cium, parthenium, fideritim, heracliam. ab-
stergit, leuiter astringit cum humiditate sub-
frigida,

HELXINE cognomēto cissampelos, fo- ἐλξίνη
liis est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, κισάμπε
quibus complectitur quodcunque contige- λος.
rit adminiculū. nascitur in sepibus, vinctis, & vineage,
segetibus. foliorū succus potu deiicit aluum. ou vitreo
Aeg. Vim habet discutienti. le.

HEMEROCALLIS foliū & caulem ha ἡμερο
bet lilii, porraceo colore. flores in caule per καλλίς.
singulosexortus terni, aut quaterni erūpunt, liliū agre
liliū diuisura, quoties dehiscere cœperunt, co ste ou
lore per quā pallido. radix magna est at- marinū.
que bulbosa. Aegineta, Radix eius viribus
lilio respondet, similiter illi ambustis opi-
tatur. ἡμιονίς

HEMIONITIS, quam aliqui splenion Falso ab
vocant, folium emittit dracunculi, lunatum. off. scolo
radicibus cohæret multis, tenuibus. nunquā pendria,
flores, neque semen, neque caulem gignit, in ab herb.
petrosi nascens, austero sapore. Ea ex aceto nōnullis
pota licnem absomit. Aegineta, Astringens lingua
h iii cerui.

simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

Ἡρμόδακτυλος. HERMODACTYLI radix per se, & ipsius decoctum, vim habet purgandi: arthriticis priuatim cum humores defluunt exhibetur. Stomacho vehementer aduersatur. Aegineta.

Ἰακίνθος. HYACINTHVS folia habet bulbi: drantalem caulem, minimo digito tenuior, rem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem bulbaceam. Aeg. Radix siccatur primo, frige facit secundo. Pueros itaque impuberes diu conseruare cum vino illita creditur. Semen leuiter abstergit astringitque, idcirco arthriticis cum vino datur, vt quod desiccat magis quam refrigeret.

Ἰδρωπάθος. HYDROLAPATHVM rumex est in aquis nascens.

Ἰδρωπίπερι. HYDROPIPER apud aquas nascitur quæ stagnat, aut pigro lapsu repunt. caulem edit geniculatum, prædurum, multis alis condici per cauum: folia menthæ, maiora, molliora, canpatorio didioraque, gustu piperis, acri, citra tamen falso videntur ullam odoris gratiam: fructum acrem, in surculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita tumores veteresque duritias discutunt. sugillata delent. quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipere in obsoniis admiscuntur. Radix parua, nullius in medi-

cina momenti. Aegineta. Herbula est calida, sed non piperis modo. Facultates similiter Dioscoridi docet.

HIERACIUM magnum, caulem emit- ἱεράκιον
μεγα.
tit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: cichoree
iaulne.
folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia
soncho per ambitum: luteos flores in oblon-
gis capitulis. Vim refrigerandi habet, & mo-
dicè substringendi. vnde illitum, stomacho
æstuati, inflammationibûsq; prodest. succus
erosionem stomachi sorbitione mitigat. her-
ba cum radice illita, vibratis à scorpione iæti-
bus auxiliatur. ἱεράκιον
μικρόν.
Hieracium paruum, folia cichoree
fauluage
ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauli-
culos teneros, virentes, in quibus lutei flores
orbem circinâtes emicant. Vim suam ad ea-
dem ad quæ superior impendit. (Aegineta
non habet.)

HYOSCYAMUS vide in litera, a. fo. 24

HYOSIRIS intubo similis traditur, sed ὑόσιρις
humilior & tactu asperior. Vulneribus con-
tusa præclarè medetur.

HYPEROON, aliqui hypopheon vocât. ὑπέρκον.
nascitur in segetibus aruîsq;, foliis rutæ, exi-
libus ramis. Aegin. Frig. 3. papaueris viribus
proximum. ὑπερικόν

HYPERICUM, alii androsæmon, alii mille per
tuisou p-
forata.
corion, alii chamæpytyn appellant, quoniâ
semen odore resinâ imitatur, furculaceo fru-
tice, dodrantali, rubente, folio rutæ: flore al-
 vulg. ou
herbe S.
Ichao.

hæ violæ, luteo, q̄ digitis tritus sanguineū suc-
cū remittit, qua ex causa androsæmon cogno-
minatur: subhirsuta filiqua, & tereti hordei
magnitudine, semine intus nigro, resinosi o-
doris. gignitur in cultis & asperis. Aeg. Hype-
ricum duplex est. Alterū, quod androsæmon
& ascyrrhon appellatur, expositum est: alte-
rum verò calefacit & siccatur, tenui substantia
præditū, cōq; vrinas elicit, & menstrua citat.
Totum ipsius semē si cum foliis illinatur vi-
ride, cicatricē vulneribus obducit. Arida ve-
rò folia oblita vlceribus medentur. dantur
etiam potioni aduersus coxarum dolores.

Al. hypo
glosson.
ὑπόγλωσ-
σος.

HIPPOGLOSSON, frutex est folia ha-
bēs rusci tenuis figura, & spōsam comā, & in
summo ceu linguas ē foliis exeūtes. Capitis
dolorem corona ex comis imposita minuit.
malagmatis radix succūsq; admiscetur. Aeg.
Frutex est pusillus, cuius radix & succus c-
molliendi virtute pollent.

ἵππολά-
παθον.
offi. pari-
celle, ou-
grāde o-
zeille.
vulg. pa-
relle.

HIPPOLAPATHON olus est ma-
gnum in paludibus nascēs. easdem habet vi-
res quas supradicta rumicis genera. Aëtius:
Consimile est facultate lapathō, sed imbe-
cillius.

HIPPOMANES, secundum Crateiam,
planta est fructu cucumeris syluestris, folio
autem nigriori, tāquam papaueris spinoso.
Hæc Theocriti interpres. Sed apocynon
etiam hippomanes cognominatur.

HIPPOPHAES, quo fullones vestes interpolât, in sabulosis maritimisque nascitur, furculaceo frutice, vndiq; denso & largo, foliis oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. flores hederæ corymbis similes, racematim cohærent: minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. radix lacteo succo madet, crassa mollis, amara gustati. ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad vsum reconditur. Aegineta, Alij hippophyes vocant. Radicis liquor cum erui farina instar denarii datus, bilem ac pituitam purgat. Item totus ipse frutex siccatus, ad purgationes accommodatur.

HIPPOPHAESTON, id quod aliqui hippophaës appellât, nascitur eisdem locis quibus hippophaës, estq; spinæ fullontæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: foliis parvis, spinosis radículas habens molles, crassas. Succus radice, foliis, & capitulo exprimitur, & exiccatur Aeg. Succus trium obolorum pondere, cum aqua mulsa ad pituitam & aquâ vacuandam exhibetur: maximè congruit non nisi subrepta ceruice spirantibus, comitialibus, & nervorum affectibus.

HIPPOSELINYM, Latini olusatrum

ἵπποφαις
Lappago
seu lappula

Al. hypo
phæston.
ἵπποφα-
στον.
Lappago
seu mol-
lugo

Ache ou
hacche

appellât, aliqui smyrnion. quamuis aliud sit, quod propriè smyrniō dicitur, vt paulò pòst referemus. Est autē maius, & satiū apio candidius: caule alto, cauo, molli, habēte veluti lineas: foliis latioribus, in puniceum vergentibus: coma roris marini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat. ea semine turgēt nigro, oblongo acri, solido, aromatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat: In vmbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt apium. radix cruda coctāve estur. folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudāque muria condiuntur. Aegineta, Cum apio domestico virtute cōuenit, nisi esset imbecillius.

H I R C I barbulam in Tragopogone describemus.

ὑσώπος.
Hysope

H Y S S O P V M, herba nulli non cognita, duūm generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Aeg. Calefacit, siccit. 3. tenuisq; substantiæ est.

ὄλκος.

H O L C V S in saxis nascitur ficcis, aristas habet in cacumine tenues, culmo quale hordeū restibile. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacertū educit aristas è corpore: quare nonnulli Aristidam vocauerūt. Multis eam esse contendunt inter saxa proueniētem. Alij syluestrem esse volunt auenam.

H O L O S T I O N quadratalis herbula est, *Al. ὀλό-*
 humi repens: foliis viticulisq; coronopo aut steum
 gramine proximis, gustu astringentibus: *ra- ὀλότειον.*
 dice alba, pretenui vsque in capillamenti spe Herb.
 ciem, longitudine quatuor digitorū. nascitur mollegra
 in collibus terrenis. Carnes coguntur, deco- men. ruri
 ctionibus addita. Aegni. Siccatur, astringitque, canis deti
 hinc eo ad rupta vtuntur.

culus &

H O R D E V M optimum est, candidum diuina. nō
 putumque. Aegineta, Frigefacit, siccatur pri- est hec pi
 mo Nonnihil etiam extergit. Cæterum faba losella
 rum lomento siccitate præcellit, minus flatu *κρίτη.*
 lentum est. Polenta hordeo multo magis sic- Horge
 cat. Præfana præter quod largius humectat,
 etiam abstergit vehementius.

H O R M I N V M herba est, foliis marru- *ὄρμινον*
 bio similis, caule semicubitali, quadrangulo, Satiuū,
 circa quem eminentie siliquis similes prode- oruale
 unt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuer- toute bō
 sum semen recluditur. siquidem in syluestri ne
 rotundum, fuscumque inuenitur: in altero, ni offic. gali
 grum, & oblongum, cuius est vsus. Syluestre tricum
 magis viribus pollet: quare vnguentis, præ- herb. cen
 ferum gleucino, permiscetur. Aegineta, Cali trūgalinæ
 dum est mediocriter siccum & abstergens, vulg. sal-
 uerem igitur stimulat. oculorum crassities uia transf
 cum melle repurgat, tumores laxos discutit, marina
 & extrahit aculeos. Syluestre domestico est
 valentius.

I

Nō mul-
tū differt
à liferon
ou life-
rotte

I

ASIONE olus est syluestre, hu-
mi serpens, copioso lacte, flore
candido, & in hoc nobili quòd
singulari folio constet, sed ita implicato, vt
plura videantur, floris margine in angulos
exeunte. Plinius florem Cōcilium ait appel-
lari: sed quę Theophrastus de folio floris, ca-
Plinius de folio herbę scribit. Commēdatur
herba ad stimulandos coitus. Cruda, & ex a-
ceto pota, lactis vbertatem præstat. Salutaris
est tabem sentientibus. infantium capiti illi-
ta, nutrit capillum, tenacioremq; eius cutem
efficit.

ἰβηρίς.

Lepidiū
syluestre
fortē. her-
ba. pratē-
sis Vale-
riana

IBISCVS, quęre Althęa.

IBERIS, siue cardamantica, folia habet
nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem,
aut minorem. in incultis nascitur. æstate la-
ctem florē promit: quo tempore efficacior
est. Radices duas nasturtio similes habet, cal-
facientes & adurentes, ipse enim ischiadicis
cū salsa axungia emplastri modo vtilis, qua-
ternis horis alligatæ, vt dein in balneas descē-
datur, & postea oleo cum lana locus perun-
gatur. (Aeg. omisit.)

ἰδαία
ῥίζα.

IDAEAE radici folia sunt ea quę rusco.
adhærent his veluti exigui pampini, in qui-
bus flos. Aegineta, Gustu acerba, & viribus:
sanguinis eruptionibus & reumaticis affecti-
bus tum pota, tum extrinsecus imposita ac-

commodatur.

I L E X similes quercui vires habet, sed multo ea est validior. Galen.

I L E X est gemina Columelle, minor apibus quæ sita: & prolixior, omnibus improba ta mellificio.

πρίνος.

I L L E C E B R A, vide semperuium tertium. ἀνδρά-

I L L E C E B R A, quæ Græcis andrachne ^{χυν.}
agria nonnullis minus semperuium, sylue- ^{ἀνδρά.}
stris est portulacæ genus, maiori semperuiuo Pourpie
simile, nisi quod folia habet, pusilla, sed latiora, maculosaque: item breuius cacumē, fuluis
cauliculis, gustu salsum, lacteo succo, radice
tenui, candida. Nascitur in petris, & in ster-
quiliniis. Colligitur cibi causa, esturque cum
ficibus. Succo bilem regio morbo laboranti-
bus per aluum exigit. Ructus compescit aci-
dos. Vētris tumores, & iocinoris vitia leuat,
vrinam ciet. Eodem ægilopas Aesculapius
curauit.

I M P I A Plinio vocatur incana, roris mari ^{offi. Chri}
ni aspectu, thyrsi modo vestita: inde alij ra- ^{stoculus}
muli adsurgunt, sua capitella gerentes. ob id
impiam appellauēre, quoniam liberi supra
parentem excellāt. Alij potius ita appellatā,
quod nullum animal eam attingat, existima-
uēre. Hæc inter duos lapides trita feruct, præ-
cipuo aduersus anginas succo, lacte & vino
admixto. Mirūmque traditur, nunquam ab
eo morbo tentari, qui gustauerit: itaque &

suibus dari, quæque medicamentum id no-
luerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui
& in auium nidis inseri aliquid ex ea putet,
atq; ita non strangulari pullos avidius deuo-
rantes. Floret vere, tuncque decoquitur ad ser-
pentium morsus. Succo eius, vel etiam cine-
re, fistulas impleri tradunt.

I N T Y B V S. Quare Seris.

Ἰοςῶν

Ἰος.

Coque-

lourdes

Ἰερίσιμον

Ireon, ou

bruca ge

ratina,

outorte-

la

I O V I S flos inodorus est, nec nisi coloris
gratia coronamentis additus: ætius est, co-
lore purpureo.

E R Y S I M O N, Latini irionem vocant, iux-
ta vrbes, rudera, hortosque nascitur, foliis
crucę sylvestris: cauliculis in lori modum lētis,
& obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacu-
mine gracilibus, vt cœnogræco, corniculatis:
semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Ae-
gineta, Erysimi semen igneum calefactorium.
que est, nasturtio similiter: quare in fermento
tostum, thoracem purgat in eclegmatis assum-
ptum, duritiâsque emollit, & cæcos cancos
illitu adiuvat.

Ἴρις.

Herb. cœ-

lesteliliū

rur. flāme

ou glain

I R I S à cœlestis arcus similitudine no-
men accepit. Folia fert gladioli, sed maiora,
lesteliliū latiora, & pinguiora. Flores à caule æquali-
bus inter se spatiis distāt, varij: siquidem can-
didi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei
conspiciuntur: qua diuersi coloris specie,
quædam cœlestis arcus imago representari
videtur. Radices subiacent geniculatæ, du-

ra, odorata: quæ frustatim dissectæ, in um-
bra siccantur, & traiectæ lino reconduntur.
Melior est Illirica, & Macedonica: & inter
has laudatissima, quæ pumila ferè & densa
constat radice, frangenti contumax, subru-
fo colore, gustu amaro, odore perquam sin-
cero, ita ut nullum prorsus situm redoleat.
quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Se-
cundum locum habet Africana, candicans,
gustûque amara. Teredines in vetustate sen-
tiunt, tûc tamen odoratiores reddi solêt. Ae-
gineta, Affatim calfacit, extergit, & maturat,
tenuis substantia, tussi utilis. humores in pe-
ctore contumaces extenuat, torminibus me-
detur, sordida vlcera purgat, cum mulsa pota-
lium inanit.

ISCHAE MON serpit in terra milio simi ἰσχαμον
les, foliis asperis, & lanuginosis. Thracia eâ Miliû syl
inuenit, qua ferunt sanguinem sisti, non a- nestre q-
perta modò vena, sed etiam præcisa. Farci- dam esse
tur in nares ad cohibendum inde sanguinis volunt
profluuium. Quæ in Italia nascitur, & san-
guinem sistit eadem adalligata vnde cruor
manat.

ISOPYRON aliqui Phasiolon ob simili ἰσόπυρον
tudinem vocant, quoniam folium, quod est
aniso simile, in pampino torquetur. capitula
sunt in summo caule tenuia, plena seminis,
melanthii gustû imitantis. Aeg. Semen ama-
rum ac modicè acerbum est, ob quod crassos

glutinososque humores abstergit & incidit, sic ut corpora contrahat stringatq; hinc etiã quæ altè defident expurgat, excreationibus sanguinis non inefficax.

σχοῖρος. I V N C I duo genera. vnũ læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum: & crassiore constat calamo, carnosioreque. Tertius est iuncus qui vocatur oloschoenos, prioribus carnosior, asperiorque is similem supradicto fructum in cacumine parit. Aethiopici iunci semine somnus allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat. Aegin. Oxyschoeni, id est, acuti iunci semen est somnificum: holoschoeni autem dicti, minus, idem & capiti dolorem facit. Vtriusque semen fruxum si cum vino bibatur, alui fluores desiccet, & mulierum fluxiones cohibet.

Merisca
balgo

σχοῖρος ἀρωματικός. Offi. sguinātiũ vulgo pestilhis camelorum
Odoratus I V N C V S, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus repletus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit. igne mordacitatis ad linguam. floris, culmorum, radicisque est vsus. Aegine. Flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, quæ urinam mouet, & menses trahit,

obstruāque referat in fomentis, potu, & cataplasmatibus: radix adhuc magis flo-
re astringit, sed ille calidior.

IUNIPERI genera duo. altera maior, ἀρκυνθον altera minor. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grande-ou genere scire, aliæ nucem Ponticam æquare inveniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ: quæ arceuthides etiam, id est, δασ. baccæ iuniperi, nominantur. Aeg. Cal. sic. 3. fructus autem cal. 3. sic. 1.

L

δυναύδην.

ABRVM Veneris, Dipfacus. Vigne

L

LABRVSCA duorum generum saulvage est, alterius vva non murescit, viorne sed flore tenuis cenanthen nominatam perducit. altera ad frugem peruenit, parvis acinis, nigra, & astringens. Folia, caules, & clauiculæ, quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

LABVRNVM arbor alpina Plinio, nec vulgo nota, dura & candida materia, cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. odit aquas, nec nisi in ficcis provenit.

LACTORIS nota vulgò, secundum Plinium, plena lactis, quod degustatum vomitiones cõcit. Eandem hanc aliqui esse dicunt, alii similem illi quam militarem vocant, quod-

Lactaria ou ana- bula

niam vulnus ferro factum, nullum non intra dies quinque sanat, ex oleo imposita.

*Θρίδαξ.
Λαίτνε*

LACTUCA olus est non summè frigidū humidumque, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus cōuenit: præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluorem cohibet.

*Θρίδαξ
ἄγριος.
Videi et
se off. en-
diuia*

SYLVESTRIS lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora, amaro gustu est, & viribus aliquantum papaueri similis. vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aegineta, Superiori minus & refrigerat, & humectat, verum succulentior existit.

*Λάδανον
Strobon
recentio-
res vocāt*

Est & alterū cisti genus, **LEDON** à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascentis, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam cōtrahunt pingue. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant, quam depectentes incolæ, colantesque cogunt in offas, & ita recondunt. Alii vero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomérantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facilè mollescens, pingue, quod arenas nō collegit, nec squalore oblitum est,

resinosum, quale, in Cypro gignitur. Arabicum verò, Libycumque, vilius. Aegineta, Ladanon medicamen est præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tene, emolliens mediocriter, discutiens & maturans: còq; vteri affectionibus peculiariter còuenit. habet præterea nonnullas astringendi vires, quibus defluos capillos confirmet.

L A G O P V S herba sistit aluū in vino pota: aut in febris, ex aqua. eadē inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus. Siccæ facultatis est. Aeg. λαγώ-
πης.
Vulg. tri-
nitas

L A M P S A N A syluestre olus est. plus alit quàm rumex, & stomacho vtilius. cuius folia caulésque coquuntur in cibo. Aeg. Manducata prauum succum gignit, illita verò nonnihil abstergit, discutitque. 4. trifolii
genus sit
λάμ-
πανα.
Sanure

L A N A R I A, memorabitur in Radicula. Ex generibus rumicis, oxylapathum vocant, quod in acutum tendit. prædura habēs ou extrema, nō nisi in palustribus nascens. Alius est satius, illi dissimilis. tertiū genus syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum est quod alii oxalida, alii anaxyrida, aut lapathon vocant. folia eius syluestri ac exiguo rumici similia, caule nō magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicāte. Aegin. Rumex mediocriter discutit. Oxylapathū præter id etiam pauxillum repellit. blanche,
rauela q̄
rette
λάπαθον.
offi. lapa-
thū acutū
surelle o-
zeille me
nue Ace-
tosa nūc,
oze ille

Semen autem, præsertim oxylapathi, astringens, alui profluvia (diarrhœas dicunt) & intestinorū tormina persanat. Folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam cōprimunt.

σίλφιον.

L A S E R P I T I V M in Syria, Armenia, Media & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix in cibis agrè coquitur, os commendat cibis aut salī permissa. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suauī gustu: quod dilutum facillè albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet. blandissimo odore, adeò ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspeton vocauêre. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasare facultatis. Aegineta, Probè calefacit, flatulentum est, & cōcoctu per-

uicax. à foris corpori applicatū efficacius de-
prehēditur, magisq; liquor ipsius, extrahen-
di potēs, item & superexerescētia amoliēdi.

LATHYRIS, quam aliqui tithymalū, λαθύρις
offi. cata
putia ma
ior, vulg.
espurge
appellant, eamque tithymalorū numero ad-
scribunt, caulem emittit cubiti altitudine, &
digitali crassitudine, inanem. gignuntur in
cacumine alæ, & folia in caule oblonga, a-
mygdalinis proxima, latiora, & læuiora. quę
autem in summis ramulis exierunt, minora
conspiciuntur, aristolochæ, aut oblongę he-
deræ figura. In cacumine fructū summis sur-
culis gerit, triplici loculamento insignem, ro-
tundum, seu capparin, in quo grana intercur-
santibus membranis inter se distincta conti-
nentur, eruis maiora, rotunda. quę dum cor-
ticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dul-
cia. Nullus radice vsus. totus frutex lacteo
succo turgēt, vti tithymalus. Aeg. Succus eius
instar tithymali purgat, semen autem præci-
puam purgandi vim habet.

SION in aquis inuenitur, frutice pingui,
recto, foliis latis, olusatro similibus, sed mi- σιον
Lauer lat.
off. beru-
le vulg.
norib°, & odoratis. Quę cruda coctāq; viriū
suarum gratia eduntur. De Sio Crateuas tra-
dit, herbam esse fenticis specie, pauca folia fe-
rentem, rotunda, maiora quàm mentha, ni-
gra, & ad crucem accedentia. Aeg. Sion cali-
dum est, vrinam ciet, digerit per halitum, re-
num calculos terit, menses euocat.

ῥάφνη.
Laurier

L A V R V S quædam tenui folio cōstat. al-
tera latiore. Aegin. Lauri arboris folia siccāt,
& calefaciunt insigniter, magis quoque fru-
ctus. Radicis cortex amarus, & leuiter astringens,
calculos comminuit, & iocinorosis opit-
ulatur cum uino odorato triobolari pon-
dere potus.

ῥάφνη
ἀλιξάν-
δρα.

L A V R V S Alexādrina, folio est rusci ma-
iore, molliore, & candidiore: semine inter fo-
lia rubro, ciceris magnitudine, ramos spar-
git in terra dodrātales, interdum longiores:
radice syluestri myrto simili, maiore, molli-
ore, odorata. inuenitur in montosis. Aegin.
Calida, acris, & subamara est, idcirco mēses
& urinas commouet.

φακή.
Lentille

Aeg. L E N T E S in 2. ordine siccant, medio
caloris & frigiditatis temperamēto donatæ:
sed astrictiōnis quoque nonnihil habent. To-
tum quidem lentis corpus siccatur, aluūque
sistit: decoctum vero ipsius proritat, ideoque
prior aqua defunditur, quum astringēdi gra-
tia lentes assumantur.

φακὸς ἐπὶ
τελμᾶ-
των.

L E N S palustris, inuenitur in aqua non
fluente, muscus lenticulæ similis. Aeg. Hume-
ctat, refrigeratq; in secundo abscessu.

Lenticule
de d'eaue
σχίνος.
Létische

L E N T I S C V S nota arbor est. Aegin-
ta, In omnibus sui partibus siccatur secundo
absolutè, calefaciendo autem & refrigeran-
do medius est, adeò astringens, ut ad hypo-
cistidis succum astrictiōne accedat.

Lenciscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. præfertur nitedulæ modo resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, re-torrida, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pinæ nucis mistura. Aegin. Ma-
 stiche, Chia quidem calefacit & sic. i. Cæte-
 rum compositæ est facultatis, astringentis si-
 mul & emollientis: hanc ob rationem stoma-
 chi, ventris, intestinorum, & iocinoris inflā-
 mationibus rectè accommodatur. Aegyptia,
 nigriore colore quodammodo, siccat magis
 & discutit, minus astringit, hinc furunculos
 quoque dissipat.

LEONTOPETALON, caulem emit-
 tit dodrantalem, aut altiore, plurimis a-
 lis concanum, & in cacumine semina parua
 duo, aut tria, in siliquis, ciceris modo: flo-
 res anemonæ similes, punicei coloris: folia
 brassicæ, sed papaueris diuisura. radicibus
 nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in
 aruis, & segetibus. Aegineta, Radix cal. sic.
 3. discutitque.

LEONTOPODION duum digitorum
 herbula est, folia forēs angusta, longitudine
 ternū quaternūve digitorū, hirsuta, quæ iu-
 xta radicē lanosiore flocco canescūt, capitula
 in summo caule quasi perforata: flores nigri;

i iij

μαστική.

λεοντοπέ-
 τάλον.
 offic. &
 herb. πα-
 τάλονις

λεοντοπό-
 διον.
 Vide ē ef-
 fe quæ cru-
 ciata

semen vsq; adeò spissa lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat: radice parua cohæret. quā tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere. Aeg. non habet.

LEONTOPONTIVM à superiori differre videtur, alii liceron, dorypetron, & toriuetoron vocant, radix eius aluum sistit. Purgat bilem in aqua mulsa addito pōdere denariorum duūm. Nascitur in campestri & gracili solo. Semen eius lymphatica somnia facere dicitur, & tela omnia infixæ corpori extrahere tritum cum polenta, & cū eadem spicula sagittariorum elicere.

λεπίδιον
offic. &
herb. ra
phanūvo
cant,

λεγκά-
κανθα
Rham-
nus est.

λεγκά-
κανθα

Atriplex
rustica
esse videt̃

LEPIDIVM aliqui gingidium vocant. herbula vulgò nota. muria cū lacte seruat̃. Aegin. Aliqui hyperiadem vocant. cal. 3. Naphanthio proximum viribus, minus autem eo deficcat.

LEVCA CANTHA prædita est radice cyperi, valida & amara. quæ māducata dolorem dentium sedat. veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. eadem ruptis & cōuulsis medetur. radice epotus succus eosdē præbet effectus. Ag. Alii polygonatum, alii ischiada vocant. radix incidit. Cal. 1. sic. 3.

LEVCA S mōtana, latioribus quàm vrba na foliis, semine acriore, amariore, ori in grato, efficacior tamē quàm sativa habetur. vtraque ex vino contra animalium venena, præ-

cipue marinarum opitulatur. Aeg. Cal. sic. 3.
acrimonia præpoller.

LEUCOION vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. nanque aut cœ rulei, albi, purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Aegineta, Lecoii totus frutex absterge di extenuandi que vires possidet: magis autem flores, & ex eis, sicciore. iccirco & menses stimulant, fœtus corrumpit expelluntq;. Quod si quis aquæ mistura vim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri. Radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrhum coalescentibus imponuntur.

LICHEN qui saxi est familiaris, aliquibus bryon appellatur. asperginosis petris adhæret, ut muscus. Aegineta, Vis ei est extendo purgare, mediocriter siccare & refrigerare. impetigines sanat, inflammationes arceat. sanguinis eruptiones sistit.

LYCHNIS coronaria, flore est albæ violæ simili, quo corollæ factitatur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxilium. Lychnis sylvestris, omnia urbanae similis. Aegineta, Lycnidis coronariæ semē sic. 2. absolute.

LYCIVM, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum

λευκόιον.

violette

ou giro-

flee.

λαχύνε

off herb.

hepatica.

λυχνίς.

châdelle

de N. Da

me. altera

flore pur

pureo,

Mariæ ro

sa ou Me-

lon blâc.

λύκιον

aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu pī
peris, nigro, leui, amaro, densoq; cortice pal
lido, non dissimili lycio madefacto: radici
bus multis, obliquis, lignosis. Nascitur pluri
mum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; aliis
locis. aspera loca amat. Succī extrahendi ra
tio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & ante
per multos dies macerati coquuntur, tū abie
ctis lignis itidem liquor, donec mellis crassi
tudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta de
coctioni amurca, aut absceynthii succo, aut
felle bubulo. Innatās spuma inter coquendū
exempta, oculorum medicamentis additur.
reliquo ad alia vtūtur. Simili modo fit lyciū,
semine expresso & insolato. Optimum quod
vri potest, restinctūq; rubentem spumam
ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum
fregeris rufis, odore minimè viroso, cū ama
ritudine adstringēs, crocino colore. cuiusmo
di Indicū est, ceteris præstātius. Tradunt In
dicū fieri lycium, ex frutice lonchitide appel
lato. ea spinarum generi ascribitur, ramos re
ctos habens, ternū cubitorū longitudine,
maioresve, rubo crassiores, à radice numero
sos. fractus cortex rubescit, folia oleę similia.
Herba in aceto decocta proditur lienis inflā
mationibus & regio morbo mederi, & scemi
narū purgationes elicere. Assueuerant etiam
crudam in potu eosdem effectus præstare: se
men cyatho dimidio potum, pituitā expur;

gare: venenis quoq; auxilio esse. Aeg. Lyciū ex diuersis genere substantiis cōstat, calida, tenui & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringēte, vt in secundo abscessu deficcet. Calefaciēdo refrigerandóq; medium est: hac de causa ceu abstersorio in oculis obscuratis eo vtuntur: tanquā astringenti, in cōliacis, torminibus intestinorum, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti. Cæterū primas obtinet Indicum.

LYCOPSIS, quæ à nōnullis anchusa vocatur, foliis lactuæ longiorib. asperioribus, latioribúsq;, crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo purpureo: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Aegineta, Lycopsis quàm onoclea anchusa, astringit quodammodo efficacius, similiter erysipelatis cum polenta illita cōuenit. Si læuis cum oleo inungatur, sudores elicit. Meminit Aegineta primū inter anchusas, & iterum suo loco.

LYCOPVS herba marrubio syluestri similis est, folio lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris, caule anguloso geniculatóq;, fungosa intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata. folia trita præsenteo remedio imponuntur dissoluto stomacho.

LIGVSTICVM, quod alii panaceā, alii panaces vocant, plurimum in Liguria nasci-

λύκοψις.

4. genus
anchusæ
Gal. her.
lague de
chien.

λυκόπυξ

Patte de
loup. ou
pectora-
le, ou
main de
S. Marie.

λιγυσικόν

Non est tur, in monte Apennino, Alpibus contermi-
 hoc offi- no: vnde nomen traxit. Panaces incolæ non
 cinorum ab re appellant: quoniam & radice & caule,
 leuisticū. heracleotico panaci simile sit, & viribus ei-
 dem præditum. Gignitur in altissimis aspe-
 risque montibus, ac vmbrosis, maximè iuxta
 fluëta. cauliculum fert anethi geniculatum,
 tenuem, & in circuitu folia fertule campanæ,
 molliora, odorata, propè verticem gracilio-
 ra, & longè magis diuisa: in cacumine musca-
 rium, in quo semen dependet nigrum, solidū
 & oblongum, fœniculo proximum, gustan-
 ti acre, & aroma olens: radix candida hera-
 cleotici panacis similis, odorata. Aeg. Eius &
 radix & semen adeò calefaciunt, vt menses ci-
 tent, flatūsque probè discutiant.

φιλυρία. LIGVSTRVM arbor est cypri magnitudine,
 Troeïne foliis oleæ, nigriorib⁹ & latioribus, fructu lē-
 ou druy- tisci, nigro, subdulci, racemati coherēte. a-
 ne. offic. speris nascitur. Aeg. Tiliae arboris folia sylue-
 halcanne stri oleæ similiter astringūt, quibus cōmā du-
 ou hēne. caris oris vlcera iuuātur: eorūq; decocto col-
 luūtur: quod etiā potū vrinā & mēses trahit.

κρίνον. LILIA coronamētis se dedunt, Liria à
 Lys. quibusdam vocata tradunt & rubra esse lilia.
 Aegineta. Lili flos temperamēto mixtus est
 ex tenui substantia, terrestri & nonnulla a-
 quosa temperata: quapropter oleum quoque
 ex eo cōfectum discutiēdi vires molliendūq;
 repræsentat, vulgè inflammationibus accom-

modatum. Radix ac folia siccāt, abstergunt
discutiuntq; mediocriter, quo sit vt ambustis
conferant: succus ipsorum & neruorum vul-
neribus cum oxymelite prodest.

LIMONION, folia habet beta, tenuio- λαμώνιον
ra & longiora, decem, sæpe plura: caulem te- Limoine
nuem, rectum, lilio æqualem, seminibus ru ou bette
bris scatetem, quæ gustata adstringunt. Semē de pre-
tritum, & ex vino acetabuli mensura potum
dysentericis cæliacisq; prodest. rubra scemi
narū profluvia sistit. Nascitur in pratis & pa
lustribus. Aegineta, Semen eius austerum cū
vino, cæliacis, dysentericis, & sanguinē spuē
tibus datur, item ad fluorem muliebrem ace-
tabuli mensura.

LINI semen ex primo gradu calidū est, λιμόσπερ
inter humectantia siccantiaq; medium. Man μον.
ducatum flatus creat, etiamsi frictū fuerit.

LINGVA herba Plinio nascitur circa
fontes. Radix eius combusta & trita cum a-
dipe suis, alopecias emendat vnguentiū inso-
le. (Eandem alibi lingulacam vocat.)

LYSIMACHIA, quā aliqui lytron ap- λυσιμά-
pellāt, caules emittit cubitales, altioresve, fru χιον.
ticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim fo Corneol
lis, tenuibus, salicis figura, gustu adstringen le, soucy
tibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquo deaue,
sis & palustribus acerrimum nidorem suffita ou pelli-
reddi: qua de causa serpētes fugat, & muscas posse.
interficat. Aegineta, Vm habet excellēter a-

strictoriâ, qua & vulnera glutinat, & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus: intestinorum tormina & potum, & ab inferioribus partibus iniectum sanat.

λιθόσπε
μον.
offic. &
med. oī-
b⁹ Moliū
folis.

LITHOSPERMON à seminis duritia nomē accepit, foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt ramulis surculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iūci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent foliis longis, inter quæ paruum semē, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Aeg. Alii diosporon, alij heraclion vocāt herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, album, quod cum vino albo potum calculos frangit, & vrinam pellit.

αἴρη.
Iuraicou
gasse.
λογχίτης
Nigri ca
petti.

L O L I V M, quod inter segetes nascitur. Aeg. Calfacit, siccit, tertio fermē ordinē, iridi facultatibus simile.

L O N C H I T I S folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericulī, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exercentes velut linguā, quæ ad labrū inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomen tum arrogauit, radix dauci. Nascitur in sitiētibus & asperis. Radix ex vino pota vrinam

ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt. folia scolopendrii emittit, sed asperiora maiorāque, ac multo magis diuisa. Folia viridia. Vulneribus mirum in modum profunt, in eisq; inflammationes excitari non patiuntur. arida pota ex aceto lienem absumunt, vel indurato medentur. Aeg.

L O T V S arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gratā, stomacho facilem. Aegineta. Extenuat, siccat, & mediocriter astringit: qua de causa ad fluxū muliebrem, alui fluores si cū vino aut aqua bibatur, aut etiam infundatur clystere, salutaris est. pilos defluos cōfirmat.

λωτός.
Alyfier
& bacca,
alyse.

Est & in Aegypto **L O T V S**, quæ in campis flumine inundatis provenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludique: ad ortum autem aperiri. adduntque, caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milii, quæ Aegyptii exiccant, & in panes cogunt. Radicē lotos hæc habet mali cotonci similitudine, quæ cruda coctāque manditur, decoctāque lutei oui qualitatem exhibet. (Aegineta nihil præterea.

λωτός αἰ
γυπτία.

L O T V M urbanū alii trifoliū vocant. nascitur in hortis. extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasque

λωτός ἢ
μίσος.

caligines discutit. Aegineta, Abstergit, modice sic calore temperata est.

λωτός &

γρίος.

forte hęc

off. anda

cocha, &

corona

regia.

θίεμοι.

Lupin.

Sylvestris LOTVS nascitur plurimum in Libya. Caulem fert bicubitalem, aut etiā maiorem, multis alarum cauis. folia loto trifollio in pratis nascenti similia: semen fœnogrecō, multo tamen minus, sapore medicato. Aegineta, Semen eius cal. secundo, habet nonnihil etiam absterforium.

Satiuus LUPINVS non est. Gignūtur & sylvestres lupini, satiuus similes, sed omnino minores, qui eadē quę satiuū possunt. Aegineta, Lupinus esculentus quidē obstruendi viribus pollet: amarus abstergit, dissipat, & sine morſu deficcāt, lumbricos occidunt illiti, & poti. Viscera purgant cum ruta & pipere potui. Cutis vitia extergunt. tumores dissipant cum oxymelite illiti. Sylvestres autem lupini amarioreſ sunt, & omni ex parte satiuo valentiores.

offi. lupu

lus. gall.

houblon

LVPVM salictarium Plinius inter oblectamenta verius quā cibos numerāt. Caulibus aculeatis longissimis quia in vepribus & salictis reptat, foliis vitis albæ, hispidis & nigrioribus, flore cinereo ac multis exilibus folliculis squamatim compacti. Hoc frugibus admisto Germani suam condiunt ceruissiam. Teneris eius turionibus in acetariis utimur. Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Sedat stomachi inflammationes ex sero potus.

potus. Bilem regio morbo laborantibus detrahit. Pituita in aqua intercutem exigit per aluum. in capitis dolore, qui medium capitis occupet, eius succus illinitur: item quoties immodicos æstus mitigare necessum fit.

LUTEAE herbæ Vitruuius meminit. Qui nō possunt, inquit, chrysocolla propter charitatem vti, herba quæ luteum appellatur, cœruleum inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. (Luteam sunt qui lysimachium interpretentur.)

M

MACER ex Barbaria aduehitur, μακερ.
offi. Macis.
cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Aeg. Cortex

est qui ex india importatur, sic. 3. inter calorem & frigiditatem medium obtinet. Est etiam astringens, tenuisq; unde cœliacis & intestinorum torminibus auxiliaris habetur. Porro macer, siue macis Arabum, quære in Moschocario.

MALABATHRUM arbitrantur aliqui μαλάβαθρον.
offi. foliū Indicum cinnamomi est, nō malobathri.
esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione. permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris, secus autem res se habet. Namq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innata aquis, sine radice. Id collectum statim lino transuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vti: quod ubi

non euenerit, ne amplius quidem renasci. laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Aeg. Malabathri folium æquales spicæ nardi vires repræsentat.

μαλακό-
κιστος.
off. sigil-
lū D. ma-
riæ.

MALACOCISSVM Democritus aquilex mollibus hederæ foliis depingit, caule tenero, sese cuiusq; quod fuerit nactus inuolūte. Subesse aquam ubi reperitur affirmat.

MALICORIVM in punica malo dicitur.

μαλάχη.
Mauluc.

MALVA sativa esui longè aptior sylvestri. Aeg. Sylvestris mediocriter discutit, & emollit. Hortensis autem ceu humidior, etiā imbecillior est. Semen tanto viribus præstat, quanto & siccus est.

μολόχη.
trāsmari-
na rosa.

MALVAM maiore Græci molochen vocant, hanc Apuleius hastulā regiā dixisse mihi videtur: quāuis eadē sit asphodeli appellatio.

μήλα.
Pomicr.

MALIS omnibus frigida & excrementitia inest humiditas, quæ in eorū censu tenera & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant. Dulcia aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt. Austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida. Acida frigida quidem & ipsa, verū incidendi humores ventriculo inhaerentes vim testantur.

Acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata tēperamento, ventrem supprimūt, vulnera glutinant. Pari modo folia succi, & cortices arborū inter se differunt. Aegineta.

MAMIRAS veluti radiculae herbae cuiusdam est eeu geniculis frequentibus nodosis, quae cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate praedita. Aegineta. μαμίρας
Videi eē
doron-
cū offi. &
herbar.

MANDRAGORAM, aliqui antimalū, alii circæam vocāt, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quae femina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quam lactuca, graueolentibus, in terra sparsis. mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorū radicibus inheret bene magnis, binis, ternisve, inter se cōuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. verū is mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nōnullis norion vocitatus. huius folia, magna, alba, lata, laeua, vt betae: mala quā alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundē cum grauitate quadam olentia: horū pomorū cibo aliquantum opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior & cādidior, orbata caule. Succus fit ē cortice recētis radicis tuso, & praelis subiecto: qui insolatus vbi μανδρα-
γορας.
Mandra-
gore.

concreuit, fœtili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruât, cyathoque vno vtuntur, in perungiliis, & doloribus, & ante sectiones vstionésque, ne sentiãtur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. liquamentum autẽ succo lacteo præstantius est: sed non vbiq;, vt experiẽtia docet, radices lacteum succum delachrimant. Alium tradunt esse mãdragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatũ, foliis albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radice ambientibus, quę mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradũt eam in pane, ossa, obsoniõve, drachmę pòdere deuoratã, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferẽ quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cũ scindendi, vrẽdĩq; necessitas adest. Antidotũ esse volũt radicẽ, cũ manico salano potã. Aeg. Mandragoras frige facit 3. Mala ipsius etiã caliditatẽ quampiam cũ humiditate id referunt, vnde soporem grauẽ homini possunt accersire. At radiceis cortex vehementissimus, nõ refrigerat modò, sed etiã siccatur interior eius pars imbecillior est.

MARRUBIVM, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. foliū pollicem equat, subrotundum, hispidū, rugosum, gustu amaro. semē in caulibus, & ex intervallis. flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Aeg. Cal. 2. amplius autē siccatur, iecur lienemq; obstructionibus liberat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensesq; promouet. Illitum extergit, discutitque, præcipua extersoria incisoriaque vi præditum.

κράσιον.
Porcum.
Marrou.
off. prassi
on viride

MARVM herba cognita vulgò, surculo sa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. substringit enim, & modicè calfacit. qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

μάρον.
herb. forte
metha
sylvestris

MASTICHE, vide Lentisci resinam.

MEDICA cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pratenſi similis est. procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & filiquas corniculorū modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. (Aeginea non habet.

μυδική.
grād tres.
fle ou foi
de Bour-
gongne.

μῆδιον.

MEDION in saxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aeg. Medii radix vires semini contrarias præ se fert. est enim austera, & fluxiones comprimit, idēq; muliebrem fluxum sistit. Semē quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menses quoque proritat.

MELAMPYRO in Myagro describitur.

MELANTHIVM, vide Gith.

μελίλω-
τος.

offic. &
vulg. melilot.
alii pratellū,
ou courō
ne royal.
lc.

ἡδύσ-

μος.

Menthe.

SERTVLA Campana landatissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata. cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Aeg. Diuersis facultatibus pollet: astringendi, discutendi, & concoquendi.

MELISSOPHYLLON, vide Apiastrū.

MENTHA, cognita herba est. Syuestris mentha, Latini menthastrū vocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore quā silymbrii, graniori odore: quare minus ad sanorū vsus expetitur. Aegineta, Mentha Cal. 3. tenuis, acris, cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat. Amari quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quia verò acerba est, recentes sanguinis eruptiones coërcet.

LINOZOSTIS, aliqui parthenion, alii *λινόζωσις* hermûbotanion appellant, foliis cōstat ocy. Mercuri-
mi, minoribus helxinæ cognatis: ramulis duale,
plici geniculorum nodo cinctis, alarū cauis
multis: fructu fœminæ copioso, quandam ra-
cemorū speciem præbente: mari è foliorum
sinu depēdente, paruo, rotundo, ceu binis te-
sticulis vnà cohærentibus. frutice dodrantali,
aut maiore. vtraq; in oleribus manditur, ad
aluū ciendam. Aeg. Aluum liberaliter subdu-
cit illita discutit. Sciendūmq; est, eius semen
infricatum corporis excreſcentias præter na-
turam, quas vulgus vocat naphia, abolere,
sicut experientia comprobatum est. Sed vi-
ride semen esse oportet, & frequenter tuber-
culis illis infricari.

MESPILVS, quæ à nōnullis Aronia vo- *μίσπιλες*
catur, spinosa arbor est, folio acutę spinę fert Neflier,
pomum suaue, exiguum, tibus intus ossicu- meflier.
lis. qua ex causa id nonnulli tricoccon appel-
lauere. tardè matureſcit, esu adstringit, sto-
macho gratum est, aluumq; suppressit. Alte-
rum mespili genus in Italia nascitur, quod a-
liqui setanium, alii epimelida vocant. arbor
foliis mali, sed minoribus: pomū fert rotun-
dum, esui aptū, vmbilico latiore: quod astringit,
seroque matureſcit. Aeg. Mespila, alii tri-
cocca vocant, fructus est affatim acerbus, &
vix esculentus, aluumq; continens. Germina
foliāque mespili impensè acerba sunt.

k iiii

μῆον. M E O N, quod Athamanticū vocant, in
 offi. anet Macedonia & Hispania plurimū gignitur,
 faulua ge anetho folijs & caule simile, sed eo crassius bi
 ber. anet nūm fermē cubitorum altitudine attollitur,
 tortu. sparsis in obliquum rectūq; radicibus, lon
 gis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacien
 tibus. Aeg. Mei radices Calefa. 3. sic. 2. ideōq;
 vrinam & menses cient. Liberalius meon as
 sumptum, capitis facit dolores.

μύαγρος. M Y A G R O N, aliqui melampyron vocāt
 Cameli- herba est surculacea, foliis rubiæ, pallidis, tre
 ne ou ca- pidanea. semen oleosum, scœnogræco simile.
 maminc. Quod contusum igni torrent, perunctisq;
 virgis ad lucernarum lumina vtuntur. hoc
 pingui, scabritias corporis leuigari, atque
 expoliri, constat. Aegineta, Quod in semine
 oleosum habetur, viribus est opplendi. Per
 peram apud Aeginetam duobus in locis, pri
 mum in Myagro; dein Myaro, eadem de re
 tractatur.

M Y L E S radix paruo bulbo similis est,
 constringit: itaque cum lolii farina apposita
 vterū apertū sanat. Galenus: (Eandē esse ap
 paret Dioscoridi dictā Moly. itaq; illius de
 scriptionem hinc emendare poteris.

M I L I A R I A herba milio gentilis est: no
 men habet, quod milium implicādo enecet.
 Hæc trita, & cornu cum vino infusa, poda
 gras iumentorum sanat.

M I L I T A R I S, vide Lactoris.

MILIVM in panes coactum, minus cæ- κίχρεος
teris frugibus alit. Aeg. Miliū frig. i. sic. 2. Ha Milet
bet etiam modicam extenuandi facultatem:
extrinsecus igitur in sacculis ad fouendū ad-
hibitum, & illitum deficcare consuevit.

MILIVM Indicum in Italiā Neronis κίχρεος.
principatu conuectum, nigrum colore, am- ινδικός.
plum grano, arundineo culmo: Adolefcit ad Miliū sa-
pedes altitudine septem, prægrandibus cul- racenicū
mis, lobas vocant, omnium frugum fertilissi- .i. pegri-
mum. Ex vno grano terni sextarij gignūtur. num
Seri debet in humidis.

MYRIOPHYLLVM, siue millefolium, μυριόφυλ-
caulis est tener, singularis, vnica nixus radi- λον.
ce: plurimis foliis, læuibz, fœniculo simili. Mille
bus: vnde nomen accepit. caulis flauescit va- feuilles
rius, ac veluti ex industria delimatus. nasci-
tur in palustribus. Aegin. Adeò siccat, vt vul-
nera glutinet.

MYRICA, seu tamarix, arbor vulgò co- μυρίκη.
gnita est, cū apud pigras & stagnantes aquas Bruyre.
enascatur, fructum quasi florem ferens com huius ra-
page muscosum. Aegyptus Syriāque alteram dix casia
gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. off. vocat
Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter & pro o-
astringentem gustu. Aegin. Tamarix incidit, dorata ca-
extergitque, ita vt manifestè nō siccat, sed a sia vtūtur
strictionem quoq; nonnullam obtineat, qua
de causa decoctū ipsius potū lienes adiuuat,
dentiūmque doloribus medetur. Fructus &

cortex ipsius, gallæ virtute proximus est. Cinnis arboris vehementius exiccat.

μύρρα.
Myrrhe

MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nõ dissimilis. è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circũ caudicem cõcrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis qua expressa, stacte emittitur. alia gabireca, pinguisima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat stactem. Omniũ prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. quinetiam legitur tenuis quædã, quæ à troglodytica secunda est, bdelij modo mollis, verũ odore grauiuscula, apri cis nascens. Alia caucalis cognominatur, prætermo- dum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gũmis imaginem vergens, & viribus eius proxima. improbatum aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquã pingues, & inodorati. minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gũmi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore ob- sita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modò candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata

calfaciens. superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picea. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & (vt postea ostendemus) ad eadem cōueniens. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrhâ odore repræsentat. Aegineta, Cal. sic. 2. Capitis vulnera si illinatur glutinat. item amarâ vim obtinet, qua ventris lumbricos & fœtus occidat. ad hæc abstergit, coq; oculariis medicinis temperatur. humores pectoris infixos expurgat, ita vt fauces nō asperet. Bœotica myrrha vires habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

MYRRHIS, simillima est cicutæ, caule μυρρῖς
foliisque. radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Aegineta, Calid. 2. ac cicutaria
nonnihil etiam extenuat. radix illi odorata dulcisque est, mensibus mouendis, & humoribus è thorace ac pulmone repurgandis idonea.

MYRTVS fatiua nigra utilior est medicinæ quàm cādida, & in hoc genere multò magis montana. semen tamen imbecillius parit. μυρσίνκ
Myrte

MYRTIDANVM dicitur myrti adnatum inequabile, verrucosum, intrumescensq; μυρτιδα
vov.
& cōcolor. quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus adstringit. tusum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccatur in

umbra. multo efficacius & folio & semine, cerato, pennis, in fessioibus, cataplasmatidis admistum, ubi adstringendum aliquid est. Aeg. Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur. Myrtula verò, seu myrtidanum, maiore vi in astringendo & siccando scaturit. Folia etiam aridiora viridibus magis siccant. Fructus succusque, tum foris applicati, tum intus assumpti, persimiles vires præ se ferunt.

μυθριδά-
τον.

M I T H R I D A T I O N folia habet, inquit Plinius, duo à radice acantho similia, caulibus inter utraq; sustinens florem roseum.

μύξα.
Myxaria
fructus
offi. & se-
besten

M Y X A arbor Damascenæ pruno popularis, in Syria & Aegypto olim gignebatur, nunc est familiaris Italiæ. Fructus etiam myxa, vel myxaria dicuntur, olim Sebastii, in Augusti honorem, ut verisimile est. Aegin. Arboris fructus est minor quidem prunis, facultate verò consimilis.

μωλν.

M O L Y folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat. radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum irino unguento in pectore subiiciatur. (Aeg. non habet, præter rutam sylvestrem.) Vide Mylen.

Aliud M O L Y in ruta sylvestri describitur.

MOLYBDAENA herba, id est, plumbago, Plinio in aruis nascitur, folio lapathi, radice crassa, hispida, qua commanducata, oculisque subinde religata, plumbum (quod est genus vitij) ex oculis tollitur.

MOLLIGO hippophæstum est.

MORI fructus maturus quidem aluū subducit, & medicamentis stomaticis aliis, quæ moderatam requirunt astringionem, vtiliter miscetur: immaturus ubi exaruerit, perquam astringens fit medicamentum: cortex autem radice arboris etiā amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, coq; latos lumbricos occidit. foliorum autem surculorumque vis subducentium & comprimentium media quodammodo existit. Aeg.

MOSCHOCARYON, vel moschocarydion Græcis recētiorebus appellatū India mittit (nos ea imitatione nucem moschatam nominamus) Hic fructus dum recens est, totus succo pingui & oleoso madet, sic ut in vnguentum exteri possit. vnde multis myrsifica, seu myristica, id est, vnguentaria nux dici cœpit. Probatum recens, quæ nullam sentit cariem, ponderosa, præpinguis, colore in rubrum inclinato. Aluum astringit, distendentes stomachum spiritus discutit, oris suauitatem commendat, stomachum & iecur roborat. Létigines in facie, & impetigines emendat. lienem incremento laborantem reprimat.

μολύβ-

δαινα.

offic. ma

ior petri

caria

συνάμι-

νος.

Meurice

μοσχοκ

ρυον.

Noix mu

scade

Apud Aëtium Caryon hoc aromaticum (sic enim vocat) calefacit siccatur. 2. Arabes macis nomine extimā intelligūt huius nucis membranā vel folliculum. Antefertur is qui colore ruffo vel flauo rutillet, odore suauī, cum leui acumine. improbat nigrificās. Sic. 3. partiumq; tenuitate praestat, ceteras habens suae nucis dotes. Arbos autem ipsa vulgari Persico similis traditur, roseo flore, & nuce, quam declarauimus, eiusdem propē effectus cuius & caryophyllon.

Βεῖον.

Bryon, id est M V S C V S, à quibusdam spiachnon appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimū est cedrinum: proximum populneum. in quo genere candidum & odoratius praestat, nigricans improbat. Aeg. Inuenitur etiam in piceis. Discutiendi simul & molliendi vim moderatam obtinet.

Βεῖον θαλάσσιον.

Marinus M V S C V S nascitur in scopulis, testaceisque, haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis ex pers. Aegin. Refrigerat simul & astringit, coque feruentes inflammationes illitum adiuuat.

Βεννιάσι

N

N

API cocta radix inflat, modicum alit. semen eiustorum venenorum vires hebetat. antidotis admiscetur. Conditur sale radix. Aeg. Napus

& rapa si bis coquatur, nihilominus quàm reliquę stirpes alunt: continuè autem assumpta, crassum succum procreant.

NARCAPHTHVM ex India deferitur, Nabach. corticosum, simile sycomori libro. quod iu- Lasahatē cūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Aeg. Naocáthon, sunt qui nacaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos fœminarum locos suffitu vaporatur.

NACISSVM sunt qui, vt lilium, lirim *νάρκισσος* appellarint. folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis vacuus, & Narccs. sine foliis, supra dodrantem attollitur. flos albus, intus croceus, in quibusdā purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrū, longū. probatissimus nascitur in montibus, suauis odore. cæteri porum imitantur, atque herbaceum virus olēt. Aegineta, Radix eius adeò deficcat, vt maximis vulneribus sit glutinandis: imò etiam tendinum præcisionibus confert. Cæterum abstergerendi & attrahēdi vim quandā habet.

Duo NARDI genera: vnum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quòd in Syria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur, *νάρδος* pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flavum colore, per quā odoratum ac cyperum

redolēs, breui spica, amaro sapore, linguam
 ficcāte, quod diu in sua odoris gratia perma-
 neat. Ex indicis autē nardum quoddā Gan-
 gitis vocatur, à fluuio Gange, apud quē ena-
 scitur, montem præterfluente. quod genus ob
 multam loci, in quo prodit, viginē, viribus
 infirmius est, atque procerius adolescit, plu-
 res ferēs spicas ab vnica radice comosas, vnā-
 que conuolutas, ac grauiter olentes. Monta-
 num autem odoratius, spica breui ac mutila,
 odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci
 dotes. Est & genus quoddam, cui Samphari-
 tico nomē locus indidit, frutice breui, in ma-
 gnas se spargens spicas, candidiore interim
 medio caule, hircorum virus supra modum
 redolente: quod improbat. Madefactum
 vendi solet. quod vitium ex eo deprehenditur,
 quod candida sit spica, & squalida, nulloque
 puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua
 aut palmeo vino, inspissationis ponderisque
 causa inspirato. Intueri autem oportet si lutū
 radicibus insideat, & incerniculo puluerem
 excutere, eluendis manibus vtilem. Aeg. Spi-
 cæ nardi radix cal. 1. sic. 2. particeps est etiam
 astringētis cuiusdam qualitatis, acris & suba-
 maræ. Iocinori prodest & stomacho, extrin-
 secus admota & ebibita. Vrinā mouet, & in-
 teraneorum fluxiones desiccāt. Indica valen-
 tior est quā Syriaca, & nigrior.

νάρδος

κελτική

Celticū N A R D U M nascitur in Liguria

Alpibus, *saliūca* patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem vtile, cum aceroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. namque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus foliis, radice neque amara, neque odorata, uti verum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis foliis triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Aegineta, Nardus Gallica superiori vires habet æquales, sed imbecilliores, præterquam ad vrinam ciendam. calidior enim est quàm illa, minùsque astringit.

Montanum *NARDVM*, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, surculo & foliis eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis

*νάρδος
δένδρον*

asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluri-
bus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiæ, sed
longè gracilioribus, & longè minoribus. Ne-
que caulem, neq; fructum, neq; florem pro-
fert. Ad eadem, ad quæ Celticū, efficax. Aeg.
Nominatur etiam pyritis, iam commemora-
tis est infirmior.

καρχα.

NACAPHTHVM. Vide Narcaphthum

κον.

NASTVRTIVM optimum constat ei-

Nasitert

ou cresō

de iardin

se Babylonicum. Aegineta, Semen eius fina-
pis modo vrit, vnde etiam illitum cutem ex-
asperat. Crassos humores cum aliis potum
incidit. Herba quidem arida semini viribus
respondet humida moderatior est, ideoque
crudam ipsam assument.

νηριον, ρο

δοδερ-

δρον.

Rosages

NERION aliqui rhododaphnen, alij
rhododendron vocāt, frutex est vulgaris no-
titia, longioribus quàm amygdala foliis, a-
superioribusque: flore in rosam conformato:
fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui pa-
tesfactus quandam lanosam naturā ostendit,
spinarum pappos repræsentātem: radice lon-
ga, acuta, lignosa, gustanti falsa. nascitur in a-
mœnis, maritimis, & secus amnes. Aegineta.
Nerion extrinsecus illitū discutit: in corpus
assumptum occidit.

NIGELLA quære Gith.

νυμφαία

offic. Ne

nuphar

NYMPHAEA nascitur in paludibus &
stagnantibus aquis, foliis fabæ Aegyptiæ, mi-
noribus, & longioribus. aliis in summa aqua

aliis demersis, pluribus ex radice eadem pro- vulg. iaul
deutibus: flore lilio simili albo, & in medio net deau,
crocis habente, cum defloruerit, vt rotundum ou chou
malum, aut papaueris caput, extuberat. ni- deaue
gro semine, denso, & lato, lenti gustus. caulis
est laevis, niger, minimè crassus, ciborio co-
gnatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ
autumno sequatur. Nymphææ nomen sibi
vendicasse videtur, quoniam aquosa amet.
plurima inuenitur in Elide, in Anygro am-
ne, & in Bœotia Alarito. Est & altera nym-
phæa, cuius flos blephara dicitur, foliis ante-
dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, niten-
te, rosæ simili. Nascitur in Thessalia, amne
Penco. Aegin. Nymphæa vires habet, sine ro-
sione siccas, quibus & ventrem reprimat, &
genituram arefacit. Quæ radicem albam ha-
bet, valentior est, eoquæ fluxum muliebrem
cū vino nigro & austero pota persanat. Quæ
verò nigram, deterforia quoque vi nonnulla
pollet, eaque vitilignes, alphos dictas, cum
aqua exierit: pilorum defluuia cū pice liqui-
da illita replet.

N V C E S auellanæ, quas & leptocarya vo-
cant, stomacho infestæ sunt. Aeg. Vocant &
ponticas. frigidiores sunt, & austera: in cæte
ris, iuglandibus æquales.

N V C E S iuglandes, quas nonnulli Persicas
vocant. Aegin. Nucis arboris coliculi aliquid
habent quod astringat, plurimum iuglan-

κάρια
ποντικὰ.

Noysette

ou auc-

laine

κάριον βα

σιλικόν,

ἢ πρσι-

κόν, ποικ

dium calyx puluinator. succus itaque eorum decoctus cū melle, stomaticū fit medicamentum. Interius inde putamen carinatū vltum extenuādi vim acquirit, & sine rosione siccatur. Quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facile bilem auget. Confectum ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flaccescentes itidē vetustate nucis membranæ, cutis vitia abstergunt.

κάριον
ινδικόν.
La grāde
noix

N V X Indica à recentioribus Græcis recensetur. Fructus palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Calfacit secundo, humidat primo. Biliosis eo vsu interdicitur. Tineosis ventris animalia pellit. Oleum quod ea exprimitur, cum sentit vetustatem, flatus digerit. Lumborum & genuum dolores mulcet. Sanguini à spiraculis venarum sedis mananti sublinitur ex oleo, quod nuclei malorum Persicorum reddiderunt. Vesicæ quoque malis opitulatur, & aluum sistit oleum quod recens nux stilauit.

O

ὠκίμοι-
δες.
offic. &
herb. al.
ba cacia

O

CIMOIDES, Latini ocimistrum vocāt, folia fert ocimi, & ramos dodrantiles, hirsutos: si-
liquas hyoscyamo similes, semine vt gith nigro, prægnantes. Aeg. Sunt qui philetarion

vocent. Inutilis quidem radix est: semē verò vulg po-
particulis tenue, citra rofionem siccans.

O C I M V M vulgò cognitum. Aegin. Cal *ωκιμονι*
2. habet & humiditatem quandam excremē- Basilic
titiam, propter quam neque vtile est intus af-
sumptum: extrinsecus autem illitum discutit,
& concoquit.

O C Y M V M pabuli genus apud antiquos *ωκυμον.*
erat, segete viridi, dissecta, antequam gereret Dragee
siliquas: eo citabant aluum bubus. Varro di- aux che-
ctum putat à celeritate proueniendi. uaulx

O D O N T I D E S fœni genus fruticosum, *οδοντι-*
triangulis flagellis, geniculatis, nigro arti- *δης.*
culorum nodo, foliis polygono lōgioribus, Rust. fœ
hordei semine in alis, cauliculis dēsis, ab ea- naria
dem radice geniculatis, flore purpureo pusil-
lo: nascitur in pratis. Dentium dolori mede-
tur cauliculorum eius decoctum in vino au-
stero: inde ductum nomen.

O E N A N T H E folia habet pastinacæ flo *οιρανθη.*
rem candidum: caulem crassum, palmi al-
titudine: semen atriplicis radicem magnam,
in multa rotunda capitula extuberantem. na-
scitur in petris. Caulis eius, & folia, cum mul-
so vino pota, secundas euciant. Radix è
vino, vrinæ stillicidio conuenit (& regio
morbo, vt Paulus adiecit, Dioscoridem ci-
tans.)

O E N A N T H E N diuersam in Vite sylus-
stri dedimus.

ἐλαία. O L E A E ramusculi quantum astringunt,
 Oliuier tantum etiam refrigerāt. Fructus qui exactè
 ematuruit, moderatè calidus est. Immaturus
 maiorem tum astringendi, tum refrigerandi
 vim repræsentat. Aeg.

ἐλαίας
 αἰθιοπικῆς
 ἢ δ' ἀ-
 κρον. L A C H R Y M A quā Aethiopica olea stil-
 lat, scammonia similis quadantenus est, ful-
 ua, stillis exilibus constans, mordax. quæ au-
 tem ammoniaci, aut gummi similitudinē re-
 fert, colore nigricans, nec gustu mordens, su-
 peruacua est. Nostrates oleæ, oleastrique, si-
 milem lachrymā sudant, quæ commodè ad
 oculorum hebetudines illinitur. Appellatur
 autem Aethiopica & agrestis olea. Aegine-
 ta, Oleæ Aethiopicae lachryma ammonia-
 co tenui similis, vires habet exterforias: qua-
 re ad cicatrices, albugines, hebetudinēque
 oculorum ea utuntur, & ad dentium dolo-
 res, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est.
 Nonnulli verò syluaticam esse hanc oleam
 asserunt.

ὀνάγρα. O N A G R A, siue onothera, aut onuris, fru-
 tex est arboris instar, prægrandis, amygdalino
 folio, sed latiore, lilio non dissimili: flo-
 re rosaceo, magno: radice candida, longa: cū
 ficcata est, vinum olente. nascitur in monti-
 bus. Aqua in qua radix maduerit, in potu da-
 ta, feras mitigat, & cicures facit. illitu quoque
 tetra vlcera mulcet.

ὀνοβρυ-
 χίς. O N O B R Y C H I S, folia habet lentis, lon-

giora panlo, caulem dodrantalem, florē purpureum, radicem parvam : nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum vino pota, strangurias sanat. illita ex oleo, sudores mouet. Rarefacit, & discutit. Reliqua sunt eadē Dioscoridi.

ONOSMA, oblonga folia habet. ad similitudinem anchusę, longitudine quatuor digitorum, & vnus latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore. radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. gignitur in asperis. Aegineta, Onoma, vel onomis, vel phlomitis, vel ononis, acrem amarāq; vim obtinet, eāque ob causam folia eius cum vino pota, fœtus occidunt, expelluntq;. (Hippocrates, Onosma simpliciter radicem appellasse mihi videtur.

OPIMUM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facillē aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coëat, & in sole diffundatur: dein ad motum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique, odoris vim cōseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucę succo adulterant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum,

ὄνοςμα.

Papaue-
ris succus

splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementiæ deueniunt, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Hoc autē modo is excipitur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentēsq; in mortario digerunt in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est, Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutē incidere oportet, lachrymam exeūtem digito in concham abstergere: nec multo post redire, vt cōcreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiā offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur. Aeg. Papauer, quod prolixiore & proceriore cōstat calyce, medicatius vniuersis est: quapropter stuporē inducit, quousq; interimat. Nam & ipsum, & eius lachryma, quam per excellentiā opion nūcupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur.

OPOPANAX, lege Panaces.

obiet ou
opier

OPVLVS corno similis arbor, arbusto Gallico faciundo idonea, vltimi proceritate adolescit, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferē vitigneis, bacis racematim dependentibus, prima puber-

tate viridibus, à maturitate puniceis. Ieiunū solum horret. Vitem alit: verum quia frondē non habet idoneam, à plerisque repudiatur. Nullus eius in medicina traditur vsus.

Testiculus, quem Græci cynosforchin vocāt, foliis circa caulem mollis oleæ similibus in terra stratis, longioribus angustioribus, leuibus caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. nascitur in petrosis, & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea authore, vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. foliis est porri, latoribus, oblongis, pinguibus, ex alarū sinu inflexis: caule palmeo: floribus penē purpureis, radice testiculis simili. Aegineta: Maioris in cynosforchi radice humida vis & calida est, cōque venerem incitat. Minoris calida & sicca, vnde venerē coërcet. Serapias, vel thriorchis, priore valentius desiccatur, quare laxos tumores dissipat, vlcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescēta autem magis siccatur. Quoniam verò substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

OREOSELINVM, caule est dodrantē alto ab radice tenui excurrente: per cuius ambitum rami & capitula cicutæ, multo tamē te-

ὄρχις.
offi. testicul^{us} canis
& satyri-
on min^{us}.

σεραπιάς

ὄρειοσίλιον.
Nō ὁ
apiū mō-
tanum.

nuiora : semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui, nascitur in petrosis, & montibus. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit. aliud enim est petroselinum. Aegineta, Viribus domestico æquale est, validius tamen.

ὀρίγανον.

Origane
ou mario
laine dā-
gle terre.

ὄνιτις.

Mastich-
ma herba
vulg.

ὀρίγανον
ἄγριον.

ORIGANVM Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque nō in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso.

Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heraclæi, sed multo inefficacior. Sylvestre origanum, aliqui panaces Heraclion, alii cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius : foliis est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi, radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliatur. Aeg. Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vires in tertio abscessu ostendunt.

ὄρυζα.

Riz ou
hordeū
gallaticū

ORYZA frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit. Aeg. Vim quandam astringentiam præ se fert, qua etiam ventrem mediocriter cohibet.

ORNEOGLOSSON arbor est vlmī spe- ὄρνις-
γλωσσόν.
off. lague
doyse.
cie, foliis amygdalæ, prælongis filiquis in sur-
culorum cacumine prodeuntibus oleagina
magnitudine, in quibus medulla inest lin-
guæ avis similis, vnde nomē: exterius rubra,
intus ex candore in luteum vergens: sapore
acri, cum nonnulla amaritudine, Ea cal. 2. la-
terum dolores sedat, urinam ciet, venerē sti-
mulat, genituram auget.

ORNITHOGALVM cauliculus est te- ὄρνιθό-
γαλον.
Charles.
ner, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus
aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à
quibus flores prodeunt, foris herbacei: & cū
hiantes se pādunt, lactei visuntur: inter quos
dissectum, cachryos modo, capitulum emi-
cat. Coquitur cum pane, vt melanthium. ra-
dix bulbosa, cruda & cocta manditur. (Aeg.
non scripsit.)

ORNVS arbor satis procera, caudice te- Fresno
chāpe-
stre.
reti, læui cortice, spisso, ramulis vtrunque pin-
natis, folio fraxini, paulo profundiorib⁹ cre-
nis per ambitū ferrato, bacculis racematim
coactis, ab adolescentia rubescentibus, secun-
dum maturitatē ex purpura nigricantibus, sa-
pore ex acido in amarū degenerante, mespi-
laceo quasi concretu, multo graciliore. Habi-
tu reliquo & effigie tota fraxinum æmula-
tur. quare Lucio Columellæ orni sylvestres
fraxini sunt, foliis quàm ceteræ lationibus,
nec deteriorem frondem, quàm vlmī præ-

stant. Capræ autem & oues libentius etiam hanc frondē appetunt. Asperis & sitientibus locis gaudet, mōtes amat: In plana etiā descendit, ita ut viti quoq; copuletur. folia ex vino bibuntur ad iocinoris & laterum dolores, aquæ subter cutē tumores reprimunt. Corpus obesum sensim ad maciem reducunt, si cum vino terantur ad virium portionē, ita ut puero quinque folia tribus cyathis dentur, robustioribus septem quinque vini cyathis. Scobis eius & ramenta perniciose traduntur, proinde vitanda.

ὄροβανχον
Tenic.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteū vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strāgulare. vnde orobanche sibi cognomētum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. legumentis addita, coctionem accelerare creditur. Aegineta, Frig. sic. i.

ὄσυρις.
offi. linaria.

OSYRIS, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, lentos, fractūque contumaces: & in his folia quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos. Aeg. Osyris, è qua scopæ fiunt, amara est, & iccoris referandi vires habet.

OSTEOCOLLON Macedones vocant ὀστέον
 herbam saxi & mœnibus familiarem, medi λον.
 ci polygonion, aliqui talantion, vulgus sym Symphy
 phyton appellant. Perpetuò viret, vivitq; fo ton vulg.
 lus vidua: ramulos instar runcipensiles, cir-
 rosos, tenuioris proceriorisque spartí simi-
 les spargit. Hac tradunt dissectas carnes coa-
 lescere, si coquatur vnà, itidē ossa fracta fer-
 ruminare.

OTHONNA aliqui maioris chelido- ὀθοννα
 nix succū esse aiunt. quidam glauci. alii suc-
 cū floribus corniculati papaveris expressum.
 alii permistos cœruleæ anagallidis, hyoscia-
 mi, & papaveris succos, esse contendunt. alii
 Trogloditicæ cuiusdam herbæ succum, quæ
 othonna vocatur: nasciq; eam in eo Arabiæ
 tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna
 foliis crucæ, perforatis cribri modo, & velu-
 ti à tinea derosis, squalore obstitis, paucis, flo-
 re croci, latifolio. quare quidam anemones
 speciem esse putauerunt. Aliqui tamen affir-
 mant, lapidē esse Aegyptium, in Thebai-
 de nascentem, exigua magnitudine, æreo co-
 lore, gustu, cum feruore quodam & astricti-
 one mordaci. Aegineta, Othonna detergit,
 eroditq; omnia quę claritati oculorum offi-
 ciunt exterens.

OXYACANTHA Quære Acuta
 spina.

OXYAN Græci fagi genus alterum vo- ὀξύαν

Non est
ornus. cant. Lydi Myson, nostri Scissimā: in tenuissi-
mas enim secatur laminas. Glandifera non
est, abietis aspectu, florens, erecta, enodis, il-
li crassitudine proceritateque ferè æqualis.
materia colorata, robusta, neruosa, cortice le-
ui, folio crasso, bifido, longiore quàm pyri,
per extremum aculeato. Fructus glandea ef-
figie læuis, calyculo includitur echinato qui-
dem, sed placido ac blando, nec vt castanea
hispido, cui nihilominus similis est & dulce-
dine & succo. Radices arbor nec multas nec
altas agit, quæ summo cespite gaudeant. Mi-
noribus nauibus cōmendatur ad carinas, itē
ad testudinē plaustrorum, v& tabulorūque
vilem fabricam specie visenda.

pain à co
qu, offic. o x y s herba Plinio à sapore dicitur, tri-
trifoliū a bus tantum foliis.

cetosum,
ou alle-
luya.

παιονία.

Pinoine. P
AEONIA, siue glycyfide, Græcis
aliquibus Pétoboron dicitur. sunt
qui Idæos dactylos radicem pæo-
niam vocant. caulis altitudine sesquipedis a-
dolescit, comitātibus multis stolonibus. Hu-
ius duo genera, mas folia iuglandis habet: in
fœmina verò, smyrnii more diuidūtur. sum-
mo caule filiquas emittit, veluti græcas nu-
ces. in quibus, cum dehiscunt, multa granula
rubra, acinis punicorum similia, inueniūtur,
& in medio nigra, quinque aut sex, purpurea.
radix maristenuis, digitali crassitudine, &

palmi longitudine, gustu astringēs, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, vt in hastula regia. Aeg. Alii qui pētameron vocant. radicē habet acrē, & leuiter subamaram, & ficcantē cum nōnulla astringēte. menses cit, renes & iecur purgat instar amygdalæ pota cum vino: quod si austerum sit, alui quoque fluores coërcet. adalligata verò puero, morbum comitiale abigit.

PALIURVS frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Aegineta, Paliuri folia & radix astringunt, cōque aluum fluentē sistunt: tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt. Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxiliatur.

παλίυρος
Aubepi-
ne, senel-
les, grose-
lier. aliis
ioumarī,
ou ioma-
rin.

PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. Quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phoenix balanus fiet.

φοίνιξ.
Palme.

PALMA, quam aliqui elaten aut spathan appellat, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est, calyxque, quo inspissamenta vnguentarii vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa: præ-

ἐλάτῃς.

Palmula clusa, intus pinguis. Aegine. **Palmae fructus**,
 vulg. **Da-** qui iam ematurus, calidus mediocriter est,
 res ou fi- visceribus roborandis & stomacho idoneus,
 gues roy- tum intus assumptus, tum foris applicatus.
 alle. Reliqua palmae portio vehementer astringens est: quamobrem stomachicis & hepaticis medicinis temperatur: longè magis astringit, quod fructus enascentis veluti in uolucrum est.

πανακίς
 ἡράκλει-
 ον.

PANACES nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimū in Boeotia & in Phocide Arcadiae nascitur: ibiq; compendii & questus, qui ex eo liquore factitatur, gratia studiose colitur. foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulaea accedentibus, in ambitu quinque partitò diuisis: caule, ut ferulae, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etiā minutionibus obsitus, muscaris, ceu anethi, in cacumine flore luteo, & semine odorato, feruentēque radices habet multas ab origine vna, candidas, graecolentes, crassae corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice recenti caulium pullulatu. ea candidum succū emittit, qui siccat, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentē autem succum excipiunt, foliis excavato folio statis, quae siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt.

eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; , siccæ, quæ carie non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluitur, & lactescat. Aeg. Opopanax cal. 3. sic. ὀπὸπᾶ-
ναξ.
2. emollit, discutitque. Radicis cortex est imbecillior liquore. habet nonnihil & abstergens, & carni inducendæ idoneum. Semen menses quoque citat. Succus.

PANACES Asclepii caulem à solo emit πάναξις
tit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quàm fœniculi foliis, hirsutioribus, odoratis: aureo flore, acri, odorato, ex mustariis dependente. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, cōtra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alii cunilam, de qua in Origani mentione diximus. ἀσκληπι-
όν.

PANACES Chironium in Pelio monte πάναξις
χειρώνιον
m

maximè prouenit. folium eius amaraco simile. flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix, serpentium veneno resistit: illita coma, eadem præstat. Aegineta, Asclepion panaces & chironion priori calidiora sunt (malim cum Galeno dicere, minus calida) hinc floribus ipsorum & semine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

παγκρά-
τιον.

Aliis ci-
chorium.

PANCRATIUM, quod aliqui scyllam appellat, radice est magni bulbi, subrufo colore aut sub purpureo, gustu amaro ac feruente: foliis lili, sed longioribus. Aegineta. Specie ac viribus scyllæ simile est, verum imbecillius.

μέλιτος.
Painz.

PANICUM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile: eodemq; modo in panes subigitur. eosdem habet vsus: minus tamen & nutrit, & stringit. Aëtius: Extrà illitum refrigerat & exiccat.

μήκων.
Pauot of
sic. papauer
cor-
nutum.

E sativi PAPAVERIS genere, quod hortense est, semen in panē densatur, qui sanis in vsu sit. eo etiā ex melle pro scama vtuntur. thylacitum vocant. capitulum habet longū, & semē candidum. Syluestre verò, caput infidens demissumque, & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteos succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas valētius, multo his lon-

gius productiore capitulo. Aegineta, Hortē-
sis papaueris, thylacitin etiam uocant, semē
esculentum mediocriter somnum conciliat.
Quod veluti decidētī ac depresso calyce est,
nigrum semen habet & medicatum, nimis
quā frigidum. Quod prolixiore & proce-
riore cōstat calyce, medicatius vniuersis est,
quapropter stuporē inducit quousq; interi-
mat: nā & ipsum & eius lachryma, quam per
excellētiā opium nuncupant, frig. 4.

PAPAUER erraticum, quod rhœada vo *ῥοιὰς*
cant, vere quidem in aruis cum hordeo nasci off. papa-
tur, flore protinus deciduo, vnde & nomen uer rubrū
apud Græcos accepit. folia erucæ, aut origa rust. coco-
no, aut cichorio, aut thymo similia spectan-
tur, sed longiora, diuisa, scabra. iunceus ei quelicoc-
caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris ou pou-
anemones, puniceus, interdum albus: ob-
longum caput, sed quā anemones minus:
semen rufum: radix longa, subalbida, mi-
noris digiti crassitudine, gustu amara. Aegi-
neta: Rhœas appellatur quod flos ipsius cele-
riter defluat (vel semen, vt apud Aeginetam
legitur.) Validius hortensī est. Manducatur
itaque non per se, sed momentum copiosio-
ri melli mixtum.

PAPAUER ceratites, id est, cornicula-
tum. folia habet candida, hirsuta, verbasco *μήκων*
similia in ambitu syluestris papaueris more *κίχαλῖς*
ferrata: caule non dissimili: flore pallido,

caliculo fœnigræci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur. semine papaveris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. nascitur in maritimis & asperis. Sunt qui glaucium hoc papaveris genere factitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Aegineta: Abstergendi vires sortitur, ideóque radicis ipsius decoctū potu iocinorosis auxiliatur: folia autem & flores per quā sordida vlcera expurgant, crustasque tollunt. Aliud papaveris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum parvis, radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Aegineta, Semen habet pituitæ purgandæ accommodatum.

ἀφροδης

πάπυρος.

Non est charta, q̄ vulgo papier.

PAPYRVS, qua chartæ fiunt, nullis nō cognita. Aegineta: Papyrus ignē non experita, materia quædam efficitur: vsta, siccata charta crematæ modo, verū papyri cinis viribus inferior est.

παρωνυχία.

PARONYCHIA exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Aegineta: Illita paronychis atque duritiis remedio est. Vis eius extenuare & siccare, idque citra rosionem.

παρθένιον.

PARTHENIVM, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per

ambitum albo, intus melino, odore graui, sa of. & her.
pore amaro. Aegineta : Amaracus calefacit Matricai
tertio, siccat secundo. re.

PASTINACA syluestris folia gingidii
habet, latiora, subamara: caulem rectum, sca Panetz.
brum: umbellam similem anethi, in qua flo-
res insunt candidi, & in medio purpureum
quiddam, ferme croceum. radix digiti crassi-
tudine, dodrantalis, odorata, que cocta man-
ditur. Satiua ad eadem pollet, inefficacior ta-
men, & cibo aptior. Aegineta: Vrinas & mē-
ses mouet, praesertim semen ipsius, & radix. Pastina-
de ou ca-
rottes.
folia autem absterge di viribus praedita, pha-
gedaenicis affectibus congruunt, viridia cum
melle. Syluestris ad omnia valentior est do-
mestica.

PEPLIS, quam aliqui syluestrem portu ^{πῆλιν}
lacam vocant, Hippocrates peplion, in mari Non est
timis maxime nascitur, late opaco frutice, ca fena.
didi succi pleno: foliis satiuæ portulacæ, ro-
tundis, inferne rubentibus: semine sub foliis
rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice
singulari, superuacua, tenui. Colligi, & repo-
ni ac dari, uti peplos, & sale codiri solet. Eas-
dem habet vires. Aegineta, Peplion caetera
quidem inutile, semen autem ipsius feruidi
saporis, peplo consimiliter expurgat. ^{πέπλος}

PEPLOS frutex est lactei succi plenus, rur. reueil
foliis paruis, ut rutæ, paulo latioribus: rotun le marin
da coma, fere dodrantali, humi resperfa: se. de vignes

mine sub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, superuacuā, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. colligitur messibus, ficcatur in vmbra, & continuè versatur. fructus tusus & feruefactus reconditur. Aegineta: Nonnulli papauer spumeum vocant, liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

πέπων.

Pepon.

PEPON abstergēdi facultate efficax est, inde veluti caro ipsius ephelidas, & consimilia vitia faciei exterit, semē renes obstrucone liberat Aegineta.

PERICARPVM bulbi genus est, eius duæ species Plinio, cortice rubro alterum, alterum nigro, papaueri simile, sed vis maior quàm priori: vtrique autem exalfaciendi, ideo contra cicutam dantur.

πρικλύνειον.

Capri-

feuille,

ou vinci.

boſſe.

PERICLYMENON simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcādida, hordeacea. inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantū rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. nascitur in aruis ac sepibus cōuolvens se adminiculis, propter assidētibus. Aegineta, Eius folia & fructus incidendi simul, & calefaciendi vires obtinent, quapropter vrinam cruentam eliciunt ad sex dies pota.

(Quidam hic numerum dierum perperam quatuor aut quadraginta legunt.) Geniturā viri exiccant quadraginta (aut secundū Dioscoridem triginta septem) diebus in portione assumpta; item lienosos & agrè spirantes adiuuat.

PERISTEREON, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quòd columbæ circa hanc per quā libenter versari soleant, dodrātis altitudine, & interdum amplius adolefcit. folia è caule prodeunt incisa & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sæpius inuenitur. Aegineta, Adeò ficit astringitque vt vulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit. Eius alterum genus in Sacra herba quære.

PERSEA arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtili. in quo phalāgia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perfide exitiosam esse, translatamque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam. Aegineta, Folia siccant, & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt.

MALI Perficæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoque concisa tritaque vmbilico

περίστερον.
Nō ē hęc
ορναλαου
toute bō-
ne.

περσέα.

μηλία
περσική.
Peschier.

m iiii

imposita lumbricos enecant. fructus autem
ipſius, nempe Perſicum hoc eſculétum, frig.
hum.2.

ἀρεθρον,
προσώπι-
ον. Glete
ron. offi.
bardana
ou lappa
maior.

PERSONATA folia habet cucurbitæ,
maiora & hirsutiora, nigriora & craſſiora:
caulem albicantem: quanquam & interdum
vidua caule reperiatur, radice intus candida,
foris nigra. Aegine. Diſcutit, ſiccatur, & aſtrin-
git, quapropter & folio ipſius vetuſta vlcera
perſanant.

Videtur
eſſe cor-
nu cerui.

PES MILVINVS à Columella in v-
ſum colligi & reponi iubetur, ſed qualis ſit
non explicuit.

πτασί-
της.
Rur. ma-
ior barda-
na.

PETASITES pediculus cubito maior,
craſſitudine pollicis, à quo prægrande foliū,
galeri modo amplum, ceu fungus dependet.
Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoëthe
vocant, efficaciter illinitur. Aegineta, Sic.3.
vnde ad malefica & phagedænica vlcera eā
uſurpant.

Oillet
dinde.

PETILIVS flos eſt autumnalis, circa
vepres naſcens, calyculo verſicolori, foliis
quinq;, paruis. Tantum colore commenda-
tur, qui eſt roſæ ſylueſtris. Mirūmq;, in eo flo-
re inſecti cacumen, & non niſi retorto folia
naſci. Semē luteum paruo calyci includitur.
Vſus in medicina nullus. Huic Plinius Italiā
ait nomen dediffe, tanquam nimirum Græ-
cis ignoto.

πτερό-
λίον.

PETROSELINVM in Macedonia pro-

uenit, in præruptis locis: semine ammij, odore
 ratiore, sapore acri, aroma olente. Aegin. Se-
 men cal. sic. 3. Vi incisoria præditum, urinam
 ciet, mensesque trahit, flatibus discutiendis
 accommodatissimum.

PEUCEDANVM, caulē emittit tenuem,
 gracilentum, fœniculo similem. comam ha-
 bet statim ab terra foliosam, spissamq; flore
 luteo, radice nigra, crassa, plena, graui odore
 succosa. gignitur in môtibus opacis. Tenera
 radix cultello conciditur, profluensq; è pla-
 ga succus umbræ mandatur. in sole siquidem
 confestim euanescit. Colligitur, capite prius
 & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor
 premat, & vertigo sentiatur. affatione radix
 inutilis fit. Tam lac quàm succus radice &
 caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora.
 verum inefficacior succo lachryma habetur,
 & velocius expirat. Interdum etiam concreta
 inuenitur lachryma thuris similitudine, cau-
 libus radicibusq; adhærēs. Præfertur succus è
 Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore
 graui, feruens gustu radix eligi debet recēs,
 quæ cariem nō senserit, firma, odoris plena.
 Succus ad potiones amaris nucibus, aut ruta
 aut pane calido, aut anetho resoluitur. Aeg.
 Peucedani liquore & succo affatim calefaci-
 enti, discutiendi, extenuantique vtimur, tum
 naribus admoto, tum in potione assumpto,
 ad pulmonum & pectoris vitia ex humorum

πευκεδά
 νον.
 Peucedan
 ne oucue
 de porce-
 au.

crassitudine contracta, item ad lienē induratum: dentibus autē perforatis impositus, dolorē protinus sopit. neruorum affectibus idoneus est. Radix squamas ossium separat, maleficis vlceribus succurrit. Cal. sic. 3.

φαλάγγιον.

PHALANGIVM à quibusdam phalangites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, indiuersa tendētes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacci coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Aegineta, Nomen hoc inuenit quod phalangiorum moribus medeatur. Naturæ subtilis est excicantisque, qua torminosis auxiliari putatur.

φάλαρις.

PHALARIS cauliculos emittit ex culmis similes minutis ac nullius usus radicibus, multos, duūm palmarum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen cādūm, oblongū, milij magnitudine. Succus eius folia & semen pota vesicæ doloribus auxiliantur. Habet eadem herba tenuem quandā vim naturamque calidam.

φασίολος.

φάσιλοι.

PHASIOLI mentio facta est in Isopyro. PHASELI, aut phasioli qui & dolichi appellantur, macerati donec radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpti, aluum subducunt, ac plus quàm fœnumgræcum alimenti exhibent. Integri verò cum siliquis virides

comesti, plura pariunt excrementa. (Descriptionem habes in sinilace hortensi.)

PHELLANDRION in palustribus nascitur folio apij. Bibitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda. φελλάνδριον.

PHYLLITIS, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, resecta, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem pèsiles quasi vermiculos tenues ostendunt. in vmbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo. neque caulem, neque florem, neque semen profert. Aeg. Cum acerba sit, non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur. esse offic. filipèdu. la aut herb. siler aquaticū φυλλίτις Non est lingua cerni off.

PHYLLVM, quod clæophyllon vocatur, in saxosis nascitur. duûm generû est. quod autem thelygonû appellât, vuas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen. foliis itidem oliuæ est: caule tenui, breui. radice exili. floré album profert: semē papaueris maiusculum, Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat, habet enim racemosum quiddā deflorentibus oleis non dissimile. Ferunt potum alterius semen maris, alterius verò fœminæ conceptû facere. Tradidit hæc quondam herbarius Crateias, placuítq; mihi vsque ad historiam, nec vltà de his docere. (Aeg. non meminit.) φύλλον.

PHYTIVMA folia habet radiculæ, minoræ: copiosum semen, perforatum: radi- φύτιυμα.

cem paruum, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt. Aeg. non memorauit.

φλίον.
Dubitat
an sit sca-
biofa
vulg. &
pfora Aë-
tij.

PHLEON Theophrasto, nonnulli stœbā appellāt. (sed nos infrā stœben longè diuersam afferemus.) Non solum caulē habet aculeatum, sed & folium quoq; hispidum, iuxta cuius spinas aculeos etiam condit, radice nō in profundum acta. Germinat cum Vergilius, primòque aratro vna nec folia dimittit, etenim annicula illi vita, sæpèque bimatū excedit.

φλοῦμ.

PHLUM à superiori longè dissidet, cuius lanugine, vt inquit Theophrastus, ad lixiuū mulieres vtantur, molle & placētaceum est, colore subrubido. Fœmina sterilis est, ad nexu idonea. Mas prorsus habetur inutilis. in insulis fluitantibus prouenit. Pars ab radice pueris cibo grata est. Radix ipsa pecudū pabulo vellitur. (Phlum Iulius pollux nominauit, vnde Phloinas vestes in Herodoto quis legat, & Pausania.)

φοῖνιξ.
Aucine
serule
multis

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: cā lamos digitorum senūm, radici aduolutos: septenas octonāsve spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Aegin. Aliter rhu vocatur: astringēdo, in vino austerā pota, omnes fluidos affectus sistit.

φόρμιον.

PHORMION tenuis, absterforiæ, & at-

tra&ricis est facultatis: semen igitur cū melle albugines extenuat, & spicula ē corporibus extrahit. Galen. & Aeg. (Hoc ab hormino, cui eadem ascribuntur, non dissidere iudico: nam Galenus phormij tantum meminit, nō etiam hormini.)

φoῦ.

PH V, quod & aliqui syluestre nardū ap- pellant, nascitur in ponto, folio olusatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto: floribus narcissi proximis, maioribus, teneris, & exalbicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinē, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum emulantibus. Adulteratur radice rusci admista: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frāgenti contumax, sine vlla odoris gratia. Aeg. Radicem habet nardi persimilem, quæ tamē ad pleraque infirmior sit: sed vrinas magis quā ea elicit, nardi Gallicæ modo.

Valeria-
na maior
ou vertē-
tre cum

P I N V S Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierum distinctionem. arbores vulgò cognitæ. Piceæ cortex astringendi vim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitum persanat, vētrem potus reprimit: folia etiam vulnera conglutinant. (Eadem ferè de pinu tedāq; scribuntur.)

πίτυς
πίυκη
Pin

Aeg. Peuce, id est, teda vires habet piceæ, sed imbecilliores.

πῖτυδες

PITYIDES fructus sunt picearū, mistæ facultatis, astrictoriæ & acris, quamobrè reiectionibus è pectore opitulantur. Aeg.

πυκνόκο-
μον.

PYCNOCOMON constat crucæ foliis, acrioribus, scabris & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubii: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. inuenitur in saxosis locis. Aegineta, Discutit & acre est. folia igitur panos & furunculos dissipant. Semen infixæ corporibus extrahit. Radix flauam bilem purgat.

πῖπερις
Poure

PIPER in India nasci, breui arbore traditur. quæ inter initia, prælongū fructum, veluti siliquā promit. quod longum piper est, habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectū piper euadit. id autem suis temporibus dehiscēs, pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerbæ candidum piper faciunt, aptum ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocāt. Longum verò vehementius mordet. Et quoniam priusquàm ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido sua-

uius, acrius, & ori gratius, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eli gi oportet grauissimum, plenum, nigrum, si ne multis rugis recens minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semi na nutrimento defecta, casta, inania, minimi que ponderis, quod vocant brasma. Non est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existi mauere, sicut paulò pòst ostendemus. Nám que piperis radix cocto similis est. ora gustá tium accendit, saliuam ciet. hæc lienem repri mit, cum aceto illita, aut pota. caput etiã pur gat, manducata cum semine pedicularis her bæ, quam staphidem agriam vocant. Aegin. Piperis radix, costi vires refert. fructus nu per quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidum natura, & calidum. fru ctus veluti acerbus immaturusque album est piper, nigro acrius, vt quod multo magis as satum sit: vtrunque verò & calefacit & de ficit.

PYRETHRVM saliuarem vocant, fo- πύρετρον
Piretre
ou pie
d'Alexan
dre
lia caulémque emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellámque anetæi, circina tæ rotunditatis. radix longa est, pollicis cras situdine, gustu feruidissimo. Aeg. Radix eius vrentè obtinuit facultatem. dentiũ ex frigidi tate dolores mitigat. ad febrium rigores ante accessionem infricatur cū oleo, Corporibus

à perfrictione stupentibus resolutisq; efficacissimè adhibetur.

οὐμ, α̃ πορε **P Y R V M** terrestre aliud sortitū est, aliud
Poire aquosum, ob quod stomachum iuuat, sitim-
que arcet: illitum verò sic. frig. mediocriter.

πορεάκια **Aegineta.**

off. fisti. **P I S T A C I A**, quæ cōstat in Syria gigni, pi-
ca & fisti neis nucib⁹ similia sunt. Aeg. Stomacho me-
corū gra- diocriter conducunt, iecur obstructum rese-
na rant, præcipuè summi & odorati eorum ope-
rimenti ex vino decoctum. Pro sunt etiā con-
tra serpentium morsus.

πιστολοχία **P I S T O L O C H I A** Plinio aristolochiæ
genus est quartum, tenuior quàm clematidis,
densis radicis capillamentis (vnde & polyr-
rhizos nominatur) iunci plenioris crassitudi-
ne. Odor ut reliquis medicatus. Illita serpen-
tiū moribus medetur. Quin & omnino sus-
pensa supra focū fugat domibus serpentes.

πίσων **P I S V M** pariter Græci & Latini vocant le-
Pois gumen, caulibus fistulosis in terram sparsis,
ramosisque, prætenui surculo, folio frequēti,
præter cæterorū morem longiusculo, siliqua
cylindracea, granis rotundis, candidis, flore
papilionis forma, circa umbilicū purpureo,
radice imbecilla. Grana in valvulis se inuicē
quasi tangunt, ut in cruo. Galenus, Pisa fabis
non dissimilem retulere naturā, nec diuerso
ab illis modo manduntur. sed nō adeò uti fa-
bæ inflāt, nec abstergūt: ideóq; segnius aluo
quàm

quàm ille excernuntur. Decoctorum cremor aluum ciet. Recentia, quæ cum suis valuulis manduntur, ructus mouent.

TITHYVSAM specie à cyparissia differre πινύων
constat, & si tithymallorū generi assignetur. σα.
caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geni off. herb.
cularus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore par & med.
uo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, esula. græ
lato: radice crassa, candida, succo referta. qui ci turbet
busdam in locis frutex hic prægrandis inue. & turbe-
nitur. Aeg. Liquorem vt tithymallus habet, ton.
eique similiter purgat.

Duo PLANTAGINIS genera. minor ἀρνόγλωσ
folia habet angustiora, minora, molliora, læ σεν.
uiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra off. lance
sessili: floribus pallidis: semine summis cauli. lotte
bus emicante. Altera maior, lætior, viren plantain
tiorque, latis constās foliis, oleracci generis.
cuius caulis cubiti altitudinem petit, angu-
losus, subruber, à medio ad verticem tenui se-
mine circumdatus. radicibus nititur teneris,
hirsutis, candidis, digitum crassitudine æ-
quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, &
locis humidis. multo vtilior magna est. Aegi-
neta, Plantago frigefacit, siccatur. Tempera-
ta est ex aqua & terrestri substantia, cui e-
tiam distictionis nonnihil adest: quo nomi-
ne ad maligna vlcera, fluxiones, putredines-
que accommodata est, temperamenti mode-
ratione sanguinis quoq; profluua cohibet,

& plurimum congruit. compos enim est siccitatis minimè rodentis, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

πλάτα-
νος.

P L A T A N V S vi humidior & frigidiorè pollet, eaq; de causa folia viridia ad inflammationes nascentes proficiunt. Cortex & pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiã habent in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanât. Cortex autem crematus siccatur vehementius, & abstergit, eoque lepras pellit, & humidis vlcibus medetur. Aeg.

πολύμω-
νον.
bosci sal-
uia. falso
ambrosia
offic. &
herb. cre-
ditur

P O L E M O N I A M alij philetæriam. Capadoces chiliodynamin appellât, ramis exilibus, utrinq; pinnatis: foliis paulo quàm rutæ maioribus ac longioribus calaminthe aut sanguinariæ proximis, quibus summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili. nascitur in montosis & asperis. Aeg. Polemonij vis subtilis & exiccans: inde nonnulli contra coxendicis dolores, intestinorû tormina lienè induratum, radicem eius cum vino propinant.

πολύκνη-
μον.

P O L Y C N E M O N, frutex est furculosus, foliis origani: caule, ut pulegii, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Aeg. Cal. sic. 2. eoq; vulnera glutinat.

πολύγκα-
λα.

P O L Y G A L A palmi altitudinem petit: foliis lenticulæ, gustu adstricto. Aegine. Poly-

galon calidi humidique temperamenti compos est, foliis mediocriter acerbis. potū lactis abundantiam facit.

POLYGONATVM nascitur in montibus, frutice cubito altiore: foliis lauri. latioribus, & leuiorib⁹, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadā adstriptione. flores per singulos foliorū exortus ptomit cādidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione, radicem habet albā, mollem, longā crebro geniculatā, densā, graucolentē, digitum crassitudine equantē, quę vūlneribus efficaciter illinitur. quinetiā maculas in facie delet. Aeg. Variæ particeps est facultatis, astrictoria, acri, amara, & cuiusdam gustu ingrata: quæ verbis nequeat exprimi, quapropter in multiplices vsus haud est accommodatū. Radicē ipsius nonnulli ad faciei labes, ptilos Græci dicunt, abstergendas illinunt.

POLYGONVM sylvestre Plin. describit pene arboris frutice, radice lignosa, stirpe ceteri rubicundo, ramis sparti binum palmorū, nigris, geniculorū, ternis quaternisq; articulis, sapor mali cotonei (Diuersum hoc genus est à duobus reliquis polygonis sanguinarię, sub voce numerandis.

POLYTRICHON, adiantum est.

Duo genera POLI. montanum, cui teu- thrio nomē est, & cuius est vsus. tenuis frutex est, cādidos, dodrātalıs, semine refertus: capi-

tulo in cacumine quandam corymborū specie-
ciem præ se ferente, paruo, canis hominis si-
mili, grauitè olente, nō sine quadam suauita-
te. Alterum fruticosius, non vsq; adeò valens
odore, & viribus infirmius. Aeg. Polium mi-
nus, quo & in antidotis vtimur, cal. sic. 3. itaq;
omnia viscera reſerat, vrinā mensesq; trahit.
Viride adhuc, magna glutinat vulnera. ari-
dum maleficis inspersum vlceribus proficit.

POPVLVS alba aquosa, tepida, terrestri-
que substantia, viribus absterſoriis. Aeg.
POPVLVS nigra cal. i. sic. modicè, & te-
nuis est substantia. folia cū aceto illita poda-
gricos dolores sopiūt. Eius resina floribus ca-
lidior miscetur acopis & malagmatis. fructus
cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

PORRV M mali succi est & acris. Grauiā
facit insomnia, teste Diosc. aluum mollit, vri-
nam ciet, extenuat, vim aliquam abstergendī
habet, qua pectoris excreationes elicit. Semē
eius priſianæ incoctū nephriticis temperatur
medicamentis. folia etiā nonnihil astringūt,
ideoq; succus ipſorum sanguinem ſupprimat.

POTAMOGETON, folium betæ ſimi-
le, hirsutum, paululum ſupereminens extra
aquam. Refrigerat & inſpiſſat. pruriginibus
vtilè, & contra veterum vlcerum nomas. No-
men ex eo inditum est, quòd paluſtribus &
aquosis enaſcatur, Aeg. Refrigerat & abſtrin-
git ſanguinali herbæ cōſimiliter, iisdem vir-

λίμνη &
χαίρος.
tramble
Poplier

πράσον.
Porreau

ποταμό.
γίγον.

tutibus præditum.

POTERIVM, lones neurada vocant, τοτήριον
largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus tragacanthæ proximis: foliis parvis, rotundis: flore exiguo candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nasceitur in aquosis, & collibus, radices demittit binū ternūve cubitorum, nervosas, & firmas, quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. tussæ, præcisis nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest. Aegineta, Vocant alij phrynion. Radices concisæ, nervos præfectos & vulnera glutinant. Decoctum ipsius epotum, nervorum affectionibus auxiliatur.

POTHOS Theophrasto duorum est generum: alterum hyacinthi flore, alterum sine colore, candidum, quo sepulchra coronabant, à quo & nomen, quasi desideratis esset dicatum. floret æstate, sed diuturnius est candidum, πόθος

PRUNI fructus ventrem subducit, recēs magis, aridus minus. Decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidit, extenuat: vesicæ calculos cū vino potum nonnulli frangere affirmāt, ex aceto pueroꝝ

κοκκύμελον

rum impetiginēs sanare. Syluestrium prunorum bacce euidenter astringunt, ventremque reprimūt. Nominatur hæc planta in Asia prumnum. Domestica sunt quæ Damascena appellantur.

ψόρα.

PSORA Aëtio herba nuncupatur (forſan ab habitu ſcabo, aut quod ſcabiei medeatur) eius uſtæ fumo arborum erucas mori ſcriptum reliquit.

ψύλλιον.
Herbe a
pules

PSYLLION foliis coronopo nō diſſimilibus hirsutis, longioribus: ſarmentosa ſœni modo in totū herbula, ramis dodrantalibus. coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his ſemine duro, nigro, pulicum ſimili, unde & nomē in aruiſ & incultis naſcitur. Aeg. Herba pulicariſ ſemen, frig. 2. ſiccādo humectandoque medium eſt.

πταρμικη.
offic. &
herb. pyrethrum
ſylueſtre

PTARMICA frutex eſt, furculos habens paruos, multos, & rotundos, abrotano nō diſſimiles. & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulū, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod ſuo acro odore ſternutamentum excitat: unde nomē accepit. flores ſternutamenta efficaciffimē mouēt. Naſcitur in montibus & petroſis. Aeg. Folia ſternutamenta proritant. Totus autem frutex viridis ſugillata, liuoreſq; alioſ diſſicit. Eſt enim herba cal. ſic. viridis quidem 2. arida 3.

βλάχον.

PVLGIVM herba vulgaris notitiæ.

Vocant aliqui blechona, quoniã dum floret poulicul
gustatum à pecoribus, balatum concitat. Ac ou pou-
gineta, Calefacit & extenuat vehemēter, vn- liot
de si illinatur ruborem excitat, & crassos vi-
scososque humores è thorace & pulmone e-
molitur.

πίπρος

PULMONARIA, quam aliqui pepanū
vocant, buglossi folio cōspicitur, sed promif-
fo magis, atq; laxiori, colore insuper dilutio-
re, albicātibus maculis notato, instar pulmo-
nis, inde nomen nascitur in humidis. Volunt
aduersus morbos visceris sui nominis pecu-
liari esse remedio, in cibo sumptā, vel potā.
(Aliam eodem nomine, cum de consilagine
mentio fieret, docuimus.)

ῥοιὰς μῆ-

λον.

Granade

MALVM punicum omne astringendi vi-
res eximias habet, quibus refrigerat siccātq;
verum dulce aliis minus: austerum magis re-
frigerat, siccīusque est, & stomacho amicum.
Acidum refrigerat quoque, & maiorē quan-
dam incidendi virtutem representat. Verum
acini succo magis adstringunt siccātque: ef-
ficacius his adhuc malicorium, quod sidion
Græci vocant. Huic virtute respondet mali-
flos, qui cytinus appellatur. Aeg.

Q

περτὰ

Q

VINQVE folium ramulos fert φυλλον
furculaceos, tenues, dodrātales, in quinq;
quibus semen: folia mēthæ, quina feuille

n iij

singulis pediculis, raro plura, in ambitu ser-
rata: florem ex luteo pallescentem, auri æmu-
lum. nascitur in riguis, & aquariis ductibus.
subrubram habet radicem, oblongam, vera-
tro nigro crassiorē. Aeg. Sic. 3. minimè acre,
coq; in multos vsus accommodatur.

δρῦς
Chesne

Q U E R C V S & folia & fructus siccante
& tepida vi pollent: quamobrem vulnera re-
centia glutinant, inflammationibus incipi-
entibus medentur. at quod sub glandis corio
& circa fructus carnem membranę simile in-
cluditur, valentius astringit: coq; ad fluxum
muliebrem, aliósq; fluidos morbos exhibe-
tur. Aeg.

R

σπούθιον
Herbeau
foullon
off. sapo-
naria.

R

A D I C V L A seu struthiũ herbã
vulgò nota, qua purgandis lanis
vtuntur, qui eas eluunt. Gale. Ra-

dicis vsus est præcipuus. Acris est, cal. sic. 4.
Abstergit, irritat: hinc est quod sternutatio-
nes cit similiter aliis, quorumcunq; cum acri-
monia calidum temperamentum est.

ῥάφανος.
Rauc re
forũ, ra-
phan.

R A D I X, quæ græcis raphanus dicitur:
sylvestris raphani, quam Romani armora-
ciam vocant, folia satiuo similia, sed magis
lapsanam imitantur. radix gracilis, tenera,
subacris. Tam foliũ quàm radix in olera re-
cipitur. sed hæc exalfacit, vrinam concitat,
æstuosa est. Aegineta. Radicula cal. 3. sic. 2.
Sylvestris efficacior est in ambobus. Semen

utriusque planta ipsa vehementius, itaq; sigillata aliósq; liuores difficiliter.

RADIX Hippocrati nominatur quoddam genus sati, sine flore, sine semine, tribus duntaxat foliis, sed proceris, & in terra stratis, duorum digitorum magnitudine, similibus anchusæ, radice purgandi viribus, sed exiliter. (Eadem mihi Dioscoridis Onosma videtur.

RANUNCULI complura sunt genera. vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam vnum coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitū alto: radice alba, exigua, amarâq; multis capillamentis, hellebori modo fibrata, nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorū incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quàm acerrimum, quod sylvestre apium appellât. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Aegineta, Omnia ranunculi genera excellenter sunt calida, sicca, acria, vrentia, adeò vt vlcus cū dolore excitent: quibus si modicè utaris, cutis vitia tantum exterūt. Radix autem arida sternutamentis ciendis est medicamentum. (De altero ranūculi genere multa leges in Sardonîæ mentione.)

RAPĪ radix & semen flatulenta, & semi-

ῥίζα.

βατράχιον.

Apiū rusticū, & Apiū rissus herb.

σεγγυλίβ Rabe.

ni creando sunt, veneremq; excitant. Aeg.

ρογγλίσ
ἀργία.
Reponce
of. rapha
nus sylue
stris.

Syluestre RAPVVM in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, laeue, in cacumine folia fert leuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis calyculatis. cūmq; eorum inuolucra aperiantur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totōq; corpore vtimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui tritici, aut lolii farina fieri solent.

ῥετίνη.

Liquida RESINA è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet. atq; olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomētum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina quam vernaculo nomine laricem appellant incolæ, ea in linctū, & per se magno opere prodest tusci veteri. Colore inter se distant. siquidem alia cādida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ ceteras antecedunt: odo-

rate enim sunt, atq; thus odore imitatur. Prestantiores à Pityusa insula deferuntur, quę secundum Hispaniam sita est. Sed quę è picca, nucibus pineis & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorū & ille sumi solent. Lentiscina terebinthinę respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplę capacitatis ad humorem qui infunditur. Itaque resinę congius in duobus aquę pluvię coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. cæterum vbi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitū vocant, id est, nō illitū, recōditur. Fict etiā eximii cādoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò fæculēta sordes excernatur. Vritur quoq; sine aqua, primū lento igne: & vbi coire cœperunt, maior carbonū strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, vsq; dum antedictas naturę suę notas exuerint, mox, vt dictū est, reponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse satis est. Aeg. Resinę omnes calefaciūt & desiccant, verū terebinthina principatum obtinet, discutientis naturę, emolliētis, tenuis, & absterforiæ, eaque scabiem corrigit. & latic huiusmodi est. Quę verò è teda destillauerit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit.

medium inter ipsas locum tenet, & quæ de piicea & quæ de abiete raditur.

ξύμνος.
Burgaspi
na ou ne
prum.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, foliis paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. tertium nigrioribus latioribusque foliis constat, & quadatenus rubentibus. cuius rami quinûm cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minûsq; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, cādidum, tenuem, follicularii specie, verticillo similem. Aegineta, Siccatur 2. frig. primo, Quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur, sed teneris eius foliis utendum est.

ῥῶποντι-
κόν.
Reubar-
be. offic.
rhaponti-
cum.

RHAPHANVM in Radice habes.

RHA, aliqui rheum, Latini rhaponticū vocant, prouenit in iis quæ supra Bosporū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & ruffior, fungosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatūque colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Aegin. Compositum est ex terre stri frigida & tenui substantia, aëreāque calida & leniter acri: eamque ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spirantibus opitulatur. Quod

discutiendi vim habet, liuores emēdat: quod
astrictoriam, cruētas excreationes, cœliacos,
& intestinorum tormina sanat: vtraque verò
facultate iocinorosos iuuat.

Gignitur RHODIA radix in Macedo-
nia, costo similis, leuior, inæquabilis, quæ cō
trita rosas redolet. Vtilissima capitis dolori-
bus, si madefacta fronti & temporibus cum
rosacei momento imponatur. Aegineta. Ca-
lefacit secundo, tenui & discutiente vi præ-
dita.

ῥοδία ρι-
φα.
Rosaceū
lignum.

RHVS, quæ obsoniis aspergitur, ab ali-
quibus erythros appellata, semen est coria-
rii fruticis: sic vocati, quoniam coriorum in-
fectores eo vtantur ad inspissandas pelles. ar-
buscula in petris nascens, binūm cubitorum
altitudine, foliis oblongis, subrubentibus, in
ambitu serratis, acino vuarum gracilium dē-
so, magnitudine terebinthi, quadam tenuis
lato. Cuius corticosa tunica perquàm utilis
est. Aegineta, Rhu coriariæ à medicis dictæ
fructus præcipuè, & succus, magno in vsu
sunt: astringit enim, & sic. 3. frig. 2. (Emen-
dauimus ῥυπτικοῦ, vt iuxta Galenūm ῥυκ-
δικοῦ legatur.

ῥῥε.
rur. viur-
ne.

RHVS herba syluestris Plinio, colico-
lis breuibus, foliis myrti, tineas & venena
pellit.

CICI, aut croton, nomen accepit à ricini
animalis similitudine. arbor prouenit parua

κρότων

Herb. ca- ficus altitudine : folio, platani, sed maiore,
 taputia læuiore, & nigriore : ramis, caudicibus.
 maior. of que cauis, in arundinis morem : semine in
 fi. et vulg. vuis asperis, quod corticibus exutum, ricinū
 palma animal repræsentat: ex quo oleum, nomine
 Christi. cicinum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis
 emplastrisque vtile. Aegineta. Ricini fructus
 quæadmodum purgat, abstergit, digerit: sic
 etiam folium, sed imbecillius.

R O D O R A Gallis appellata herba, vt in-
 quit Plinius, iuxta viduas populos prouenit,
 caule instar ficulneæ virgæ articulado, foliis
 vrticæ in medio exalbidis, quæ processu tem-
 poris tota rubent, flore argenteo. Præcipua
 contra tumores feruorésque & collectiones
 per se, vel cum axungia veteri tusa.

R O S A refrigerat & astringit, sed sicca
 multò magis. Succus recentibus foliis ex-
 mitur, defectis forfice vnguibus (sic appella-
 tur candidæ foliorum partes) reliquum in pi-
 la premi & teri debet in vmbra donec coga-
 tur & ita ad oculorum circumlitiones recon-
 di. Siccantur etiamnum folia rosarum, conti-
 nuò versata ne muceant, nè sitis in iis insi-
 deat. Aegineta, Rosæ mixta constant substan-
 tia, aquosa scilicet, calida, astringenti & ama-
 ra: flos autem ipsarum magis adhuc astringit,
 eoque desiccatur.

λιβανω- Duo ROSMARINI genera, vnum fœ-
 τισ. cundum frugiferumque, cuius semē cachrys

vocatur. folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia. caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis. in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mādendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondylium, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur alba. Verū id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert. sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. nascitur in saxosis & asperis. Rosmarinum cū erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ asperioribus, candidioribūque, radice breui. Theophrastus author est. potūque id ipsum alterutra parte purgare.

ROSMARINVM, quo coronarii vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, dēsa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, graui odore. Aegineta, Libanotis vna sterilis est, duæ fructum ferentes. Vires illis extergendi, incidendi, discutienti, & emolliendi. Succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur. Coronariæ verò libanotidis decoctum, regio morbo laborantibus rectè bibitur.

Incēsaria
ou Ros-
marin.

λιβανω-
τίς στεφα-
νωματί-
κη.

ἔρυθροδαν
 301.
 off. rubia
 tinctorū.
 vulg. ga-
 ranse.

ERYTHRODANVM radix rubra est, qua tinguntur lanæ. vna sponte prouenit, altera feritur, vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italia, in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. hanc non sine quæstu ferunt. nanque maximū ex ea sentiunt prouentum. asperi caules & quadranguli, longi, aparinae non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: foliis per intervalla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ematurus nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Aeg. Radix acerba amarāque est. Lienem iecur, & renes ita purgat, vt cruenta quoq; per vrinam & menses euocet. Cutis vitia rancida abstergit.

βατος

RVBVS, notitiæ vulgaris. Aegi. Rubi runce, ca fruticosum abundè astringit & siccatur, qua de therine, causa & vulnera cōmittit, & defluxiones siou franc- stit. Radix autem præter astringentē, non pa- bofier. rū etiam subtilis est, vnde renum calculos cōfringere est idonea. Fructus si maturus est, magis calefacit, simulque mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est: immaturus aut, & acerbus est, & validè siccatur, præsertim aridus. Eadem etiam flos efficit. (Chamæbatū rubi genus humile suprà diximus.)

βατος
 ἰδαῖος.

IDÆUS RVBVS appellatus est, quoniā passim in Ida proueniat. Est autē longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquā
 & sine

& sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat quæ supradictus. Aeg. non recensuit.

R V B V S canis frutex est arboris instar, κυνόβητος.
englética
rubo longè maior. folia fert multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Aegineta, Rubi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant medicriter. At quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

R V M E X, vide Lapathum.

Syluestris M Y R T V S, aliquibus oxy-myrsine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modò lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & baccae in vino potæ urinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiâ morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in vino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinâ mouent. (Galenus & Aegineta nullam fecere mentionem.

ὄξυμυρσί
vñ.
Hou ou
houfse.

πύκνον.
Rue.

RUTA mōtana syluestrisq; satiaua & hor-
tensi acrior est, & in cibis damnata. satiaua ve-
rò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in ci-
bos admittitur.

πύκνον
ἄγριον.
offi. har-
mela &
syluestris
ruta.

vocat etiamnum syluestre rutam, quod
in Cappadocia & Galatia Asiae finitima mo-
ly dicitur. Frutex est qui ab vna radice mul-
tos emittit cauliculos: foliis multò quàm al-
terius rutæ longioribus, tenerioribûsq; odo-
re graui: flore candido: capitulis in cacumi-
ne paulo maioribus quàm satiaue rutæ, quæ
tribus maximè partibus constat: in quibus
triangulum semen, subrufum, gustu amarū
recluditur. cuius est vsus. semen autumno ma-
turefcit. quod cum melle, vino, croco & fœ-
niculi succo, ac gallinaceo felle teritur cōtra
retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-
malam vocent, Syri besafan. qui Cappado-
ciam incolunt moly, quoniā quandam cum
moly seruet similitudinem: radice nigra, flo-
re cādido. In collibus & læto solo prouenit.
Aeg. Ruta syluestris calefacit, siccatur quarto.
Satiua vsq; ad tertium. Vis eius est crassos len-
tōsque humores incidere, & dissipare, vrinā
mouere, attenuare, & flatus discutere, vnde &
venerem coërcet. Alio loco in moly, quæ
etiam ruta syluestris est, substantia renuem
esse prodit, calefacit 3. & reliqua cum supe-
rioribus eadem.

S

ABINA duorum generum est. *βράβη.*

S Vna foliis cupresso similis, spinis *λαυμνιέ*
horridior, grauiters olens, acris &
ferues. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese
magis in latitudinem fundit. huius foliis nõ-
nulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici fo-
lio similis est. Aeg. Cal. sic. 3. tenuissimâque
est, extenuat, & digerit pota, tum in putredi-
nes cupresso similiter efficax est.

SACRA herba, quæ & peristereon nomi *ισοβόλα*
natur, ramulos emittit cubitales, aut maius- *vn.*
culos, angulosos, in quibus ex interuallis fo-
lia quercus, sed minora angustiorâque, eisdẽ
diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæ-
sio. radix longa, tenuis. flores purpurei, gra-
ciles. Galen. & Aeg. tacitâ præterierunt. Dio-
scorides serpentibus aduersari scribit: mor-
bo regio cum aliis quibusdã succurrere. Vete-
res tumores & inflammationes illitam leni-
re, sordida purgare vlcera, tonsillarum cru-
stas cum vino erumpere: oris depascentia vl-
cera compescere.

SAGAPENIVM ferulaceæ herbę succus *σαγάπην*
est, quæ in Media nascitur. Optimũ est trãs- *ρον.*
cès, fuluo forinsecus colore, & intus albo, ne-
scio quid inter laser & galbanũ redolēs, gustu *offi. sera-*
acri. Aeg. Liquor est calidus & tenuis, cui etiã *pinum.*
absterforia quedã vis inest, qua & oculorum
cicatricibus & suffusionibus prodest.

ἰτιά.
Saulx.

SALIX vulgò nota est. Aegineta. Salicis & folia & flos facultate cōstant quæ citra ro-
sionem siccet, tum quæ nonnihil etiam astrin-
gat. Cortex autē paulo siccior est, cuius peru-
sti cinis ex iis habetur quæ vehementer exic-
cent, quippe clauos & myrmecias cum ace-
to exerit.

ἐλελίσφα
κος.
Saulge.

SALVIA siue elelisphecon, frutex est ra-
mosus, longus, virgas, habens quadrāgulas,
& canas: folia mali cotonei effigie, sed lon-
giora, asperiora, crassiora, & quæ sensim at-
tritarū quasi vestium scabritiem referant, hir-
suta, subalbida, perquā iucundo odore, sed
gravi. semen summis in caulibus sylvestri or-
mino simile gerit. In asperis nascitur. Aegin.
Evidenter calfacit, & leuiter astringit.

ἄκτῆ.
Sus, ou
suin.

SAMBUCI duo genera. Vnum in arbo-
rem assurgit, surculos spargēs arundinaceos,
teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iu-
glandis, terna quaternāve, ex interuallis cir-
ca ramos exeunt, graui odore, minutim in
ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus
cauliculisque circinnatæ umbellæ, quæ flo-
rem candidum pariūt, mox acinum terebin-
tho similem, in nigredine suppurpureum, ra-
cemosum, succo madentem, vinosumque.

Alterū genus chamæaste vocatur, Roma-
nis ebulum, longè humilius est, magisq; her-
baceo generi assignandum, caule quadran-
gulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex inter-

uallo longioribus, geniculatim expāsis, pinnatisq; graueolētibus, in ambitu ferratis, muscario sambuci: flore & acino eiusdem. radice nititur longa, crassitudine digitali. Aegineta: Sambucus pariter & ebulus deficcant, modicè digerunt & conglutinant. Potu autē esūve per aluum aquam educunt.

SAMPSEVCVM in Cypro & Cyziceno σαμψυ-
laudatissimū. secundum sibi locum vendica χος.
uit Aegyptum. Amaracū gens Sicula & Cy- Mario-
zicena appellat. Herba est ramosa, per terrā laine.
repens, foliis eius calaminthæ quæ tenui fo-
lio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis
& rotūdis. suauissimum odorem spirat: ideo
coronis inseritur. Aeg. Cal. sic. 3. Est etiam te-
nuis naturæ & discussoriæ.

SANGVINARIA, vel polygonū mas πολύγωνος.
ramos habet teneros & molles, frequentibus
geniculis cinctos, qui per terram, vt gramē,
repunt: folia rutæ, sed molliora longioraque:
semine sub omnibus foliis turgescere: vnde
marem appellari volunt. flos ei cādidus, aut
puniceus. Sanguinaria fœmina fruticat vno
caule arundini teneræ simili, dēsis geniculis,
& in se tubarū modo fæctis. articulos in or-
bē cingunt. apices foliolis piceæ similes. radi-
cis nullus vsus. nascitur in riguis. Aeg. Habet
sanè vim quandā astringendi, sed humiditas
in secūdo ordine frigida in ea præpollet. Sto-
machi feruori frigida inspergitur vtiliter, sa-

offi. corri-
giola, &
centino-
dia.

cris ignibus inflammationibúsq; calidis illin-
tur, ac talis quū sit, fluxiones repellit, atq; hac
ratione ficcatoria esse putatur. Fœmina autē
mas vehemētior est. (De tertio quodam eius
genere in polygono syluestri iam diximus)

σάντα-
λον.

SANTALVM Græcis recentioribus li-
gnum est, quod India mittit. Luteum præfer-
tur, si pingui quodam scatet. Secundas partes
obtinet rubrum, & frigidius aliquanto cæte-
ris existimatur. Tertio loco reponitur albū.
Cal. 3. sic. 2. Excalfactis auxilio sunt, imbecil-
litatē stomachi leuant, itémq; cardiacos effe-
ctus, quos irrepens bilis excitauerit. Ex albo
oui liquore fronti imposita defluxionum im-
petus quæ ad oculos decumbunt, cohibent.
Trita ex stillatitio rosarum liquore, & illita
temporibus adiecto caphuræ momento, ar-
dētes capitis cruciatus mitigāt. Incandescēti-
bus articulorū inflammationibus, podagrísq;
ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ, lenti-
culæve palustris illinūtur, repelluntq; humo-
res, qui eò loci se conferunt, præcipuē rubrū.
(Nunc nullæ non ferè medicorū potiones vt
gratiam odore suo à sumentibus incant, iis
imbuuntur santalis.)

σαρκο-
κόλλα.

SARCOCOLLA lachryma est arboris
in Perside nascentis, pollini thuris similis, ru-
fa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum
fluxiones inhibet. emplastris inseritur. A-
dulteratur admisto gummi. Aegineta, Op-

plet, citra rofionem fccat, ideóque vulnera glutinat.

SARDONIA vel sardoa herba pro altero ranúculi genere intelligitur, copiofiffimū in Sardinia, guftus acerrimi, priuatim apium ruficum cognomināt. Sunt qui apiaftro, id eft, fylueftri apio fimilem faciant. Meminit Dioscorides libro fexto. hac vefcentibus mētem adimi, & quadam neruorum diftētionē dehifcere in rictu ora cogi, ita vt ridentium imaginem præbeant. Inde Homerus & pofteri rifum nullo falubri fenfu dignum, fardonium nominant. Strabo ex hac herba toxici genus Hispanos confeciffe prodidit, hauftu cuius vrgente vi maiore citra dolorem ipfi fibi mortem confeifcebant. Nafcitur fecus fontes, nullum tamen virus peftilens aquis impertitur, Paufanias apud Sardos eam gigni fcripfit.

SATYRIUM aliqui trifolium vocant, quoniā tria fert folia, ad terrā infracta, rumici aut lilio fimilia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florē lilii effigie, cādidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluā, intus, vt ouū, candidam, guftanti dulcē, & ori non ingratam. Eft & alterū fatyriū erythroniū fiue erythraicon, id eft, rubrū

σατυρίον
tefticul^{is}
facerdo-
tis.

ερυθρόν
vior;

o iiii

autē album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. in mōtosis & apricis enascitur. Aegincta. Satyriū humidum est & calidū, item flatuosum, vnde veneris appetentiam facit. Nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in comētario de theriaca, trifolium ait hyacintho simile, quum aëre inturgescens, semen sylvestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius superfulum, phalāgiū aut viperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

σατυρίον
βασιλικόν.

SATYRION basilicum Græcis nominatur, foliis nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. radix subest lutea, ac instar manus effigie ramosa. Cutim erugat, ad neruorū dolores, & contra noxia medicamenta datur. Semen ex vino sumptum nouem diebus comitiales sanat. In eundem effectum vinū diluitur herbæ decocto. Scobs radice propinatur in vino ad arcendā quartanam, quam & vomitione curat, paulo ante accessionem pota. Fertur & amuletum esse radix gestata. (Herbam quoque illam satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatam ex India: incredibili neque fanda ad libidinis motus potestate vel cōtactu: nō tamen speciē eius aut nomen aliud reddidit Theophrastus.) Habent hodie & Syri herbam simili effectū, bucheidénq; nominant,

& Indicum satyrion, radice candida & dura, commendatiore quo crassior, rugosior & al-
bior fuerit, podagris utili.

SATYRION triuialis notitiæ est. gigni- *βύμβριν*
tur in asperis locis, & tenui solo, thymo simi *Saricete*
lis, minor tamen & tenerior. defert spicâ flo-
rum plenam, coloris herbacei. Eadem potest
quæ thymum, si modo cōsimili sumptitur.
Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam sati-
ua, syluestri prorsus minor, quæ propter mi-
torem acrimoniam, commodius in cibos re-
cepta est. Aeg. Thymbra agrestis quidem ea-
dem quæ thymus præstat: hortensis autem in
omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum
laudatior.

SAXIPHRAGA seu saxiphrages urinā
mouet, & calculos conterit. Aeg.

SCAMMONIA, ramos ab vna radice e-
mittit trium cubitorum, multos, pingues, & *σκαμμο-*
qui non nihil crassitudinis præ se ferāt: foliis *νία.*
helxing, aut hederaceis, mollioribus tamen, *Diagre-*
hirsutis, & triangulis: flore cādido, rotundo, *don me-*
in calathi modum cauo, graucolente: radice *dici nūc*
prælonga, crassitudine cubitali, candida, gra- *appellāt*
ui odore, succo grauida. Legitur ad hunc mo-
dum succus, Capite exempto, radix in testu-
dinis speciem cultro excuatur, quo fit vt in
cauum confluat succus, qui conchis demum
excipitur. Alij scrobes in terra concamerato
fodiunt, in quos, subiectis iuglandium

foliis, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte) sed longe magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, grauias, densas, crui farina & tithymalo vitiatas. Aegin. Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor qui iam & phymata dissipat, foetus appositus corrumpit, lepras extergit, in diuturno capitis dolore cum oxyrhodino vtiliter respergitur. Radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potum, purgat. Cum aceto & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus illinitur.

σκανδίσ.

SCANDIX sylvestre olus est, amarum, subacre. quod crudum coctumve manditur, stomacho & ventri vtile. Aeg. Cal sic. 2. Vrinam

σκήλα.

pellit, viscera obstructione liberat,

Scipoul-

SCYLLA incidit, calefacit, & desiccatur, in secundo ordine. præstat autem eam assam aut elixam sumere.

le. offic.

squilla

Charpen

taire

SCOPA regia Plinio viola est violentum spirans odorem, sed hoc foliis, non floribus.

(fortassis eadem fuerit viola flammea, cuius ramuli & folia odorata describuntur, flos inodorus. Vere statim post purpuream emicat, sylvestris dūtaxat: in ordum tepidioribus locis, ubi cælum arridet clementius, nondū exacta hyme, colore cōmendabili, odore nullo femine proueniens coronis. Plurimum durat tempus. Græcis phlox & phlogion appellatur.) Diosc. bunion suum Latinis scopam regiam scribit appellari. Plinio similiter appellatur sideritis, quæ sit latissimo folio, vulneribus præcipua, quæ etiam præcisos nervos glutinare possit.

SCORDIVM in mōtibus & palustribus nascitur, foliis trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis. aliquantū allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. inter priora efficax Ponticum natione, Creticūmq; Aeg. Variis pollet facultatibus, ut quod amarū, acerbū, & acre sit. purgat igitur simul & calfacit viscera. urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

SCORDION alterius generis mēthastro simile à Plinio traditur.

SCORPIOIDES herbula est, quæ semen habet ad similitudinem caudæ scorpionis, foliis paucis. illitum valet aduersus animal

σκορδιον
Herb.

chamæ-
dryspalu-
stris rur.
chamara
Non est
hæc alliū
sylvestre
seu allia-
ria

σκορδιον
ἐν πρην.
σκορπιον
δὲς.

Non est sui nominis. (Plinius herbam scorpionum vo-
calédula cavit, quanquam & aliis idem nomen con-
nec fol tribuat.)
sequia

SCORPIVS siue ~~nopa~~ nullum folium ha-
bet Plinio, sed in cacumine aculeum, sub cu-
ius extremo in carne protuberante, florem
profert per initia cādidum, postea leniter ac-
cedentem ad purpuram. Post æquinoctium
autumni floret, radice singulari eadēq; bre-
ui cohæret. Spina est in totum, asparagi cau-
le. Nomen ab aculeo suo traxit. (Eadem ar-
bor cum Dioscoridis trago herba. Describit
& alium scorpionum Plinius cyclamini folio,
aconiti generibus adnumerandum.)

SEBASTI, vide Myxa.

σκοροδο-
πρασον.

SCORODOPRASVM magnitudine
porrum æquat, qualitatū porri & allij par-
ticeps. vnde promiscuas sibi vires ex utroque
vendicavit, effectus allij & porri præbens, in-
efficacius tamen. coctum, porri modò, dul-
cescit, & in olerum vicem transit. Aeg. Porri
& allii mixtas habet vires, & gustatum.

Segle

SECALE Plinio farraginis genus, occari
tantum desiderat. Taurini sub alpibus asiam
vocant. deterrimum & tantum ad arcendam
famam vtile, fœcunda, sed gracili stipula, ni-
gritia triste, pondere præcipuum. Admiscet
huic far vt mitiget amaritudinem eius, & ta-
men sic quoque ingratissimum vëtri est. Na-
scitur qualicunq; solo cum cetero grano,

ipsumque pro latamine est.

HEDYSARON, vnguentarij pelecini, *πλεκί*
id est, securidacam vocant, fruticosa est, foliis *vos.*
ciceris. semen rufum in filiquis fert, cornicu. Feue de
lorum modò aduncis, quod ancipitem secu loup, her
rim æmulatur, vnde nomen accepit. amarum bue ou
gustu. N. citur in segetibus & hordeis. Aeg. graue
Amarum est, leuiterq; astringit, vnde potum ou cor
stomacho gratū redditur, viscera obstructa nuette
repurgat.

SELAGO similis herbæ Sabinæ est. Hæc
contra omnem perniciem habendam prodi
dere Druidæ Gallorum, & contra omnia oeu
lorum vitia fumum eius prodesse.

SEMPERVIVVM magnū ideo nomi
natur, quoniam perpetuò folia vireant. cuius
caules cubiti altitudinem implent, interdum
excedunt, pingues, crassitudine pollicari, vi
rentes, characiæ tithymali modo infecti: fo
lia pingua, carnosæ, lōgitudine pollicari, in
cacumine linguæ similia, alia in terram con
uexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt am
bitu effigie imitentur oculi. nascitur in mon
tibus, & testaceis. supra domicilia etiam feri
tur. Semperuium paruum in petris, parie- *αίξων.*
tinis, & maceriis, necnō scrobibus opacis na- *Iōbarde*
scitur, caulibus ab vna radice multis, tenui- *ou Iou-*
bus, crebrò foliatis: exilibus foliis, rotundis, *barde*
pinguibus, mucronatis: caule à medio emi
cante, palmum alto, ymbellam herbidósque

Vermicu
laris &
cauda
muris

Menu
pourpier
sauuage
flores & tenues gerente. Folia eisdem cū priore viribus prædita sunt. Tertiū videtur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut thelephion, vocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribúsq; foliis, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. illita cum axungia strumas discutit. Aeg. Aizoon vtrunque frig. 3. siccatur autem astringitq; mediocriter. Valet erysipelatis, & ad herpetas, inflammationesque ex fluxione concitatas conuenit.

ἡρίγιον.
Senecio
SENECIO cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, diuisura crucæ, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos. nomē verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu vere canescāt, radice supernacua. nascitur maximè in maceriis, & circum oppida. Aegine. Mixtas habet vires, refrigerat, & modicè discutit.

ῥίσις.
Cichoree
SERICA in Ziziphis leguntur.
SERIS duūm generum est. altera syluestris, quæ picris & cichorion vocatur. altera satiuā, latioribus foliis cōstat. stomacho quā hortenſis vtilior, quæ iterum in duas species digeritur. vna folio latiore prodit, lactucarū simillima. altera angustiore est folio, & gustu amara. Aegineta, Subamarum olus est, admodum refrigerans humectansque, cum

astriictione nonnulla.

SERPILLVM duorū generum est. Hor- ἑρπυλλον
tense odore sampsuchum imitatur, atq; in co Serpillet
ronas addi solet, cui à serpendo nomen indi-
tum est: quoniam si qua eius particula terrā
attingat, inibi radices demitter. folia & ramu-
los organi habet, sed candidiores. in mace-
riis multo procerius assurgit. Sylvestre, zy-
gis appellatum, non serpit, sed in altitudi-
nem increfcit, ramulos edens tenues, surcu-
losos, foliis refertos longioribus quā rutæ,
& durioribus, angustis. flores iucundè olēt,
gustāti acres. radice nullus vsus. Nascitur in
petris, satiuo efficacius, atque magis exalfa-
ciens, & ad medendi vsum aptius. Aeg. Serpil-
lum calefacit, vt & vrinam & menstrua com-
moueat.

SESAMA stomacho inutilis cibis. Aeg. σησαμον
Sesamū non parum lentoris, pinguisq; obti- offic. sifa
net: idcirco opplere, mollire, & mediocriter mum
calefacere idoneum est.

SESAMOIDES magnū, in Anticyra el σησαμον
leborum vocant, quoniam albo veratro in αδ'ες με-
purgationibus misceatur, simile est senecio- γα.
ni aut rutæ: longo folio: flore candido: radi-
ce gracili, ignaua: semen gustu amaro, cæte-
ra sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur
tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quan-
tum tribus digitis capitur, additō verati al-
bi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

σισαμο- Sefamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes:
 αδις μι- folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cau-
 κρόν. liculorum cacumine capitula, florū penè pur-
 pureorum, medio corū albo: semen sesamæ,
 fuluum, amarū: radix tenuis. Detrahit bilem
 pituitasque, semen ex aqua mulsa potum di-
 midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores
 ac tubercula discutit. nascitur in asperis. Aeg.
 Sefamoides albi (aut potius parui, mendum
 enim interpretor λευκοῦ pro λεπτοῦ.) semen
 calefacit, detergit, & rumpit. Maius autem ve-
 ratri vires sequitur. Galen.

τορδυ-
 λιον.

T O R D Y L I V M, quod aliqui Creticum
 seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano mon-
 te nascitur, herbula furculosa, semine duplici
 rotundo, scutulorum effigie, odorato, suba-
 cri. Aegineta, Gordylon alii seseli appellant,
 calidum est, urinae & mensibus educendis ha-
 bile. Radix ipsius cum melle lincta, quæ in
 thorace hærent, educit.

σιςιλι-
 offic. &
 herb. sa-
 xifraga
 maior

S E S E L I Massiliense folia fœniculi habet,
 crassiora: caulem vegetiorem: umbellā ane-
 thi, in qua semen oblongum, angulosum, de-
 gustanti statim acre. radix longa est, iucundi
 odoris. Aethiopicum seseli, folia habet hede-
 ræ, minora, & ad periclymeni modum ob-
 longa. frutex nigricat: palmitibus in bina cu-
 bita extensis: ramis sesquipedalibus: capitu-
 lo anethi: semine in tritici morem denso, ni-
 gro, amaro, Massiliensū odoratiore, & acio-
 re,

re, multum suavi. Peloponnesse folia ha πυλοπον
 bet cicuta. latiora, & crassiora: caulem supra γκσιακόν
 Massiliensis magnitudinē, ferulaceum, & la-
 tum: in cacumine umbellam, in qua semen la-
 tius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem
 viribus præditum est. nascitur in asperis, ri-
 guis & collibus. inuenitur etiamnum in insu-
 lis. Aeg. Sefelis radix magisq; semen insigni-
 ter calefacit, tenuisq; substantiæ est, urinam
 quoq; ciet, comitialibus & recta ceruice spi-
 rantibus accommodatum.

SEVTLOMALACHON recens Græc. σιντλο-
 cia fecit olus, quasi dicas maluaceam be- μάλαχον
 tam (fortè quod figura & denticulato semi-
 nis habitu betam, & mollicitia malua mentu-
 retur.)

SYCOMORVM aliqui etiam sycā συκόμω-
 minum, id est, morum vocant cuius fructus ρος.
 sycomorum etiam propter inefficacem gu-
 stum appellatur. arbor est magna, fico simi-
 lis, frondosa, multo lacte abundans. foliis
 mori. pomum ter aut quater anno fert: non
 ramis, vt ficus, sed caudice ipso, caprifico nō
 dissimile: dulcius grossis, sine granis interio-
 ribus. quod nō maturescit, nisi ungue aut fer-
 ro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria,
 Rhodo, locisque non multi tritici feracibus:
 ubi prouentu sæcundo astibilique iuuamen-
 tum adfert, cum amonæ caritas premit. Gi-
 gnitur & in Cypro arbor genere distās, quæ

cum sit vlmus, prædita tamen est foliis sycomori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis. Aegin. Sycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius. Liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerū, discussoria tumorū: bibitur inungiturq; ad serpētium morsus, lienes induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

S I D E planta lacustris est in Orchomenio lacu frequēs, papaueri similis, roseo flore, vasculo mali amplitudine, cādidiis membranis obducto: semine intus rubro, gustu triticum æmulāte. Caput & folia super vndas emicāt, mox cum defloruit inclinatur in vadum, semēnque spargit. Plin. & Theo.

σιδηρί-

tis.

Herb. &
off. tetra-
hil, ou
herbe Ju
daice.

S I D E R I T I N aliqui heracleam vocant. folia habet marrubii, sed longiora, satis ad frondē quercus, aut saluiæ accedentia, minorā tamen, & aspera. caules edit quadratos, palmum sæpe excedentes, nō iniucundi gustus, aliquantūmq; substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, vt in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum, nascitur in petrosi. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

Lunaria
maior

Altera sideritis binūm cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus ē summo alarum sinu surculis, longis, te-

nuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen cōtinetur, quàm beta rotundius aliquāto, ac durius. Huius vis, foliorūque, ad vulnera, præcipua est. Sideritim aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam vocat, in maceriis & vineis nascētem, foliis coriani, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis, lævibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo, gustanti amaro & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimit. Galenus, Habet quidem & abstergēs aliquid, sed amplius humidū & mediocriter frigidum, cum adstriptione pauca, hinc inflammationib⁹ resistit, vulnera glutinat. De Achillea sideriti alibi diximus.

Mille
feuille

SIDERITIS Plinii latissimo folio in scoparia regia habetur.

SILER frutex est, qui nonnunquam arborescat, vt baculos rustici ex eo faciāt, in aquaticis nascens quasi pumila salix, cuius etiam generibus annumerari creditur. Eius folia illita fronti capitis dolores sedant. Semen tritū in oleo phthiriasis coërcet. Serpentes hunc fruticem refugiunt, baculūque ob id ex eo rustici conficiunt.

Officinæ
cōfundūt
cū seseli

SYLIBON, lata spina est, folia ferēs chamaeleonis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet. Aegineta, Succum

σὺλιβων

p ij

cum mulsâ bibendum adiicit.

ὄλνρα.
Arinca
gallis
olim

E I D E M generi siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. in panes, ut zea, cogitur. Fit quoq; è filigine crassior farina, quâ Græci crimon vocitant. Galenus, Olyra naturam inter triticum & hordeum est media, siue ut nutrimentum consideres, siue ut medicamentum.

κερατω-
νία.

S I L I Q V A E fructus arboris ceratoniae siccandi & (Galen. astringendi) refrigerandi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis particeps est. Aegineta.

σύνφυ-

τον πε-

τραϊον.

Bugle, nō
est Cōso-
lida me-
dia offici-
narum.

σύνφυ-

τον έπερον

cōsoul-

de ou cō

syre

S Y M P H Y T O N petraeon, id est, alus. nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluā ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. carnes autē cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton quod aliqui petraon vocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut sonchi inanem, circa quem breni interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. ram caulis quam folia, aspera lanugine horrēt. tactūq; pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, in-

rus candidæ, viscosæ, quarū est vsus. Carnes quoque, si concoquantur, cogunt additæ. Aegineta, Petræum contrariis cōstat viribus. habet enim aliquid quod incidat, ideoque pus in thorace & pulmonibus collectum expurget, itēque renes. Habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur. conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus rubris, intestinorum ramicibus. Item calida quædā humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat. Symphytum alterum viscosum quippiam & mordax repræsentat, scillæ simile. Vtuntur eo ad quæ superiori.

SYPHONAM, quam alij crumphenam, Fortè hæc Plinius repræsentat alternis viridibus roseisq; genesis per caulem foliis, eamque in posca sanguinē seu hebreiicientibus mederi. fia Gall.

SINAPI hortense, aliqui napi vocāt. Eli- ναπυ,
gi debet adultū, valde rufum, nō magnopere σινησι.
ficum, sed quod fractum internè virescat, & Senece
veluti quodam succo madeat, cæsum colore.
siquidem recēs id genus, tempestiuum habetur. Aeg. Cal. sic. 4. σισαρον.

SISER vulgò cognitum. Cuius radix decocta origrata est, & stomacho utilis, urinā seruille, ciet, & appetentiam inuitat. Aeg. Radix cal. ou escher 2. (aliās enim perperam legitur. 3.) uille

SISYMBRIVM, alii serpillū syluestre σιούμ
vocant, in solo inculto nascitur, méthæ hor. βριον

offic. na- tensis similitudine, odoratus, latiore folio.
 sturcium Inscritur coronis. Alterum sifymbrii genus,
 aquaticū quod aliqui cardaminam, alii sion appellāt,
 vulg. cres ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis qui-
 son. bus sion prouenit. quæ ideo nonnullis carda-
 mina nominatur, quòd gustu cardamum, id
 est, nasturtium repræsentet. folia primum
 rotunda prodeunt. adulta crucæ modo fin-
 duntur. Galenus, Sifymbrium est subtile, dis-
 cutit, calefacit, siccatur 3. semen eius tenue cali-
 dūque est, vnde cum vino ad singultus &
 tormina exhibetur. Cardamina vero arida
 calefacit siccatur tertio. Viridis calefacit siccatur
 secundo.

σιων. s i s o n exiguum semen est, in Syria na-
 Menthe tum, apio simile, nigrum, feruens, oblon-
 aquaticū gum, quo in condimentis, cum cucurbita,
 outhym- & aceto, indigenæ vruntur. in cacumine gra-
 bree ou nula multa gerit. Aegineta, Sinon calidus &
 balsami subamarus est, vrinam mouet, concoctio-
 ta. nem adiuuat, menses educit, & viscera ob-
 structa aperit.

σιμλαξ. s i v m, quære Lauer.
 s m i l a x à Græcis, taxus à Latinis
 appellatur, arbor abietis magnitudine, & fo-
 liorum eiusdem figura, in Italia & Narbo-
 nensi Gallia Hispaniæ contermina nascens.
 Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant,
 denigrantur: & qui ederint easdem homines,

alui profluuiis corripuntur. Narbone tam
præsentis est veneni, ut si qui dormiant sub
ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur,
& sæpenumero moriantur. quare de taxo
hæc traduntur, ut ab ea caueamus. Aeginc-
ta, Smilax, vel cactus arbor est vitosæ virtu-
tis. (Sed pro κακὸς malim legere τᾶφος.)

σμίλαξ

κηραιός

Hortensis S M I L A X, frutex, cuius se-
men à nonnullis lobia vocatur. folia habet
hederæ, molliora tamen: tenues caules, &
capreolos vicinis fruticibus circumuolutos:
qui tantum adolescunt, ut topiarias scenas
repræsentare videantur. siliquas scænigræci
profert, longiores & torosiores. in quibus se-
mina renum similia, sed inæquali colore re-
cluduntur: quæ quadam ex parte fuluescunt.
Siliqua cocta, cū semine in oleribus, aspara-
gi modo, estur. urinā ciet, & tumultuosa so-
mnia facit. Vide plura in Phaselis.

σμίλαξ

πρᾶξις

S M I L A X aspera, folia habet peri-
clymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi mo-
do, aut paliuri aculeata. arbores scandit ab
imo ad summa perreptans, se conuoluens
eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescunt,
gustumque leniter mordent. nascitur in palu-
stribus & asperis: radice dura, crassaque.

σμίλαξ

λεῖα.

Læuis S M I L A C I S folia hederæ similitu-
dinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. hu-
ius sarmenta nullis horrent spinis. conuolui.

tur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur. folia per autumnum decidua. Aegin Milax tam lævis quàm aspera, arbores amplexa, calidam acrimque facultatem possidet.

σμύλα

vioy.

Leuechia
ou liuef-
che

S M Y R N I V N, quod in Cilicia petroselinū vocāt, passim in Amano monte gignitur. caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languesciente. capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. semine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus atque squallidis, & limitibus terrenis. Aegineta, Quidam hipposelinum, quidam apium sylvestre nominant. Cal. sic. 3. apio duntaxat fortius, petroselino inualidius. vrinæ & mensibus educendis accommodatum.

σολαν

κκτ᾽ιγ.

Morelle

folatrum

Hortense S O L A N V M, frutex cibus idoneus, exilis, pusillius, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem

nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Aeg. Astringit, & frige facit secundo.

Est & aliud SOLANVM, quod peculiaz nomine halicacabon, id est, vesicariā, aut physalida vocāt, foliis antedicto latioribus. cuius caules, posteaquam adoleuerunt, pro na terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, vesiculis simili, rotundo, laeui. quo coronarii vtuntur, & corollas faciunt. Vim vsumq; hertenſis solani habet: verū cibis nequaquam expetitur. Aegineta, Vrinæ ciendæ idoneum fructum habet, acino vix æqualem.

SOLANVM manicon, aliqui perſion, alii thryon appellauere. huic folium eruce simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adoleſcentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ, hirsutius, verum maius, latiúsq; florem nigrum. postquam eo exiit, racemus exit rotundius, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vix mollibus. radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus vento perflatis, & plantanetis. Aegineta, Intus assumptū inutile est: à foris illitum vlcera depascentia curat. Frig. sic. 2.

SOLANVM somniferum, aliqui etiam

σύνχνος
ἁλικάκ-
καβος.
offic. alca-
quengi.
rur. cocre-
tum.

σύνχνος
μανικός.
offic. sola-
trū. mo-
telle.

σύνχνος
ὑπνωτι-
κός.

her. & of. halicacabon appellât, fruticat multis ramis,
solatrum densis, caudicosis, fractu contumacibus, pin-
dormito. guium foliorum, cotoneæq; mali similium
riū ouma plenis: flore grandi rubro: fructu in follicu-
rinum. lis crocato: radice longa, subrubro cortice ve-
stita. nascitur in saxis, non procul à mari. Aeg-
gineta, Radicis cortex cū vino denarii pon-
dere potus, somnum conciliat. Semen vrinā
mouet, frig. 3. Vnde corymbi ei⁹ plures duo-
decim epoti, furorem accersunt.

σόμφορ. S O M P H V S cucurbitæ genus sylvestris
est, cui nomen, quia sit inanis, digitali crassi-
tudine, non nisi in saxosis nascens.

σόνχος. S O N C H I duo genera. sylvestrior qui-
dā est, & magis spinis horret: alter teneritate
Lacterōs aliis pa- quadam mollescit, cibis expetitus, angulo-
lais au lie so caule, inani, interdū rubente: foliis in am-
ure. nō ē bitu per interualla dissectis. Alter sonchus
hec scari- tenerior, arboris instar, latis constans foliis.
ola offici- caulē in ramos exeūtem folia distinguunt, sed
narum. ad eadem pollet. Aegineta, Astringit & ma-
nifestè refrigerat, tum corpori admotus, tū
manducatus: exarefactus autem mediocri-
ter calefacit.

δῶρ. S O R B A colorem luteum referentia pri-
Sorbe ou us quàm maturescant, dissecta & sole siccata
corne. manduntur, vt aluum fistant. eadem est fun-
ctio molitorum farinæ, si polentę loco suma-
tur. quod & decoctū eorum in potu præstat.
Aegineta, Sorbus arbor, cuius fructus oa, à

nonnullis $\delta\upsilon\alpha$ dicitur, adstringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

SPANACIAM olus recentiores Græci $\sigma\pi\alpha\nu\alpha\kappa\iota\alpha$.
dixerunt, ut putant nonnulli ab oleris raritate: vel ab aliis (ut est simile vert) nationibus Spinage.
emendicato spinaceo nomine.

SPARGANION, aliqui xiphidion vocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\alpha\nu\iota\omicron\nu$.
Contra serpentis venena, radix cum vino datur. Aegineta. Vim habet exiccantem. off. spatula foetida

SPARTION frutex est, longas ferens $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\iota\omicron\nu$
virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florē, ut albæ violæ, luteum. Aeg. Sparti & semen & flos cum mulsâ instar quinq; obolorum pota, per superiora purgant veratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

SPHONDYLIVM folia quadam tenus $\sigma\phi\omicron\nu\delta\upsilon\lambda\iota\omicron\nu$.
platani & panacis habet. caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, Panaiæ
fœseli simile, sed latius, cãdidius, & magis paleaceū, grauis odoris. flores eius albi, aut pallescentes: radice raphani, candida. nascitur in palustribus & aquosis. Aegineta, Fructus eius sauluage.

& radix virtute acri & incisoria suspiriosis, comitialibus, & arquatibus succurrunt. Radix autem circumrasa, fistulisque imposita, illarum callos tollit. Succus è flore ipsius expressus antiquis aurium vlceribus instillatur.

SPINA acuta, vide Acuta spina.

ἄκανθα
λευκή.

SPINA alba nascitur in montibus & syluosis, folia fert albi chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicū, sed rotundius. Aeg. Eius radix siccatur, & modicè astringit, eoque & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit. Semen tenue calidūque est, hinc conuulsioni quoque medetur.

ἄκανθα
ἄραβική.

Arabicam SPINAM natura albæ spinę similem esse cōstat. ipsa siquidem stringit ad sanguinis reiectiones, mēsum abundantia, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet.

στάχυν.

Mōtana
& mollis

salua herba. nauicula, oucorona-
ria herba

Prouenit in asperis. Aeg. Aegyptia vel Arabica spina astringit, siccaturque impense, vnde sanguinem, & alias defluxiones retinet.

STACHYS frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio can-

didiores. nascitur in mōtibus & asperis. Vim
habet ex calfaetoria & acré. foliorum deco-
ctum potu pellit menstrua & secundas. Aeg.
Cal. 3. menses excitat, interimit foetus, secun-
das pellit.

STAPHYLODENDROS arbor trans σταφυλό-
δενδρον
alpes simillima aceri, alba in materia, fert si-
liquas, & in iis nucleos sapore nucis auella-
næ. Plinius. (Sunt qui eandem Theophrasti
colyceam interpretantur.)

STAPHIS agria, siue herba pedicularis, σταφίς ἀ-
γρία.
folia habet labruscæ diuisa: & cauliculos re-
ctos, molles nigrōsque. fert florem glasti: & offic. sta-
folliculos virides, similes ciceri, & in his nu- phis a-
cleum triangulum, scabrum, ex nigro subful- gria.
uescentem, intus album, gustu acrem. Aegi-
neta, Acris adeo est vt pituitam per os edu-
cat, & vehementer abstergat.

STYRAX lachryma est arboris malo co σύνταξ.
toneæ similis. Præfertur sordescēs, flauus, resi offic. sto-
nosus, albicatibus grumis, quàm plurimum rax & Ca
in sua odoris gratia permanens. qui dū mol lamītha.
latur, melleum liquorem reddit, qualis ē Ca-
thaballis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Dete-
rior niger, surculosus, friabilis, canóque situ
obductus. Cæterū lachryma inuenitur gum-
miū similitudine, perlucida, & myrrhæ emu-
la. verum per pauca manat. Adulteratur ligni
scoe, quam vermiculi erodentes excusserūt,
melle, & iridis sedimēto, & quibusdam aliis.

Alii ceram aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, venundantq;. Styracem hunc, quoniam in vermiculorum specie contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Aeg. Styrax calefacit, emollit, & cōcoquit. Tussi, destillationi in nares, & grauedini utilis. Menses idem potus appositusve trahit.

στοιβή

Non est
vulg. sca-
biofa.

STOEBAE semen & folia sic. 3. ordine, principio viribus donata astrictoris, camq; ob causam vulnera magna conglutināt. Decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

στοιχάς.

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, vnde cognomētum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, lōgiore folio, subamara gustu, & aliquantū acris. Aeg. Aperit, extenuat, detergit, & confirmat viscera omnia, totūmq; corporis habitum.

στρατιώτης
cumī, ou

aneth fau-
uage, ali-
is asini-
nusdauc⁹

STRATIOTES millefolium exiguum frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. foliis auicularū pennas imitantibus, bre-

ui admodum dissectoque foliorum exortu. folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximii vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentè sanguinem, & fistulas. Aeg. Astringit, vlcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones, & ad fistulas vtuntur.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdē *στρατιώτης* supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Aegineta: Humidus & frigidus est natura.

STRUTHIVM in Radicula quære.

T

AXVM arborem habes in simile descriptam.

T

TELEPHIVM herba portulacæ *τηλεφίον* similis & caule & foliis, habēs gemina tuber vineatica cula, à singulis radicum geniculis enascētia, sc̄puiua, à quibus rami seni septē mve fruticant, à radice referti cœruleis foliis, crassis, lentis, carnosiss: flore luteo, aut cādido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites. Tempore verno folia senis horis illita albam vitiliginem faciunt: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiā in sole vitiliginis. *vineatica cicotri- nū, faba inuersa, crassula minor, aliis re- prinse.*

nem tollunt. sed vbi inaruerunt, absterguntur. Aeg. Cal. 1. sic. 2. Est itidem absterforiū, quapropter vlcibus putredinem expertis conuenit: & vitiliginēs, tum leucas, tum alphas cum aceto abolet.

τέρμινθος.

TEREBINTHVS cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Aegineta, Cal. 2. viridis sic. 1. aridus sic. 2. fructus vbi inaruerit sic. 3. hac igitur ratione & vrinam mouet, & lienes adiuuat.

TESTICVLVM herbam in Orchi quære.

τένκριον
Nō est q̃
vul. Tun
sa faba.

TEVCRION, siue vt aliis placet, teucris, herba est virgæ referens effigiem, trifaginis similitudine. tenui folio, non multum à cicer alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissadémq; vbertim prouenit. Aegineta, Cal. facit 2. siccatur 3. Vi incisoria tenuique lienis medetur.

θαλίτρον
Argentine

THALIETRON folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricē perducunt. Nascitur maximè in cāpestribus. Aeg. Siccandi vim sine rosione habet. hinc vlcera inueterata cicatrice obducit.

θαψία.

THAPSIA nomen ideo accepit, quod in Tapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. tota verò natura ferulæ similis est: gra-

est: graciliore caule: foliis fœniculi: umbella
 anethi in cacumine, à singulis surculis erūpē
 te, flore luteo. semē quale ferulæ, latū, sed ali-
 quāto minus. radix foris nigra, intus cādida,
 longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis ex-
 trahēdi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe
 cortices inciduntur: aut radix in fornicis spe-
 ciē in se excauata, cooperitur, quo merus suc-
 cus confluat. oportet illuc sequenti die se con-
 ferre, & congestum succum extrahere. Tun-
 ditur etiam radix in pila, & succus organo
 per quallū expressus fictili crasso insolatur.
 Aliqui folium vnā terunt: sed inualidior hu-
 iusmodi succus. Hoc autem interest, quo-
 niam qui ab radice manauit, grauius olet, &
 humidus permanet: è foliis autem extractus,
 exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit.
 Qui succū colligit, stare debet non obuersus
 vēto, aut potius cū dies apricus est, & à flatu
 filet: quoniam ob halitus acrimoniam facies
 vehementer intumescit, nudāq; corpora in-
 uadunt pustulæ: ob id prius liquido cera-
 to & astringente, nudas partes illinunt, & ita
 muniti accedūt. Aegineta: Tapsia acris est,
 & valenter cum humiditate calefacit: ex al-
 to igitur trahit insigniter, attractūque dis-
 cutit.

THE RIONARCA inde nomen inue-
 nit, quod serpentibus torporem inferat. fru-
 tex est foliis subherbaceis, roseo flore. Ser-
βυγιοναργη
κη.

pentes necat cuicunque admota fuerit.

θυμελαία
oliuella,
leo terrq,
oulin sau
uage.

T H Y M E L A E A est, qua granum gnidiū, quod est semen ipsius, colligitur. hoc Syri apolinum vocāt, quoniā satini lini frutex suapte natura, similitudinem referat. virgas edit perpulchras, multas, tenues, trepidancas: foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Aegineta: Thymelæa, vnde granum gnidium fit, similes ei vires obtinet. Habet autem granum id acrem & adurentem facultatem, aluum cum aqua potum purgat.

θύμος.
Thyn.

T H Y M V M ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus foliis, multis & angustis circūdatus capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso provenit. Aeg. Calefacit, siccatur. 3. Glutinosos crassosq; humores incidit.

θλάσπι.

Seneuc
sauuage
herb. na-
sturtiū te-
storū.

T H L A S P I, herbula angustis foliis, digi- tali lōgitudine, in terrā versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binūm dodrantū canliculo, tenui, non sine adnascētibus ramis. fructu circa ipsum totū, ab extremo in latius sa-

pandente: semine nasturtii incluso, lenticule
 vasis effigie, nisi quod infringitur, unde no-
 men accepit. flos albicat. Nascitur in semi-
 tis, & sepibus fossisque. Alterum thlaspi **Nō ē hęc**
 tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi **bursa pa-**
 vocant, latis foliis, radicibus magnis. utile **storis.**
 ischiadicorū infusioni. Aegineta: Thlaspi se-
 men est viribus acre, intestinos abscessus po-
 tu rumpit, menses prouocat. ab inferioribus
 partibus iniectū, coxarum dolores finit, cruē-
 ta vacuat. suprā infrāq; biliosa, instar aceta-
 buli potum, expurgat.

THVS in ea gignitur Arabia, quæ thu- **λίβανος**
 rifea cognominatur. Primatum tenet in eo **τός.**
 genere masculum, stagonias appellatum, su- **Encent.**
 apte natura rotundum. Tale autem indivi-
 dum est, candidū cum frangitur, intus pin-
 gue, in suffitu statim ardens. Indicū verò ful-
 uescit, & colore liuet, sed rotūdum industria
 facit. nā in quadrangulares formas disse-
 ctum fictilibus versant, donec rotunditatem
 contrahit. verum huiusmodi thus tempore
 flauescit, quod atomum aut syagrum appel-
 lant. Secundum locum habet Arabicum, &
 in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vo-
 cant, minus multò & fuluius. Est & genus a-
 liud, cui ammitæ cognomen est, alioqui can-
 didū: quod dum mollitur, mastiches more di-
 gitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina
 & gummi. quod facile deprehendi potest.

siquidem suffitum gummi flammam nō eiaculatur, & resina in fumum evanescit, thus verò statim ardet. idem maleficium odor prodiit.

λιβανω-
του
φλοιός.

Præfertur *THURIS* cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lævis, minime scaber, sine mēbranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eruāt. thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur.

μάννα λε-
βάρον.

MANNA thuris probatur candore micarum frequētia, & puritate. Vim habet eandē quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquē suffitu aëriū vaporē, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistū suaueolentiæ halitus virus habet. Aegineta, Lachryma thuris calfacit secundo sic. 1. Habet & modicam quandam vim leuiter astringentem. Cortex ipsius manifestò astringit, & siccatur 2. absolutè, crassior thure & minus acris: hinc sanguinē spuētibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tū intro assumptus salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccatur 3. atque nonnihil extergit: quocirca oculorum vlcera & purgat & explet.

TILIA Græcis philura dicitur, folio hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lentè crispo atque serrato, flore tantisper dum calyculo continetur herbaceo, ubi emersi flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semen prætenue quantum atriplicis, omnibus animalibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducatur, eorumq; mira dulcedine, quæ in cortice intelligitur. Materies maris dura, nodosa, odorati- or. (Theophrasto tamen sceminae odorati- or.) ruffior, cortex quoque crassior, ac detra- ctus inflexibilis, nec semen fert aut florem ut scemina. Tilia vertit folium confecti sideris signum. Multi corticem commanducatū vul- neribus putant vtilissimum: folia trita asper- sa pedum tumori. Humor è medulla castrate arboris effluens capillum reddit capiti illitus, defluentemque continet.

TYPHA foliū edit cyperidi simile: cau- lem album, læuem, æquabilem: florem in ca- cumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbæ flos, suillo adipe eloto exce- ptus, ambustis medetur. Gignitur in palustri- bus & aquis stagnantibus. Galenus & Aegi- neta non meminerunt.

TYPHA vel tipha cerealis specie filigi- ni non dissimilis, simplici culmo assurgens,

q iii

φιλύρα.
Tilet, Ti
leul, teil.

τύφη, vel
τίφη.
Masses.

τύφη σι-
τώδης.

grano multiplici, tunica velato atq; leuissimmo, radice numerosa, tritico perquam similis traditur, & in id quoq; mutari si pista scaturatur, nec protinus, sed anno tertio.

τιθύμαλοι.

Esurge.

Reucille
matin.

χαρχίας

μυρσινο
τρεδής

παράλιος

ΤΙΤΗΥΜΑΛΙ genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides. Alter myrtites, qui foemina existimatur, cumque myrsiniten, aut caryiten vocant. Tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt. Alius, helioscopius. Quintus, cyparissias. Sextus, dendroides. Septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: foliis olivae circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa. pender in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueolae foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis & montibus. Foemina, quam myrsiniten, aut caryiten vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantaes. fructum fert alternis annis nuci similem, mordaci gustu. nascitur in asperis. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quem tithymalida, aut meconia aliqui appellauere. nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque sive à radice exeuntibus: foliis lini, angustis,

paruis, oblongis, in versus quosdam dige-
stis: capite in cacumine orbiculato, in quo
semen, ut eruum, vario colore emicat. Flos
albus. Frutex totus cum radice lacteo succo
surget. similes ad usus reconditur. Heliosco. ἡλίουσκο-
pius dicitur, foliis potulacæ, tenuioribus, ro-
tundioribusque: ramulis, prodeuntibus à ra-
dice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodran-
tali altitudine, tenuibus, lactis copiosi ple-
nis: capite anethi: semine velut in capitulis
incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniam
comas cum sole circumagat. circa oppida na-
scitur, potissimum in ruderibus. Colligitur
succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ su-
perioribus vires, non tamen usque adeo validæ.

Cyparissias in caulem exit dodrantalem, κυπαρισ-
sias vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ
similitudine exoriuntur, molliora tamen, &
tenuiora: & in totum nascentē piceam æmu-
latur, unde nomen traxit. candido succo ma-
det, cui eadem vis quæ superioribus.

In petris nascens, dendroides cognomi-
natur, ampliter opacat. in cacumine fródosam
spargens comam, succo lacteo pregnans, can-
ticulis rubentibus: foliis myrti tenuioris: fru-
ctu characiæ. Eiusdem effectus, cuius supe-
riores, similique modo reconditur.

Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, πλατύ-
succus & folia per inferna trahunt aquas. Pi-
sces necat, iusus, & aquæ inspersus. Reli-
q. iiii

qua tithymalorum genera quę suprà scribuntur, idem efficiunt. Aegineta, Tithymali omnes cal. 4. acrimonię, & validę amaritudinis participes, sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentiũ erosorum dolores finit. Liquores vehemētiore donati virtute dentium cauis imponuntur, reliquũ corpus si attingant, adurunt. Quare etiã pilos modicę delitos auferunt, item myrmecias, verrucas, & huius generis alia. Cutis labe abstergunt, maligna vlcera phagedenica curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt appellati, characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur. hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

τραγά-
κάνθα.

TRAGACANTHAE radix latã & lignosa, summo cespite nititur, vnde furculos humiles, robustos, latissimę fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquã tenuia exoriuntur, quę sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma quę vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera & subdulcis. Aegineta, Tragacantha per similes gummi representat.

τραγίον.

TRAGIVM nascitur in creta tantum insula, lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus. succus ei lacteus,

gummi non dissimilis. Est & alterū tragiū, Bursa pa-
quod tragoceros aliqui vocant, folia scolopendrii habet, & radicem sylvestris rapha-
ni, tenuem, candidam. Aeg. Tragiū cal. 3. at-
trahit, discutit, cum tenui substantia. Aculos
igitur educit, calculos comminuit, mensesq;
citāt instar denarii potum. Sed alterū tragiū
hoc minus (lego enim non *πικρότρον*, sed
μικρότρον, ē Galeno) scolopendrio assimi-
le, nascitur multis in locis, tanta astringendi
virtute praeitū, vt fluidis affectibus commo-
dē faciat.

TRAGOPOGON, id est, hirci barbula.
Nascitur in aruis sua sponte. Radice longa,
dulci, folio croci, longiore, caule paruo, super
quem calyx latus, & barbula quae summo ver-
tice incana & proluxa funditur, vnde nomen
accepit. Herba edendo est, flore luteo. (Quae
vero altilis in hortis crescit, folio est latiuscu-
lo, flore purpureo. Radices in altū agit, quae
hybernis diebus acetaria dulcedine sua com-
mendant.) (Apud Galenum ladanum quo-
que *ἀπὸ τραγοπόγων* vocatur, quia colligitur
ab hircorum barbis.) Quantum hirci barbu-
la à senili distet, ex eius in gerontopogone
descriptione colligitur.) Aegineta non recē-
suit. (Est etiam superius descripta in hirci bar-
bula.)

*τραγοπό-
γων.
Herbape-
tra.*

TRAGORIGANYM tenuis frutex est, Mastichi
sylvestri serpillio aut origano similis, folio & na.

*τραγορί-
γανον.*

ramulis. quibusdam in locis lætius virentiús-
que inuenitur, & latioribus foliis, satis glutin-
osum, alterum exilibus surculis, ac tenuibus
foliis, quod aliqui prasium vocauere. Opti-
mum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneū,
& in Chio Cooque proueniens. Aegineta,
Origani virtutes habet, & nonnullam etiam
astringentem.

τράγος
τῶν δ' ἡς.

T R A G O S quandam halicæ frugis figurā
gerit multo minus quàm zea nutrit, q̃ multū
aceris habeat. quare ægrius cōficitur, aluūm-
que magis emollit.

τράγος.
Herb. iū-
cus mari-
nus

Est etiam herba **T R A G O S**, quam aliqui
scorpion aut traganon vocāt, maximè in ma-
ritimis nascēs, palmum alta, aut amplior, fru-
ticosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis
circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudi-
ne tritici acuto cacumine, gustu multū astringe-
nte. (Confer hāc ad scorpium siue nepam
Plinii, suprā nobis commemoratam, & ean-
dem existimabis.)

τρίβολος.
Chaulce
treppou
calcetrep
pe.

T R I B V L I genus vnum terrestre, foliis
ad effigiem portulacæ, tenuioribus viticulis,
in terra stratis. spinis secundum folia rigidis,
præduris. iuxta amnes & rudera nascitur.

Trenfle,
ou cha-
staignes
aquati-
ques.

Est & alterum genus, aquis familiare, quod
in fluminibus natum comam exerit, aculeos
condens: foliis latis, & pediculo longo. caule
parte summa quàm ima crassiori. capillamē-
ta quædam indidem exorta spicantur. semen

durum, ab altero non abhorrēs. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos sagināt, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt. Aeg. Aquaticus mediocriter refrigerat: terrestris autem siccando valentior est, alter etiam humectat leniter. Vterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus cōuenit. Terrestris fructus cum tenuis existat renum calculos conterit. Trichomanes, in fidicula descriptum est.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon, alii *τριφυλλον* oxy triphyllon, alii menyantes, alii asphal. *λόν*. *Trenfle.* *herb. tri-* *foliū aci-* *dū. vulg.* *pain de* *cucule* *offi. alle-* *luja* *tion* vocant. frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras, vnde ramulares enascuntur appendiculae, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia. iis recenter enatis rutæ odor inest. vbi autem adoluerūt, bitumen olent. florē adit purpureum, semen quadam tenuis latū, subhirsutū, ex altera extremitate exertum, antennę modo corniculū gerēs. radix tenuis, longa, valida. Gal. Trifolium, asphaltiū & oxytriphyllon appellatur, ob res quas ei contigisse apparet. Menyāthes autem & cnicion haud scio vnde. Vis eius est calida & sicca instar bituminis, cuius odorem imitatur. Vtrūq; vero præstat abscessu tertio, ideóq; laterum ex obstructione dolores potu iuuat, vrinas ac menses ducit.

τριπό-
λιον.
Curbīt

TRIPOLIVM in marinis nascitur lo-
cis, quæ allidit vnda, recedensq; dimittit, ne-
que in mari, neque in sicco: folio glasti cras-
sior: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius
vt tradunt, flores colorem ter die mutāt, ma-
ne cādidi, meridie purpurei, sero punicei cō-
spiciūtur. radice alba, odorata, calidi gustus.
Aeg. Radix eius cal. 3. acris est.

χαμαί-
δρυσ.
Chesnet-
te & serra-
tula ou-
german-
dree

CHAMAEDRYS Græcis, aliis chama-
drops, Latinis trifago dicitur. sunt qui eam
teucrion appellauere, propter eam quā cum
teucrion seruat similitudinem. Nascitur in pe-
trosis & asperis. frutex dodrantalis, folia ha-
bens exigua, amara, effigie & diuisura quer-
cus: flore paruo, penē purpureo. Carpitur se-
mine prægnans. Aeg. Cal. sic. 3. Lienes igitur
consumit, vrinas & menstrua elicit, viscerum
obstructiones expurgat.

πυρήν.

TRITICVM cal. i. medium inter sic. &
humid. nonnihil etiā glutinosum & obstru-
endi efficax obtinet. Elixum coctū difficile
est, & inflationes creat: concoctum tamē ali-
mentum præbet valentissimum. in panē au-
tem coactū, minus inflat, minúsque agrè con-
coquitur, vtpote fermenti & salis particeps.

TVBERA rotundæ radices sunt, sine cau-
le, sine foliis flauescetes. vere fodiuntur. cru-
da & cocta eduntur. Aegineta, Terrestris con-
stant substantia cum modica quadam virtu-
te tenui.

T V S S I L A G I N I folia sunt maiuscula *θηχιον.*
quàm hederæ, sex aut septem à radice, subal offic. &
bida à terra, supernè virentia, in plures angu herb. vn̄
los exeuntia: caulis palmū altus, flos luteus. gula ca
in vere, flore & caule cōfestim exuitur. inde ballina,
nonnulli his vacare existimauerūt. radix te- & vulg.
nuis est & superuacua. nascitur in amœnis & pata equi
riguis. Aegin. Iuuat tusses suffitu, & recta cer- na.
uice spirantes. Constat ex calida aquosaque
substantia.

V

V **E N E R I S** pecten herba repræ- off. herb.
sentatur radice candida, colicu rura, ra-
lis semipedē altis, aut paulo ma stellū ou
ioribus, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flo falcetum
re albo, exili, depēdentibus summatim com-
pluribus rostellis, in mucronem turbinatis,
& pectinatim inter se disiunctis, inde nomē.
Radix cum malua tusa, omnia corpori infi-
xa extrahit.

H E L L E B O R V M album, Latini vera. *ἡλίβο-*
trum album vocāt, fert folia plantaginis aut *ρος λι-*
betę syluestris similia, sed breuiora, & nigri- *κός.*
ora, rubescētia: caulem cauum, quadrantalē, verart ou
tunicis conuolutum cum atrescere cœpit. radi ellebore
cibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & blane.
exiguo capite exeuntibus, ceparum modo
fibratis. nascitur in montibus & asperis. radi-
ces messibus colligendæ. Optimum habetur

candidum, friabile, carnosum, modicè exten-
tum, nec tamen iunci modo mucronatum,
quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem
habet medullam, gustu non admodum fer-
uens, neq; saluam subinde ciēs. huiusmodi
autem strangulat. primatum Cyrenaicum te-
net. Galaticum autem & Cappadociciū, can-
didiora & puluere quodā ob sita, celerius strā-
gulatus mouent.

ἑλλεβο-
ρος μέλας
Allebore
noir

HELLEBORVM nigrum, appellatur
melampodion, quoniam caprarum pastor,
nomine Melampus, furentes in se Prætidās,
primus purgasse & sanasse fertur. folia ei viri-
dia, platani similia, minora, foliis sphondylii
proxima, subaspera, nigriora, pluribus diui-
suris incisa: caulis asper: flores purpurei, can-
didi, racematim cohærentes: semen cnici,
quod in Anticyra fefamoides vocāt: quo de-
iectiones moliuntur. radicibus coheret nigris,
tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis.
quarum est vsus. in collibus, asperis, & sitien-
tibus locis enascitur. Optimum est quod ex
huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Ni-
grum inibi probatissimū gignitur. Eligi de-
bet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit
medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi
est in Helicone, Parnaso, & Actolia natum.
attamen Heliconium præcellit. Aegin. Vera-
trum vtrunque cal. sic. 3. item acre est abster-
sorium, vnde etiam ad leprosa cutis vitia cō-

uenit. Nigrū vero si fistulis inferatur, tribus diebus callum exierit.

VERBASCUM differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud albū. in quo mas & foemina intelligitur. Foeminæ igitur folia sunt brassicæ pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior: subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallefcētes: semen nigrū radix lōga, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in cāpestribus. Verbasum, qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latiorēq; cōstaret folio. Sylvestre, folia fert saluq; altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos quales marrubiū: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirsutæ, rotundis foliis humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab aliis autem thryallis, foliis ternis aut quaternis, vel paulò pluribus, asperis, crassis, pinguibsq;: apta ad lucernarum lumina. Arg. Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta thryallis. Cæterum folia omnium siccātem & mediocriter astringentiam vim referunt, præcipuè eius quod aurei coloris est, & acerbū: fluidis conferunt affectibus. nonnulli & dentes eis colluunt.

VERBENACA. vide Peristercon.

VERBENACAE genus alterum. vide Særa herba.

φλόμος?
Boulion
off. taxus
barbatus

VIBURNI mentionem fecit Virgilius,
quantum lenta solent inter viburna cu-
pressi.

VIOLA flaminea in Scopa regia con-
tingitur.

ῥοσμύλαν VIOLA purpurea foliū habet hedera mi-
Violette nus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile.
de mars cauliculus à radice medius prodit, in quo flo-
sculus, suauiter olens, purpureus. opacis & a-
speris nascitur. Aeg. Violæ folia aquea frigi-
dâque substantia præpollenti constant.

ἰξός. VISCVM optimum est recens, intus por-
Du gluy raceum, extrâ fuluum, quod asperi nihil, aut
furfurosi conceperit. Fit acinis in robore na-
scentibus, buxco fruticis folio. contusum aci-
num lauant, & postea in aqua decoquūt. sunt
qui commanducando ipsum efficiant. gigni-
tur quoque in malo, pyro & plerisq; aliis ar-
boribus, quin etiam inuenitur in quorūdam
fruticum radicibus. Aegineta. Calefacit cum
acrimonia, humores ex alto validè elicit, &
thapsiæ modo discutit, hac tamen multo est
ignauius.

ἄγνος. VITEX, siue lygos, frutex est in arborē
Herb. assurgēs, nascitur in fluminum ripis, asperis-
agnus ca que locis, ac torrentium alueis. ramos gerit
stus. prælongos, fractu peruiaces: folia oliuæ, sed
molliora. Duo genera eius. vna harū album
floremit, cum purpureo: altera tantum
purpureum, & semen, vt piper. Aegin. Agnus

calefacit, siccatur tertio. Substantia tenuis est, eoque flatus abolet. Ad castitatem conservandam conferre creditur, non modò commenducatus potiusque, verumetiã in cubile substratus. Semen ipsius iecori lienique obstructis succurrit. Fructus vitex minus inflat, & facile digeritur.

VITEM albam aliqui bryoniam vocant. ἀμπέλως. Folis, viticulis, pampinisque, sativam vitem λευκή. imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. ea quos offic. & prope se nata sit frutices, suis claviculis comprehenditur. fructus rubes in vna dependet, quoniam & viticoria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prius alba. ma germinatione exeunt, decocti in cibo, alvulgo uum & urinam ciunt. Succus è radice vere excoaleu- primitur. Aegin. Appellat & psilothium. ger urec. mina sanè ceu stomacho grata eduntur, vrinæque ciendæ sunt. radix abstergit, tenuis naturæ, mediocriter calida, unde fit vitientes etiam potu consumat, extrinsecus autem cum ficis illita scabiei & lepræ medetur.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam ἀμπέλως. vocant, folia fert hederæ, sed maiora, simi- μέλαινα. ceis proxima: caules etiam cognatos. capreo- Tamarū lis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit. fructus racematim coheret, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt. radix foris nigra, intus buxo colore nitet. viticulae, quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur. Aegin. Hæc etiam

bryonia appellatur: superiori consimilis est, sed inefficacior.

ἄμπιλος V I T I S sylvestris sarmenta vitis modo
ἀγρία. prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cor-
Vigne tice, foliis hortensis solani, longioribus ac la-
sauuage tioribus: muscoso flore, & capillaceo, fructu
viorneou exiguis vuis simili, post maturitatem rubēte.
hardie rotunda est acinorum facies. Enascētes viti-
culæ cibi gratia sale cōdiuntur.

ἄμπιλος V I T I S sativæ facultas respondet sylue-
stri, sed imbecillior est.

πτελία. V L M V S siccare valet, & abstergere, vul-
Orme. nera glutinare: præcipuè cortex, si recens fa-
sciolæ modò vulneribus circūdetur: idem cū
aceto lepras tollit. Ossa fracta radicum deco-
cto perfusa, solidantur.

κοτυλη. C O T Y L E D O N, siue umbilicus Veneris
δών. folio est in acetabuli formā tornato, ineui-
offi. Vm. denter cōcauo, breui in medio cauliculo, in
bilicus quo semen inest: radice oliuæ modo rotūda.

veneris Est & alterum genus eiusdem, cymbalion
κοτυλη. aliqui vocant, pinguibus foliis, latioribus, li-
δώνιτι- gularum modo densis, circa radicem mediū
ρα. oculi ambitū describētibus vt in maiore sem-
peruiuo, astringentis gustus. cauliculo tenui,
in quo flores & semina hyperici: radice ma-
iuscula. Facit eadem quæ semperuiuum. Aeg.
Refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat. fo-
lia ipsius cum radice commāducata calculos
comminuere, & vrinam ciere creduntur.

Duo VRTICAE genera. sylvestris, aspe- ἄκαλήφα
rior, latioribus nigrioribusque foliis: semine Vrtic
lini, sed minore. altera non æquè aspera, mi-
nuto semine. Aeg. Vrticæ & fructus & folia
tenuem habet substantiam, citràque rosionē
ficcant, tumores discutiunt, abstergunt, ven-
trem subducunt, mediocriter flatulenta, qua-
re etiam ad Venerem incitant. (Aeg.

V V A passa cōcoquit, astringit. leuiter dis- ἀσαφίς.
cutit.

X

ANTHIUM nascitur læto & pin Herb. lap
X gui solo & lacubus exiccatis, cau- pa minor
le cubitali, anguloso, pingui, pro- aut inuer
deūtibz ex eo crebris alis. folia atriplicis ha- sa.
bet, insecta, nasturtium odore imitantia: fru-
ctum grandis oliuæ modo, rotundum, & vt
platani pilula, spinosum, qui contactu vesti-
bus adhærescit. Aeg. Xanthiū, phasganiūm- ξάνθιον
ve fructum fert discutientem.

XYLON, quem aliqui gossipion nomi-
nāt, frutex est exiguus, laniger, palmæ folio, ξύλον
similem barbatae nuci gignens fructū, cuius cottonū
in exteriori bombyce lanugo netur in linum ou cotton
candidissimū mollissimūmq;. Gignitur & in
quadam arbore, cuius folia ni maiora essent,
vitium planè poterāt videri, cucurbitis coto-
nei mali amplitudine, quæ maturitate osten-
dūt lanuginis pilas, ex quibus vestes precio-
so linteo textūt. Theophrast. lanigeras Indiæ

arbores demonstrat mori folio, corpore autē cynorrhodi. foliorum succus medetur infantiū torminibus, semen tussi & pectoris vitiis. oleo eius emaculantur lentigines.

Supis.

offic. &

herb. iris

sylostis

sur. glau

faulnage

X Y R I S, folia habet iridis, latiora & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erūpit crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares pendēt, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis: rotundum, rubrum, acre: radix lōga, geniculata, rufa. Aeg. Xiris. aut xyris, naturæ tenuis est, discussoriæ & extrahentis, ac nimirum ficcatoriæ, præcipue semen, quod & vrinam cit, & licni indurato medetur.

Z

Rad. v. p.

offic. &

med. ze-

doaria

Z

A D V R A, aliis ziduara, radix est teres, aristolochiæ nō abfimilis, sapore & colore gingiberis. Hāc ad nos India mittit. Cal. sic. 2. Corpus latiore sagina reficit, flatus discutit. graue virus animæ quod alliū, cepa, vel vinum excitauit, abigit. venenatis moribus opitulatur. Crassiorē ventris spiritū digerit: aluū retinet, abscessus vteri soluit: vomitiones cohibet, & colicos mulcet cruciatus (Nunc ferè nostræ ætatis medici cōtra pestilentis cœli contagia vtuntur.

Z A R N A B V M, vel zarnabadium, est Arnabo.

Rad.

epeltre

Z E A duorū generum est. vna simplex, altera in geminis putaminib⁹ grana bina iun-

Et gerit. ob id dicoccos appellat. plus quam hordeū alit. ori grata. digeritur in panificia, minus quam triticum alens. Aeg. Zea tritico viribus respondet, medium inter calorem & siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non obstruit.

ZIZIPHA Pampinius Italiae primus inuexit, baccis similiora quam malis, & intacta iam syluae ascendunt, flore oleae, sed odorato magis, corni baccis simile pomum. Quo amplius & maturius, eo innocentius, cum alioqui difficile perficiatur, & lienem offendat. itaque decocto potius utendum censeant. Aedescina vocant quam gradissima, calore & humore temperata, teste Aetio: ideo sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorum tussim & difficultatem spirandi lenit: pectori, renibus vesicae prodest. Vomitionem acri concitatam humore sedant. Serica ea vocat Galenus, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia. Namque, ut idem testatur, insolentibus & effrenatis pueris & mulieribus cibi gratia tantum expetuntur, exiguumque praebent alimentum. Rutilum & album ziziphum probatissimum ad apum pastiones Columella scripsit.

ξίζιφά
off. iuu-
bes ou
guindo-
les.

PLANTARVM HISTORIAE
F I N I S.

PARISIIS
EXCVDEBAT IOANNES LODOI-
CVS TILLETANVS.
M. D. XII.

